

LEXICON
MEDICUM
GRÆCO-LATINVM
A BARTHOLOMÆO
CASTELLO

LEXICON
MEDICUM

GRÆCO LATINVM

A BARTHOLOMÆO
CASTELLO

LEXICON
MEDICUM
GRÆCO-LATINVM
A BARTHOLOMÆO
CASTELLO
MESSANENSE INCHOATVM.

Nunc verò in commodum publicum Opera & studio
ADRIANI RAVESTEINT.
ART. MED. DOCT.

EX HIPPOCRAT. GALEN. AVICENN.
Atque aliorum Celeberrimorum Medicorum Monumentis.

*Tertia quidem sui parte auctius, & innumeris, quibus
scatebat, mendis, expurgatum, ac perfectum.*



PATAVIJ, MDCLXXXV.

Apud Cadorinum, Sup. perm.

LEXICON

MEDICUM

GRÆCO-LATINUM

A BARTHOLOMÆO

CASTRALI

RECTORIS ACADEMIÆ

MDCCCXXXV

ADRIANI RAPASTINI

MDCCCXXXV

EX HYPOTHÈSE GALENICA

MDCCCXXXV

MDCCCXXXV

MDCCCXXXV



PATAVI MDCCCXXXV

Apud C. ...



Illustrissimo, atque Præstantiss. D.

FRANCISCO ALPHONSO

DE DONNOLIS

PATRITIO ILCINENSI

In Patauino Gymnasio Medicinam
Theoricam Publicè profitenti
S. P.



*In tandem expetitur, ac
omnibus summopere op-
tatum è mcis prodijt præ-
lis Lexicon Medicum, eo
illi tanto magis fauente
Numine, quanto glorioso decoratum.*



Nomine euadit. Ut ipse, ne ab inuido
Aristarcarum dente laceraretur, vere-
bar exiret, attamen Tuo (Illustissime
Vir) nomine insignitum emisi; quo enim
collustratum, incessurum Zoilorum
expers sum arbitratus. Nec verò quam
Tibi iustius sacrandum erat; quippe cum
ex isto medica scatcant documenta, ad te
tanquam ad proprium Orbem referri de-
buerant. Deberem & hic antiqui ac no-
bilis tui Generis dotes inserere; quando-
quidem ibi cum Armis permixtæ To-
gæ sibi ipsis gloriæ incrementum dedere.
At quia animi moderatione refulges
conticeo: Hac tantum maiorum & A-
tauorum tuorum laude contentus, quod
absque eo quod te quæsieris extra, Vir-
tutem domi comparandam reliquerint.
Te interim Sereniss. Venetiarum cuexit
Respubl. ut in Patauino Lyceo, Medi-
ca Oracula funderes: & dum humanas
litteras pluraque animi ornamenta quæ
possides contegis: tam docendo, quam

faciendo Medicinam, prudentiæ ostenderes copulatam. Ne dedigneris ergo qualecunque sit suscipere donum, sed Persarum Regis ad instar, donantis inspicere pectus, quo enim deficit effectus, eo abundat affectio, qua tantum, ut beetur, esse peroptat.

Dom. tuæ Illustrissimæ

Parauij xvi. Kal. Nouembris 1685.

Humilis. ac Obsequentis. Client
Iacobus de Cadorinis.



IN CASTELLIANVM
L E X I C O N
N. ANTONINI COLOSSI
C A R M E N.

Dædalus haud tantum fert nominis, implicuisse;
Stamine quàm cæcas explicuisse domos,
Non laus Acetæ seruasse penatibus aurum
Phryxum; Æsonidæ, sed retulisse datur.
Atlas Hesperidum vigili pomaria clausit
Angue, sed Alcides aurea mala tulit.
Ille quidem summo me iudice dignus honore est;
Qui, quid habent usus optima quæque, docet.
Scilicet inuentum primus qui cuderit aurum:
Murice qui tinxit vellera purpureo:
Quique in Erythræo projectis littore baccis,
Instituit torques excoluisse murus.
Quantum igitur laudis diues CASTELLE, mereris,
Qui tot primus opes, tot bona prima doces?
Non etenim herbarum, & lapidum, quod munus, & usus,
Sed quæ verborum est vis, ratioque doces.
Dædaleos nexus filo, ambagesque resoluis,
Aurates villos, aurea poma refers.
Dædalus, Alcides, tibi cedant, cedat Iason:
Te magis hic etenim laus diuturna manet.

PRÆCIPVARVM ARABICARVM VOCVM ,
 ad artem Medicam facientium , ordine Alphabetico
 series: in qua videre est, quæ Arabica vox , cui Græcæ
 & Latinæ reddatur, & significato respondeat .

Arabicæ.	Græce.	Latinæ.
A Bgas.	Chorion.	Amnium tunica
Abortus.	Amblohs.	Abortus, Deperditio.
Abrahamia.	Cacoethe.	Maligna vlcera.
Accidens.	Symptoma.	Passio, Coincicens .
Achael.	Pfellotes.	Traulus , Balbus.
Achilus, Albaras.	Ægilops.	Anchilops.
Achmas.	Pedion.	Planta pedis.
Achimon.	Argemon.	Iridis oculi vlcus .
Acrai, Arsarum.	Priapismus.	Tentigo.
A&alegi.	Palmos.	Palpitatio.
Acualis dolor.	Nitticos.	Perforatiuus.
Adereb fluxus.	Hepaticus affectus.	Iecoris imbecillitas.
Adorem	Raphè.	Sutura.
Adorem corticales.	Lapidoeides.	Squamosæ conglutinat.
Adorem laudæ.	Lambdoeides.	Sutura occipitis.
Adorem mendosæ.	Lapidoeides.	Sutura iuxta aures .
Adustiua.	Causon.	Adurens febris.
Adustiuum, Aufume.	Epicauma.	Sordidum vlcus oculi .
Aslicem.	Ophthalmia.	Lippitudo.
Alabene.	Supinitas.	Succubus .
Alacaran.	Ancyroceides.	Anchoralis processus.
Alachahab.	Pterna.	Câlcanæus, Calx.
Alachun.	Larynx.	Asperæ arteriæ caput.
Alagiagi.	Ostium hieron.	Os sacrum.
Alainanie .	Zoticè dynamis.	Vitalis virtus .
Alandagi.	Anadosis, diaphoresis.	Digestio , Concoctio.
Alarbian.	Sarcomata.	Polypus narium.
Alasch idem, ac	Splenica	Saluatella vena.
Ilischi, vid. infra Alascilezi.		
Alasardad.	Apotherepia.	Recreatoria .
Alatahal.	Coryza.	Grauedo.
Alatzar.	Ætropion	Palpebræ inuersio.



Al.

Arabicæ.

Græcæ.

Latinæ.

Albaras alba.
 Albaras nigra.
 Albarnaber
 Albatagin.
 Albere.
 Albhear.
 Alborati.
 Aiothoin.
 Albugo, Panus, Albedo.
 Alcafa.
 Alcahab.
 Alcaniari.
 Alcarba.
 Alcusi.
 Alchab.
 Alchada.
 Alchael.
 Alchael.
 Alchalcun.
 Alchama.
 Alchamar.
 Alchambar.
 Alchangeri.
 Alchatim.
 Alchef pectinis.
 Alcheffir.
 Alchei.
 Alchelos.
 Alchirunie.
 Alchool.
 Alchola.
 Alcholamaligna.
 Alcosbot.
 Alcude.
 Alcurati.
 Alcuze.
 Aldaragi.
 Aldebha.
 Aldebul.
 Aldees.
 Alden.

Leuce, Alphos.
 Lepra.
 Carcinoma.
 Carpus.
 Mesogastrium.
 Dysphincea.
 Omphalus.
 Terminthi.
 Leucoma.
 Inion.
 Astragalus.
 Sternon.
 Phalacroasis.
 Achlys.
 Astragalus.
 Omoplata.
 Aphonia.
 Diaphragma.
 Larynx.
 Choana, Pyelos.
 Ambliopola.
 Anæa.
 Sternon.
 Psoa, Ischis.
 Metacarpium.
 Porus.
 Oskoun hieron.
 Taraxis.
 Chitonia.
 Xerrocollution.
 Aphthæ.
 Nomæ, Phagedenæ.
 Apostasis, apostema.
 Cephalæa.
 Dysenteria.
 Tetanus.
 Raphe.
 Cynanche.
 Marasmus.
 Narce.
 Dianæa.

Morphea alba.
 Morphea nigra.
 Cancer narium.
 Brachiale.
 Ventris medium.
 Difficultas spirandi.
 Umbilicus.
 Exitura nigra.
 Cicatrix oculi.
 Occiput.
 Talus.
 Os pectoris.
 Calutium.
 Caligo oculi.
 Clavicula, Talus.
 Humerus.
 Vocis carentia ex lingua.
 Præcordia.
 Guttur.
 Infundibulum, Lacuna.
 Cæcitas solis intuitu.
 Amentia.
 Entiformis Cartilago.
 Lumbi.
 Post brachiale.
 Meatus.
 Os sacrum.
 Oculi perturbatio.
 Ulcera rebellia.
 Collyrium aridum.
 Oris ulcera.
 Ulcera depascentia.
 Abcessus.
 Dolor capitis diuturnus.
 Tormina.
 Spasmus, Convulsio.
 Sutura.
 Angina.
 Marcor. (do motus.
 Ignania, torpor, hebetudo.
 Mens.

Arabicae.

Græcæ.

Latinae.

Aldemamid.	Dothien.	Furunculus.
Aldememul, <i>idem ac</i>	Diarrhœa.	Alui profluuium.
Aldemar, & Aldemamir.		
Alderab.	Vla.	Gingiva.
Alderabe.	Gaster ancephalos.	Ventriculus cerebri.
Alderez.	Scotoma, scotodinos.	Tenebricosa vertigo.
Alduar.	Anadosis.	Digestio.
Aldulet, <i>idem ac</i> Du-	Hypochielon elcos.	Sinuofus vlcus.
bellet, & Dubollati, <i>vide infra.</i>		
Alenada.	Phlebotomia.	Venæ sectio.
Alfach.	Hæmalops.	Sugillatio oculi.
Alfasd.	Epicauma.	Nubes vuæ.
Alfasc.	Æpileps.	Fistula lacrimalis.
Alfæume.	Epiglottis.	Superlingula.
Algaras.	Æthiomenos.	Herpes exedens.
Algasamach, Alge-	Emphysema.	Pneumotosis, inflatio.
romati.		
Aigella, Algiebar.	Mydesis.	Lusciosus affectus.
Aluama.	Citosa, Picatio.	Appetitus deprauatus.
Aluatdenigi.	Ophthalmia vera.	Lippitudo vera.
Aluafa.	Melancholia.	Melancholia.
Aluati.	Sperma.	Semen.
Alhac.	Tenon, Aponeurosis	Tendo, Eneruatio.
Alhacel.	Paraphrosyne.	Delirium. (aures.
Alhadani.	Parotis, Chœras.	Struma, abscessus, iuxta
Alhadiuth.	Gonorrhœa.	Spermatice egestio.
Alhael.	Adenes.	Emunctoria, Glandulæ.
Alhagiagi.	Ostoun hioron.	Os sacrum.
Alhagran.	Perinæon, Femen.	Intersemineum.
Alhaliben.	Adenes.	Inguin. Emunctoria.
Alhamear.	Paraphrosyne.	Infantia, Fatuitas.
Alhasad.	Ancon.	Cubitus.
Alhasos.	Coccyæ.	Cauda.
Alhauis.	Ostoun hierom.	Os sacrum, latū, magnū
Alhauti.	Eusarcon.	Quadratum corpus.
Aleame.	Phleps metopu.	Vena frontis.
Aleasme.	Ecpiesma.	Fractura cranci.
Alhumor.	Bothria.	Alueoli dentium.
Alices.	Scordimena.	Pandiculatio.
Alicod.	Proptosis.	Oculi procidentia.
Aliebat, venæ.	Carotides.	soporarie, Apoplectice

Arabicae.	Græcæ.	Latinae.
Alintifar.	Mydriasis.	Vuæ dilatatio.
Alisema.	Coryphe.	Vertex capitis.
Allebe.	Sphage.	Iugulum.
Allui.	Cynicus spasmus.	Canina convulsio.
Almabad.	Phlebs incyles.	Vena poplitis.
Almachade.	Hedra, Archus.	Anus, Sedes.
Almachein.	Ranterea.	Anguli maiores oculi.
Almadian, <i>idem ac</i>	Phlebs.	Vena.
Almabad, & Almadab	Adener.	Emunctoria.
Almadid.	Proptosis.	Procidentia.
Almagabin, Almagiat.	Maschalis.	Axilla.
Almaxabê, Almecheni.	Canthus.	Angulus oculi.
Almellietu.	Episemasia.	Annotatio febris.
Almencumar.	Narcotica.	Sonifera, stupefacientia.
Almenthenein.	Psoa.	Lumborum caro.
Almerségi.	Rhagoeidis proptosis.	Vuæ procidentia.
Almes.	Cathocus, Catalepsis.	Deprehensio, alienatio.
Almesemar.	Porus, Helos.	Callus, Clauus.
Almesfat.	Phexos.	Acuminatum caput.
Almiffere.	Erysipelas.	Vicini rubiam.
Almatacargie.	Myxa.	Mucor.
Almirach.	Mys.	Musculus.
Almifmar.	Helos.	Clauus.
Almochati.	Pericranion.	Pericranium.
Alnefseme.	Psychicè dynamis.	Animalis virtus.
Alnisuchat.	Errhyna.	Caput purgia.
Alofos.	Lordosis.	Luxatio.
Alofos.	Coccyx.	Cauda.
Alrabin.	Asthma.	Anhelatio.
Alrad.	Sarcotrauma.	Carnis vulnus.
Alrahaune.	Paraphrosine.	Delirium.
Alrasafe.	Epigonatis.	Patella.
Alraute.	Pterygia.	Ale, Pinulæ narium.
Alrosbot.	Porus sarcoticus.	Porus carneus.
Alruic.	Paracme.	Declinatio.
Alsabiâr.	Comatosa.	Somnifera opiata.
Alsaguaid.	Embryon.	Fœtus.
Alsanad.	Pechys.	Vlna, Cubitus.
Alisahafati, <i>idem ac</i>	Sahafati, <i>vide infra</i> .	
Alsaim.	Nestis entereon.	Ieiunum intestinum.
Alsamach.	Typhlon trema.	Cœcum foramen.

Arabica.

Græcæ.

Latina.

Alcamach.
 Alſaria.
 Alrarnach.
 Alſaterel.
 Alſeda.
 Alſedar.
 Alſedeid.
 Alſeedic.
 Alſelac.
 Alſeriaran.
 Alſhara.
 Alſhantat.
 Alſhela.
 Alſiaſe.
 Alſtengi.
 Alſurbed.
 Alſarſar.
 Alſeneſes.
 Alſerbet.
 Alſharas.
 Alſhaun.
 Alſtheca.
 Alſhoiſ.
 Alſthamar, *idem*
ac Alchamar.
 Alſhute.
 Alſualil.
 Alſuardengi.
 Alſudi.
 Alſuebe.
 Alſunum.
 Alſureſchin.
 Alſuſas.
 Alſamane.
 Alſacha.
 Alſulus.
 Alſulus.
 Alſua Cranij.
 Alſua deſcendens.
 Alſuatio.
 Alſeffatus.

Orys.
 Epilepſia.
 Hydatis.
 Ancyloblepharon.
 Thlaſma.
 Scotomia.
 Brachion.
 Meliceris.
 Scleriaſis.
 Catharticum.
 Epilepſia.
 Errhyna.
 Ganglia.
 Hegemonica.
 Cerion.
 Phlebs hypoglottis.
 Hypoſphagma.
 Diaphnoe.
 Cachexia.
 Barcycoia.
 Phygethlon.
 Traulus.
 Bubo.
 Hæmorrois.
 Acrochordon.
 Chymofis.
 Gonorthæa.
 Palmos.
 Bothrion.
 Exanthemata.
 Paranea.
 Paralyſis.
 Meros.
 Larynx.
 Bothrion.
 Hydrocephalon.
 Hypochyma.
 Scolioſis.
 Epigonatis.

Auris.
 Morbus comitialis.
 Aquula.
 Palpebrarū coherentia.
 Contuſio.
 Tenebroſitas.
 Brachium.
 Melleus abſceſſus.
 Palpebrarum durities.
 Purgans.
 Comitialis morbus.
 Caput purgia.
 Contraſtiones.
 Rectrix virtus animæ.
 Fauus.
 Vena ſublingua.
 Cruenta ſuſſuſio.
 Tranſpiration.
 Prauus habitus.
 Obauditus.
 Apoſtema peſtilens.
 Balbus.
 Abſceſſus peſtilens.
 Sanguiflua vena.
 Verruca.
 Palpebræ diſtorſio.
 Seminis fluxus.
 Palpitatio.
 Vlcus cauum oculi.
 Puſtula.
 Dementia. (mollities.
 Reſolutio neruorum.)
 Femur, Crus.
 Aſperæ arteriæ caput.
 Foſſula.
 Aqua capitis.
 Suſſuſio.
 Luxatio poſtica verteb.
 Patella, Genu.

Arabicæ.

Arsatum.
 Arteria Orithi.
 Arteria Aurilidi.
 Arteri asubnecti.
 Aretica.
 Aschachilos.
 Ascham.
 Asef.
 Aseid.
 Aselha.
 Asellata veua.
 Asestra.
 Atanatum.
 Atafus.
 Athacarugi.
 Alekerael.
 Aures muris.
 Balchee.
 Balchie.
 Bancharas.
 Barachieu.
 Baras.
 Barbati.
 Basilare os.
 Bathara.
 Baurach.
 Bear.
 Beditus.
 Benat noctis.
 Beriteron.
 Besbeia.
 Betaram.
 Bezahartica.
 Bezel.
 Bilef.
 Birsen.
 Bolisinos.
 Bothor.
 Bothor.
 Brachium.
 Buri.

Græcæ.

Priapismus.
 Aorta.
 Leiai.
 Carptides.
 Arthritis.
 Sphacelus.
 Pathos, Pathema.
 Hydroon.
 Pechys.
 Oedema.
 Maschaliala.
 Estropion.
 Bubon, Læmos.
 Pneumatosis.
 Myxa.
 Apostema.
 Myos otis.
 Telephion elcos.
 Psyracia.
 Pancreas, Calliereas.
 Rubon, Lemos.
 Psoronychia.
 Oscheon.
 Sphenois, Polinorchu.
 Anthrax pestilens.
 Aphronitrum.
 Dyspnea.
 Strumæ, Chœrardes.
 Epinyctis.
 Peritonæon.
 Polypus, Sarcoma.
 Encope.
 Alexiphatmaca.
 Paracentesis.
 Allantoeides.
 Pleuritis.
 Bulimos.
 Bothor.
 Synchyfes.
 Brachion.
 Sarcocoele.

Latinae.

Tentigo, Penis rigidus.
 Magna, Crassa.
 Arteria laeues.
 Soporaria.
 Articularis morbus.
 Membrum demortuum.
 Passio.
 Sudamen.
 Cubitus, Vlna.
 Tumor laxus.
 Axillaris vena.
 Palpebre inuersio.
 Abscessus pestilens.
 Inflatio.
 Mucor.
 Abscessus.
 Muri auricula.
 Vlcus telephium.
 Pustula capitis.
 Caro glandulosa.
 Apostema pestilens.
 Scabrities vnguium.
 Scrotum, bursa testium.
 Os palati.
 Carbo, vlcus escharot.
 Sal nitrum.
 Difficultas spirandi.
 Scrofulæ.
 Nocturna effloratio.
 Peritonæos tunica.
 Caro multiplex narium.
 Incisio.
 Ad venena pharmaca.
 Punctio, Perforatio.
 Intestinalis tunica.
 Lateralis dolor.
 Ingens esuritio.
 Pustula.
 Exitura oculi.
 Brachium.
 Carnosa hernia.

Arabicæ.

Græcæ.

Latinae.

Cadar.	Hemiplexia.	Dimidij: corporis resolu.
Cafacan.	Cardia.	Cor.
Calcataron.	Pterigium.	Vngula oculi.
Callus.	Helos.	Clauus.
Caluitium.	Phalactosis.	Capillorum casus.
Camaduci.	Inion.	Occiput, occipitium.
Cambium.	Chymus.	Sanguis, seu humor.
Camisia fetus.	Allantoeides.	Intestinalis.
Canalis.	Porus.	Meatus.
Cancerena.	Gangræna, crofis.	Gangræna.
Canna pulmonis.	Trechea arteria.	Aspera arteria.
Cannæ tibie.	Oerca, Sura.	Ossa duo tibia.
Capsula cordis.	Pericardium.	Cordis inuolucrum.
Carahitus.	Phrenitis.	Delirium febrile.
Caras.	Aphonia, Traulus.	Vox deperdita.
Caratin.	Gesenteron.	Lumbrici terrestres.
Carenum.	Sapa, Siræon.	Mustum coctum.
Carmata.	Bubon.	Glandularum abscessus.
Care addita.	Hyperfarcosis.	Thymus.
Cassum.	Thorax.	Pectus.
Cataracta.	Hypochyma.	Suffusio.
Catalan.	Encopé.	Intisio.
Chadessan.	Derein.	Excoriare.
Chahab.	Astragalus.	Talus.
Chalahan.	Exarthrema.	Luxatio.
Chafem.	Ozenæ.	Narium vlcera.
Chatrab.	Lycanthropia.	Lupina insania.
Chede.	Anorexia.	Innapetentia.
Chesaram.	Catagma.	Ossium fractura.
Chila.	Cirfos.	Hernia.
Chis, Saccus.	Cystis.	Vesica.
Chis hordei.	Prisana.	Cremor hordei.
Cholera.	Chole.	Bilis.
Cholera citrina.	Picrocholos, chymos.	Bilis pallida.
Cholera famosa.	Chole nota.	Bilis spuria.
Cholera mintama.	Chole melena.	Bilis adusta.
Cholera nigra.	Picrocolos chymos.	Bilis atra.
Cholera rubra.	Chole lecithodes.	Bilis amara.
Cholera vitellina.	Cholera.	Bilis vitellina.
Cholirica passio.	Phrenitis.	Bilaris.
Chranites.	Zeichen, Lepra.	Phrenitis.

Arabicæ.

Græcæ.

Latinae.

Chuba.
 Chuzez.
 Clypealis Cartilago.
 Cymbalaris.
 Cohol.
 Colcotar.
 Complexio.
 Conach.
 Congelatio.
 Congelatio dentiũ.
 Consimilia.
 Contorsio.
 Conturbatio.
 Convulsio canina.
 Coronale.
 Corruptio ossis.
 Cortex intestini.
 Coxa.
 Cas.
 Cutubuth.
 Darb, Darab.
 Debus.
 Demonium.
 Dentes Atham.
 Derezi.
 Diacuminum.
 Dipfacos.
 Dislocatio.
 Disnia.
 Domestica vena.
 Dubellati.
 Dura mater.
 Durities.
 Embroce.
 Empialos.
 Emulgentes.
 Emunctoria.
 Encaras.
 Endros.
 Eneruatio.
 Epigti mar.

Tetanus.
 Chôdros, Thyrocidēs.
 Cricoeides.
 Gollyrion.
 Chalcitis.
 Crasis, Symmetria.
 Hystericè pnix.
 Cataleps.
 Hemodia.
 Homogenea.
 Scoliosis.
 Taraxis.
 Spasmus cynicus.
 Argemon, Leucoma.
 Teredon.
 Ephelcis, Ramentũ.
 Meros.
 Cneme.
 Lycanthropia.
 Diarrhœa.
 Marasmus.
 Mauia.
 Gomphij.
 Raphè.
 Diaspoleticum.
 Diabetes.
 Lordosis, Luxatio.
 Dyspnea.
 Maschalixa.
 Phlegmone.
 Meninx crassa.
 Scirrhus.
 Balancion.
 Hepiala.
 Emulgentes.
 Adenes.
 Phlebs Mesaraei.
 Epididymis.
 Paralysis.
 Epithemata.

Impetigo.
 Tensio.
 Scutiformis cartilago.
 Coopertoria cartilago.
 Collyrium fufum.
 Vitrioli species.
 Temperies.
 Vteri præfocatio.
 Deprehensio.
 Stupor dentium.
 Similares partes.
 Obstipitas.
 Vellicatio oculi.
 Distorsio faciei.
 Albugo otuli.
 Ossis caries.
 Intestini tunica.
 Femur, Crus.
 Tibia.
 Lunina insania.
 Alui profluvium.
 Tabes.
 Furor.
 Molares, Sapiientiæ.
 Commissura, Sutura.
 Ex cumino pharmacum.
 Urinæ profluvium.
 Exarticulatio.
 Difficultas respiratiõis.
 Interna.
 Abscessus calidus.
 Cuticularis tunica.
 Abscessus durus.
 Balneum.
 Febris hepiala.
 Percolantes venæ.
 Glandula.
 Vena mesaraica.
 Supergeminalis tunica.
 Resolutio.
 Linimenta.

Effere.

Arabicæ.

Græcæ.

Latinæ.

Effere .	Epistictis .	Effulgētia , effloratio .
Effere cholericum .	Phlegmone, phlogosis	Inflammatiō .
Ellicos febris .	Hæctica .	Habitualis facta .
Exitura .	Apostema .	Abscessus purulentus .
Expressio oculi .	Proptosis .	Vuæ prolapsus .
Fagdan .	Lordosis .	Spinæ luxatio .
Fames vaccina .	Bulimos .	Vehemens esuritiō .
Faricon .	Causon .	Febris ardens .
Fasclam .	Apocope .	Abscissio .
Febris triangulata .	Tetartæos .	Quartana .
Fedehan .	Hernia, Ramex .	Ruptura .
Ferismus .	Priapismus .	Tentigo .
Feterat .	Paracme .	Remissio morbi .
Fincter musculus .	Sphincter .	Constrictor .
Filachaliasuch .	Stephaniæa .	Sutura coronalis .
Fechan .	Diastremma .	Luxatio .
Fissura .	Rhegmes .	Rima .
Focilia duo .	Cercis, Pechys .	Radius, cubitus .
Fœdion .	Epilepsia .	Puerilis morbus .
Formica .	Myrmecia .	Scissilis verruca .
Formica .	Herpes miliaris .	Serpigo .
Formicalis .	Myocephalon .	Muscæ caput .
Fossula .	Botrion .	Vlcus cauum cornæ .
Franites .	Phrenitis .	Cum febre delirium .
Fricatio .	Anactripsis .	Frictio ,
Furcula .	Cleis .	Clavis, Iugulum ,
Furfures .	Pityriasis .	Porrigō .
Fugulle, Fulille .	Parotis .	Ad aures morbus .
Furfus .	Nympha .	Colliculum .
Gradu .	Scirrhus .	Tumor durus indolens .
Galea, Ounni .	Cephalæa .	Diurnus capitis dolor
Garab, Algaras .	Ægilops .	Vlcus anguli oculi .
Gasi .	syncope .	Præceps virium lapsus .
Gaunoij .	Paristhmia .	Tonsillæ .
Gedaul .	Mesaraon .	Mesenterium lactes .
Geleniabini .	Dianthodomet .	Et rosa, & melle comp.
Genu .	Gony .	Os tibiæ, Genu .
Gessa palpebræ .	Sclerophthalmia .	Scabrities palpebrarum .
Gibbositas .	Cyllosis .	Distortio .
Gienun .	Mania .	Furor .
Gingia mater .	Perictanium .	Pericranium .

Arabicae.

Græcæ.

Latinæ.

Glandula.
 Grandu oculi.
 Guesques.
 Guidez venæ.
 Gutta serena.
 Haben.
 Hacer.
 Hacuna.
 Halmes.
 Hamcha.
 Hamicha.
 Hasef.
 Hazam.
 Hedian.
 Henadam.
 Hesme.
 Hirqui oculorum.
 Humor.
 Iafue.
 Iestigatio.
 Iezemet.
 Ibet, Subeth.
 Ienis persicus.
 Ilischi.
 Impetigo.
 Impetigo aspera.
 Incubus.
 Inuerva palpebræ.
 Inuiscatio palpebræ.
 Inuolutus.
 Istimbre.
 Iuleb.
 Iuncus.
 Kef.
 Kers.
 Kili vena.
 Lacertus.
 Lachat.
 Lactea vena.
 Lapidofitas oculi.
 Latica febris.

Ganglia.
 Chalazion, pesthia.
 Melancholia.
 Sphagitides.
 Amaurosis.
 Hydrops.
 Apophthema.
 Satyriasis.
 Paraphrosyne.
 Anœa.
 Lata exanthemata.
 Hidroa.
 Encupe.
 Meria, Morosis.
 Pepsis.
 Apophphagma.
 Canthus.
 Chymus.
 Bregma.
 Palmos.
 Catalepsis, Caros.
 Coma.
 Anthrax.
 Eroticos.
 Leichen, Lepra.
 Leichenes.
 Ephialtes.
 Lagophthalmos.
 Ancyleblepharon.
 Allatœoides, choriôn.
 Crassis.
 Hydrorofaton.
 Ionthos.
 Cheir.
 Stomachus.
 Hepatitis.
 Mys.
 Encope.
 Galaxias.
 Tylosis.
 Cathemerina,

Contractiones.
 Hordeolum.
 Facuitas.
 Apoplectica, lugularis.
 Visus obscuritas.
 Aqua inter cutem.
 Vlcus, siue Abscessus.
 Tentigo, penis tensio.
 Delirium.
 Dementia.
 Variolæ.
 Sudamina.
 Incisio.
 Desipientia.
 Concoctio.
 Auulsio.
 Anguli oculi.
 Humor.
 Sinciput.
 Palpitatio, Saltus.
 Deprehensio.
 Sopor.
 Carbo, Carbunculus.
 Effrenis amore.
 Salsa cutis asperitas.
 Tensa prurigo.
 Nocturna suffocatio.
 Leporinus oculus.
 Palpebrarum coherentia.
 Vrinaculum, Secundum.
 Temperies, assimilatio.
 Ex rosacea, & saccharata.
 Varus.
 Manus.
 Ventriculus.
 Caua vena.
 Musculus.
 Incisio.
 Lactes.
 Callus palpebrarum.
 Quotidiana continuus.

Arabicae.

Græcæ.

Latinae.

Lauda.	Os hyoeides.	Os gutturis.
Laxatio.	Paralyis.	Resolutio.
Leipyrria febris.	Leipyrria.	Leipyrria.
Leithargyrium.	Molybdæna, plumbago.	Limatura plumbi.
Lentigo.	Eysuccatio.	Sugillatio.
Lepores nasi.	Mycteres, pterygia.	Alas, pinnulae narium.
Leucam.	Lepea.	Zepra.
Lilimie.	Coiloma.	Profundus oculi abscessus.
Loch.	Apophlegmatismus.	Pituita per oseductiuū
Longaon.	Apeuthysmenon.	Rectum intestinum.
Lulma.	Coilomata.	Ulcera caua vnea.
Macula oculi.	Hypophthalmia.	Sugillatio.
	Hyposphagma.	
Malum granatum.	Giphoëides.	Os pectoris.
Manuale opus.	Cheiturgicon.	Manuum opera.
Muram.	Aleimma.	Vnguentum.
Musera.	Phlegmone mitis.	Leue inflammen.
Masticatorium.	Apophlegmatismus.	Pituita eductiuū per os
Mater puerorum.	Epilepia.	Comitialis morbus.
Mater sanguinis.	Aneurisma.	Arterialis sang. fluor.
Melandana.	Catapotia.	Pilula.
Melon.	Pepon.	Anguria.
Melon indus.	Melopepones.	Anguria viridis rotunda
Men.	Drosomeli.	Manna. (pulsus)
Men Giezer.	Systole, Diastole.	Contractio, dilatatio
Mentruus sanguis.	Catamenion.	Menses.
Meri.	Oesophagus.	Gula.
Metachlach.	Cholera.	Turbida urina.
Mitenea.	Psoa.	Caro lumborum.
Mitach.	Epigastrium.	Abdomen.
Mitrachia.	Hypochondriacus.	Flatuosus morbus.
Mollificatio.	Paralysis.	Resolutio.
Mojoculom.	Typhon.	Cæcum intestinum.
Morbili.	Exanthemata sub.	Pustulae elatae.
Morphoea.	Alphos, Leuce.	Vitiligo.
Morum.	Condylomata.	Extubercatio ani.
Musula.	Derma.	Cutis.
Muphis.	Epiepsimos.	Totius oculi prolapsus.
Musum.	Struphnos.	Austerus sapor, vel a-
Necentia.	Apostema.	Exitura. [cerbus.
Nuallulare os.	Scaphoeides.	Nauiforme os.

Arabicae.	Græcæ.	Latinae.
Nebith.	Oinos.	Vinum.
Nerdi os.	Astragalus.	Tallus, os ballistæ.
Nervialis futura.	Obelica.	Sagittalis recta.
Noera.	Phlebs.	Vena.
Nodus.	Athera.	Atheroma.
Nubes.	Hypochyma.	Suffusio, Catarracta.
Nucha.	Notyxos myelos.	Spinalis medulla.
Nyctalopas.	Nyctalops.	Nocturna cæcitas.
Oculi egressio.	Epieismos.	Totius oculi prolapsus.
Oculi profunditas.	Atrophia.	Nutritionis defectus.
Oculi vlcus serpens.	Anthraxosis.	Carbunculus.
Oculus poplitis.	Epigonatis, Myle.	Patella, rotula, genu.
Officialia membra.	Organica.	Instrumentalia.
Onum.	Cephalea.	Dolor capitis diurnus.
Opium.	Meconium.	Succus papaveris.
Oregmon.	Catarrus.	Destillatio.
Os cuaci.	Sphenois.	Genu.
Os cruris.	Gony.	Balilare, palati.
Os lande.	Pharyngethron.	Os gutturis.
Os latum, Alchatim.	Coxa.	Femur.
Os Nerdi.	Cyboeides.	Cubiforme.
Os paris.	Zygoma.	Os iugale, os temporum.
Os perdis.	Pedion.	planta pedis, pesten.
Ossa Shemie.	Lithoeidea.	Lapidosa, Petrofa.
Ossci mollificatio.	Rhacosis.	Detritio, Seroti, exte.
Ossium.	Scrotum.	Testium inuolucrum.
Panaritium.	Paronychia.	Reduua.
Panus.	Phugethon.	Panis.
Pars domestica.	Oiceion meros.	Interior.
Pars sylvestris.	Exotyen meros.	Exterior.
Patia.	Tonos.	Nervus.
Pecten alchef.	Metacarpion.	Postbrachiale.
Peliomata.	Exsuccatio.	Liuor.
Peltalis cartilago.	Thyroceides.	Scutiformis.
Periodica febris.	Typica.	Intermittens, reuer.
Phitanos febris.	Palymbola.	Erratica.
Phlebotomia.	Phlebotomia.	Venæ sectio.
Piamater.	Choroceides.	Mening tenuis.
Pixis.	Ischia.	Coxa.
Plaga.	Trauma.	Vulnus.
Planta noctis.	Epinyctides.	Nocturne effloration.
		Porrina.

Arabicae.

Græcæ.

Latinae.

Porrina.	Prasodes.	Porracea bilis.
Portinarium.	Pyloros.	Ianitor.
Proportionalis.	Symbolicus morbus.	Natura, loco; tempore.
Pruna.	Anthrax.	Carbo; (respondens.)
Pupille constrictio.	Phthisis oculi.	Tabes oculi.
Quindaga venæ.	Sphagitides.	Apoplectica, iugulares.
Radani.	Thlasma.	Contusio, Attritio.
Radicalia membra.	Spermatice.	Seminalia.
Ragamia.	Rhognie.	Fissura.
Rabaf.	Hæmorrhoids narium.	Fluxus sang. narium.
Ranula.	Sardoa.	Ranunculus.
Ras.	Cephale.	Supernus venter.
Rascetta.	Carpon.	Brachiale.
Rasga.	Epigonatis.	Patella.
Raved seni.	Rhabarbarum.	Rhabarbarum.
Rualis dolor.	Nephriticus.	Renum dolor.
Resudatio.	Hidroa.	Sudamina.
Rete mirabile.	Plegma dictyocides.	Plexus retiformis.
Rhæne.	Anea.	Amentia, dementia.
Rhia alfabiam.	Hydrocephalon.	Aqua capitis.
Rigil.	Meros.	Femur, Crus.
Rina alfabiam.	Epilepsia.	Comitialis morbus.
Rob.	Opos.	Succus seipso cōcrescēs.
Rollrum Corui.	Coracoeides.	Cornicularis processus.
Rotula.	Epigonatis.	Patella, Genu.
Roptura.	Cele.	Ramex, Hernia.
Ruptura carneæ.	Proptosis.	Oculi prolapsus.
Sacculos.	Cephalalgia.	Capitis dolor.
Sachus.	Catalepsis.	Deprehensio.
Sache.	Tmesis.	Scissura.
Sadacham.	Thlasma.	Contusio.
Sagittalis.	Obelæa.	Recta sutura.
Saharazi.	Achores.	Vlcus capitis manans.
Sahara.	Pannychismus.	Peruigilum nocturnum.
Saus.	Palmos.	Palpitatio.
Saus mortuus.	Exsuccatio.	Sugillatio.
Saus in siphac.	Hypopyon.	Part. corneæ.
Saus vngulacis.	Onyx.	Vnguis oculi.
Saus.	Carcinos.	Cancris species.
Saus.	Ptisana.	Cremor hordei.
Saus.	Cephalactice.	Caputpurgia.

Scabies.

Arabicae.

Graecae.

Latinae.

Scabies oculi,

Scamnicatio.

Scelen vena.

Sciatica.

Sclerofis,

Scotomia.

Scrofula,

Sebel.

Secaniabin.

Secundina.

Secundina tunica,

Sedar,

Sedere,

Schagian.

Serach,

Serahif,

Sesafeue,

Sibare.

Sief,

Silac.

Siphac.

Siracost.

Sirsen calidum,

Sirsen frigidum,

Sisamina ossa,

Sochos,

Soda,

Soram.

Sofati,

Spasmus humidus,

Spasmus siccus,

Spratula.

Spatularis,

Spina.

Spondylus.

Stoliditas,

Strabositas,

Subet, Subetia.

Subeticae venae,

Suffuf,

Suffumigia,

Trachoma,

Encharaxis.

Splenica.

Coxendix, Schias,

Sclerialis.

Scotodinos,

Cherades.

Encanthis, Rfsoeas.

Oxyfacchara,

Chorion,

Chorooides,

Cataphora,

Scotoma,

Trauma,

Emphraxis pylori,

Hypochondria.

Acantha,

Mania.

Hydrocollyria.

Tylosis,

Peritonæum.

Manna.

Phrenitis,

Lethargus,

Semaioidea.

Cataleptis Catoche,

Cephala,

Catalepsis,

pleuritis.

Notiodos,

Xeros,

Homoplate.

Omiena vena,

phlegmone cutis,

Spondylus,

Paraphrosyne.

Illois, Strabismus,

Caros, Coma,

Coma aypnon,

Carotides, Conis,

Thymiamata,

Pruritus oculi.

Cutis incisio.

Saluatella.

Coxendicum morbus.

Tumor durus palpebrae.

Tenebriosa vertigo.

Struma.

Inaugularis.

Syrupus acetosus.

Secunda,

Mening tenuis.

Somnolentia,

Vertigo,

Vulnus,

Obstructio pylori.

Præcordia.

Spinæ apex.

Furor,

Humida collyria.

Depilatio palpebrae.

Peritonaos tunice.

Manna.

Phrenitis,

Lethargus,

Semaioidea.

Cataleptis Catoche, deprehensio,

Dolor capitis,

Deprehensio,

Lateralis dolor,

Ex repletionem,

Ex inanitionem,

Scapulæ,

Humeralis vena,

Inflammen cutis,

Vertebra.

Delirium.

Palpebrae contorsio.

Sopor, alius,

Coma vigil, vigilas,

Saperaria, Arteriales,

Suffitus, Odor metallicus,

Sura,

Arabicæ.

Græcæ.

Latinæ.

Sara,	Omphalos,	Vmbilicus,
Sycodei.	Cyclos profupon.	Extuberatio faciei.
Syncopalis humorosa,	Chymosa,	Ex crudo humore febr.
Syncopalis miuuta,	Leptòs pyretòs,	Ex tenui humore febris
Tabulos,	Lipyria febris,	Febris inequalis,
Tarax,	Cophosis,	Surditas, obauditus.
Tarazis,	Ophthalmia notha.	Conturbatio oculi.
Tarfati,	Hyposphagma,	Cruenta luffatio,
Tarfus,	Cophosis,	Surditas,
Tebegi,	Emphysema,	Palpebræ inflatio,
Tebiegi,	Cahexia,	Præuus corporis habitus,
Thelba,	Sapa, Siræon,	Mustum coctum,
Temor,	Hypogastara.	Ventris concauitas.
Tereniabin,	Manna,	Manna species,
Tharcamatica,	Trachomaticha,	Detergentia.
Tharica,	Throcanter,	Tuberculum ossis.
Thau.	Ganglia,	Glandulosi affectu,
Theca.	Cranion,	Caluaria.
Thochan,	Paracentesis,	Perforatio.
Tinea,	Achores.	Manantia vlcera capitis
Tinnitus aurium.	Echos, Syrisinos,	Sibillum aurium,
Traulul,	Pfellotes,	Balbuties,
Trebel,	Oedema,	Tumor laxus,
Triangula,	Cetartæos,	Quartana febris,
Tyria,	Alopecia, Ophiasis,	Defluuium capillorum,
Tachzi,	Nygma,	Punctura nerui,
Tacillatio,	Taraxis,	Spuria lippitudo,
Tariolæ.	Exanthemata lata.	Efflorationes.
Tarix,	Cirfos.	Dilatata vena.
Tena elgebein.	Metopon.	Frontis vena.
Tena alhaleb.	porus Vreter.	Meatus vrinarius.
Tena alunabat.	Igoytis.	poplitis vena.
Tena curuatura.	Ancyle.	poplitis vena.
Tena funis brachilij.	Basilica.	Iecoraria ramus.
Tena Medeni.	Dracontion.	Dracunculus.
Tenz emulgentes.	Emulgentes.	Colatoria.
Tenz subeticæ.	Carotides.	Soporariæ.
Tenter.	Sicya.	Cucurbitula.
Terruca.	Acrochordon.	Verruca.
Teficæ.	Phlyctena.	Pustula.
Tane.	Gnathus.	Genæ.

Virga

Arabicae.	Græcæ.	Latinae.
Virga.	Ædoion, Caulos.	Coles, penis.
Viriditas oculi.	Glaucoma.	Glaucedo oculi.
Vndimia.	Oedema.	Tumor laxis.
Vngula oculi.	Pterygion.	Ala oculi, vnguis oculi.
Vfago.	Leichen.	Impetigo.
Vuatio.	Staphyloma.	Vuæ oculi egressus.
Zaara.	Agrypnia.	Morbosa vigilia.
Zachema.	Catharrus.	Destillatio.
Zemane.	Paralysis.	Resolutio.
Zinaria.	Iòdes, Cholà.	Æruginosa bilis.
Zirbus.	Epiploon, epiploum.	Omentum.
Zuccarum tabarzet.	Hals Indicòs.	Saccharum album.

F I N I S.





LEXICON MEDICVM

HIPPOCRATIS, GALENI,
ET AVICENNÆ, &c.

Authore

BARTHOLOMÆO CASTELLO,

Theologo, Philosopho, & Medico Messanenſi.

A.

ABAPTISTA, *Terebella* est, quæ in fracturis capitis (quæ usque ad Cerebri membranam pervenerunt, quando id quod contusum est, excidi debet) utimur. Cui *Terebella* (ne dum Medici eam audacius tractâtes duram membranam, quæ ossi subternitur, violent,) supra eius acutam cuspidem, circulum quendam, siue labrum, siue supercilium, parum extans efformant, quam *Terebellam* quod mergi non possit; ab argumento *Abaptistam* vocant, ex α & βαπτίζω. Gal. 6. meth. cap. 6.

Abarticulatio, idem est quod *Dearticulatio*. Græcis

ει δὲ ἀρθρωσις id est, ea naturalis ossium coniunctio, que em ei tem motum habet, sicut *Coarticulatio*. Græcis *συνάρθρωσις*, est ea naturalis ossium cōmissio, quæ exiguum, & obitcurum aliquando, aliquando nullum motum præ se fert, 2. de artic. 9.

Abdomen, ab Abdendo, communiter idem est quod imus venter, Arisl. γαστήρ. l. 1. hist. anim. 13. vocari solitus, qui superius quidem, cartilagine ensiformi, ad latera costis spuris, inferius autem ossibus pubis circumscribitur, ac diuiditur in partem supremam, (quam in specie ἐν γαστρίδι nominant) mediam (quæ umbilicalis est regio) & infimam seu hypogastrium, l. 6. de usu part. c. 4. Precipue autem acceptum abdominis vocabulum. Anatomicis est ventris hui pars exima, totum illud, quod viscera naturalia integens ex cute, pinguedine, musculis ceto, & peritonæo compactum est. Gal, loc. cit. & 2. Apho. 35.

Abductiones, quæ & *Abruptiones*, *Apagmata*, & *Apoclasmata* dicuntur, fracturæ sunt, quæ propè articulum, per totâ ossium crassitudinem fiunt, ita ut a se plurimum distent, quas recentiores caulatim, hoc est caulis, modo factas fracturas nuncupant, com. 3. in lib. Hippo. de his quæ in medicatiua fiunt 31.

Ablatio, totum illud tēpus paroxysmi febrilis est, quod post statum est, qualicumque natura præditum, siue ad integritatem veniat, siue non, quod & remissio, interuallu, declinatio, & submissio dici solet, l. de mor. tēp. c. 6.

Abluentia, & *Abstergentia* medicamēta sunt, quæ succum mordicationem facientem, leniendo euacuat l. de simpl. med. fac. cap. 37 & lib. 2. cap. 14.

Abolitionem Pulsus vocamus, cum eleuatis & mox applicatis digitis inuenimus in singulis applicationibus

notum deficientem; longe enim abest pulsus abolitio, à pulsu deficiente, illa enim est velut defectus, vt sensus quidem indicat totius functionis, hic diuidiatæ amissio, 2. de caus. puls. cap. 3.

Abortus, est imperfectorum foetuum emissio, vt cur si facta fuerit, quain Hip. nunc *amblosin*, nunc *perditio* nē, nunc *apophiborā* vocat, & medicamenta id præstantia, *amblotica*, id est, *abortina*, com 1. in 6. de morb. vulg. 1

Abrasalunt, quæ *Aposyrmata* Græci vocant, suntque vlcera, quæ mollem, & suspensam habent cuticulā, 1. de compos. medic. per gen. cap. 12. Exponitur alias quoq; locus desquamatus, & frustulum in vlceribus a partis vlceratæ subitancia abrasum.

Abrasio intestinorum, est vlceratio partium. quæ in superficie intestinorum constat, qua earundem partium educuntur ramenta, 3. de rat. vict. in morb. acut. 33.

Abruptio, vide *Abductia*.

Abscedentia corpora, siue quæ abscesserunt, vocat Hipp. omnia, quæ cum corpus secundum naturam sese habet, vel vnita aliquibus aliis partibus sunt, vel eas attingunt, cum præter naturam affectum est, unionem vel contactum non amplius seruant. *Expansa* autem, vocat, quæ plurimo intervallo inter se distant, id quod duobus modis fit, vel in toto, vel in labris tantum, 2. de his quæ in medic. fiunt, 25. vide *Apostasis*.

Abscessio apud Hipp. id est, quod ego soleo *continuitatis solutionem* appellare; & membra, quæ ita affecta sunt, *Abscedentia* vocat, tametsi vna quædam species huius generis sit, quam propriæ *Abscessionem*, & *Abscessum*, id est, *Apostasin*, & *Apoitema* nuncupant, lib. de his quæ in medicam. fiunt in argumento operis.

Abscessus, tumor est præter naturam suppuratus non coaducto, & bono pure, sed in corruptionem quandam

alia tendente, li. de tum. c. 3. Aliquādo Hip. non eos solos *Abcessus*, vocat qui per fluxionem fiunt, sed etiam cum alius transsit morbus in alium, com. 2. in 1. de morb. vulg. 21. *Abcessus* est corporum ex phlegmone in pus transmutatio, libr. finit. med. fol. 97. *Abcessus* etiam appellat Hippocr. qui excretionem noxiorum humorum sunt facti, ne dum qui decubitu, com. 1. in 3. de morb. vulg. 4. Vide *Sinus*.

Abcissio, quæ & *Apocope* dicitur, siue morbus velut ex abscissione solutus, est, qui citra declinationem soluitur, & terminatur, vel propter ægrotantium imbecillitatem, vel propter morborum fortitudinē, & ferociam, nimirum cum morbus supra vires existit, quod mortaliū morborum est proprium, de totius morb. temp. cap. 1. & 5.

Abstergentia, vide *Abluentia*.

Abnuacuatio, largissima euacuatio est, aut corpori plus æquo plethorico aut cacochymico conueniens, quæ *hypercrisis*, seu *supernuacuatio hypercatharsis* dici solet, aut quæ per patientem particulatim fit. In arte parua, cap. 95.

Acanthos, media est omnium simpliciter membrorum figura, quam sine fatigatione dixeris, optima, 2. de motu muscul. cap. 1.

Acantha, est *spina dorsi* in specie, Gal. seu *spina apex*; quem natura in spondylis dorsi est machinata, ex mediis partibus postremisque prodiens, quæ esset velut vallum quoddam ante spinam totam oppositum, quod prius ipsum contunderetur, ac cominueretur, modisq; omnibus afficeretur, quam ad vllum spondylum noxa perueniret, 12. de vlu part. c. 15. *Acantha* aut generaliter sic dicta, est spina in indiscriminatim qualiscunq; prestius, si sumatur animalium quorundam, vt echinorum piscium notat *aculeos*.

Accessio, est deterius tempus totius circuitus, quod est à primo insultu morbi, usque ad tempus consistendi, siue per tertium, siue per quartum, siue quotidie fiat, 1. aph. 12. quæ & *Paroxysmus* dicitur, & *Inuasio*.

Accidens, aliquando passionem significat, & ipsam, operationis læsionem, de diff. morb. cap. 7. quæ constitutionē unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata dicuntur, 1. meth. c. 9. *Non accidentia* vero vocant recentiores Medici ea quæ non exsistunt, vt dolore vacare, & huiusmodi, com. 1. prog. 27.

Accommodatum in corpore, dicitur id, quod quando unicuique rei seruatur, iustè quodlibet se habet, ac disponitur. 1. de fractur.

Accretio, est vniuscuiusque partis terminorum æqualis quædam promotio in triplicem dimensionem. Ioubert. lib. de paral.

Acerbum id omne dicitur, quod linguæ nostræ admotum, valdè desiccat, contrahit, & in multam profunditatem usque illam exasperat, sicut pyra syluestria imatura ab austeris sola intentione diuersum, 1. de simp. medic. fac. cap. 37.

Acetabulum, est illud cauum ossis extremi, quod capita alterius ossis alcius excipit, quod & *Coryle* dicitur, li. de ossib. in procemio. *Acetabula* adhuc sunt, vasorum & venarum, quæ ad matrices perueniunt orificia, quæ & *Cotyledones* dicuntur, quibus foetus matri aliigatur, per quæ velut per truncos quædam foetus ex matrice trahit spiritum & sanguinem, 15. de vlu part. c. 5. non secus ac Polypi acetabula, per quæ Polypus nutritur, corpora enim vasorum sunt Polyporum acetabulis per quæ similia, vt nomine etiam non alio appellentur, 1. de Sem. lib. c. 7. per quæ etiam vasa singulis quibusque mensibus

excrementitius sanguis in vuluam deriuatur, *ibidem*; quamuis nonnulli homines vuluam acetabulis carere dicant, li. de vuluæ dissect. c. 10. plerumq; etiam profundos sinus, magnis supercilijs circumdatos, tum Hip. tum alij, *Acetabula* nuncupare consueuerunt, 1. de art. 21.

Acetabulares vuluæ eminentiæ, sunt tumores valorum vteri, ex retento menstruo, quos prægnationis tempore adnatos habet, quales etiam recto intestino esse in hæmorrhoidibus solent, lib. de vuluæ dissect. cap. 10.

Achlys, seu *Caligo*, est circa totum nigrum oculi a superficialia viceratione, cicatricula tenuissima, aëri caliginoso assmilis, lib. Introd. cap. 5.

Achores, sunt manantia vlcera cutis capitis, plurimis, ac minimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus tenuis, & glutinosa effluit sanies, huic morbo affinis est *Fauus*, seu *Cerion*, in quo cum timore foramina sunt quæ in illis maiora, melleum humorem continentia, lib. de remed. parat. facil. c. 5. lib. de tumorib. c. 15. 1. de comp. med. loc. c. 8. quæ vulgus vocat *Tineas*, Arab. *Sabafati*.

Achroi dicuntur decolores homines, pallidi, & sanguine defecti, 4. de rat. viét. 115.

Aciam vocat Hippocrates Filum per foramen acus tractum, quo vel partes corporis distant inter se committere, vel caput fasciæ subiectis partibus assuere consueuimus; Nodum verò nuncupat victionem, quæ ex fascis inter se connexis, fit com. 2. in lib. de his quæ in medic. fiunt, 7.

Acidabilis, propriè *bilis atra*, aut *sucus atrabiliaris*, quid sit, exemplo ostendit Gal. Vinum quidem dulce, (inquit) quod non sum ab viuis sit expressum, feruens & alterascens ex eo, quem in se habet, calore intelligimus, ex cuius mutatione duo proueniunt excrementa; alterum leuius, magisque acreum, quod florem, alterum
grauius

gravius, ac magis terreum, quod fecem vocant; horum alteri flauam bilem, alteri nigram assimilamus, quando non eandem habent succi speciem, cuius animantis naturæ opera regitur, qualem, cum præter naturam se habet, sæpè exhibent, quippe flaua quæ est, efficitur vitellina, ita enim nominant, quoniam ouorum vitellis, tum colore, tum crassitu sine sit assimilis, nigra verò longè malignior, ea quoque quæ similis ei, quæ naturalis est, reddiditur: nomen tali succo nullum est insitum, nisi quod aliqui vel radentem eum, vel acidum appellant, quoniam acris in morem aceri est, & corpus animalis radit, & terram si supra eam sit effusus, quandam cum bullis, veluti fermentationem, ebullitionemque excitat, ubi aduentitia putredo nigro illi succo naturaliter se habenti accessit; plerique autem id quod è tali succo naturaliter se habet, quod & infra deijciatur, & sæpè supra fluat, atrium vocant succum, non atram bilem; quod verò exustione quapiam in acidam migravit qualitatem, id atram nuncupant bilem. 2. de nat. fa. ult. cap. 9.

Acidapituita est, quæ omnino cruda est omnimoda autem cruditas intelligenda est, quæ in ea concoctione insidit, quæ in venis peragitur, non autem in ea, quæ prima est, quæque in ventriculo perficitur, 2. de nat. facult. cap. 9.

Acinofia, id est, *immobilitas* est media quies, quæ inter systolem & diastolem pulsus, intercedit. 1. de dif. puls. cap. 7.

Acinesa tunica oculi, vide *Rhagoistunica*.

Acinus, vide *Staphyle*.

Acmaistica febris est, quæ continuò crescendo procedit, vt *Epacmaistica*, quæ decrescendo: *Homotona* verò, quæ similem seruando calorem ad finem vsque terminatur, 9. method. 4.

Acmen, ἀκμήν id est, maximam exercitationis, & motuum intentionem Græci vocant, 2. de sanit. tuenda c. 2. sic & ætatem integram, & summum corporis robur significat; inde translata est vox tum ad alia omnia, tum ad morbos. Sic enim Medici tertium totius morbi tempus appellant, in quo summum habet vigorem, 1. c. 13. quam mediam ætatem Leoniceus vocat eodem eph. *Constitutam*; alij *Constantem*, alij *Subsistentem*, quæ media est inter senes, & iuvenes, 1. de san. tuend., cap. 2. & 6. de san. tuend. c. 6.

Acopa medicamenta, quæ *Copon*, id est, lassitudinem ex multo, vehementique motu corpori, vel toti, vel particulis obortam tollunt, appellamus. Cæterum postea Medicis in usu fuit, etsi non ad lassitudines tantum medicamen ab ipsis sit compositum, sed vel ad dolorem diuturnum in alto corporis latentem, vel motum difficile, vel sensum stupidum, vel particulæ duritiem, vel tensionem, vel tumorem scirrholum, appellare similiter *Acopis*, modo humidam consistentiâ *Acopis* similem habeant, quæ liquidis ceratis, quibus in luxatis, & fractis utimur, est affinis, 7. de compos. med. per gen. cap. 11. etiam si gratia vehementer calefaciendi assumantur, 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Acor, est rustus quidam acidus ex præsentia ciborum corruptorum in ventriculo, 5. de usu part. c. 4.

Acorius homo, id est *secors*, quod apud eos duntaxat intelligas, qui principatum animæ in corde statuunt, 3. de placit. Hip. & Plat.; cap. 4.

Acosmia, vide *Ataxia*, in prognost. com. 30.

Acrisia vocabulum ab Hip. dupliciter viurpatur, vel cum omnino iudicium nullum futurum sit, aut prauum, com. 2. in 1. de morb. vulg. 46.

Acrorhodon, verrucarum genus dolens, estque exor-

tus orbicularis, angustam obtinens, basim, l. introd. f. 97. quam vocat *Pensilem verrucam*, 2. meth. 2. Sunt autē *Acrochordones*, vitiosi succi multi ad exteriora; & cutim repentis soboles. Aetius, & Celsus definiunt, quod *Acrochordon* sit verruca sub cute durior, asperior, callosa, plerunque teres, cuti concolor, infra tenuis, ad cutem latior, iuniores maximē infestans, sic dicta, vel quod vertice suo similis sit resectę chordę, secundum extremitatem, vel quod in imo adeo angusta sit, vt pendere videatur.

Acromion propriē est summus humerus, humerive pars summa, exterior, & prominens, brachioq; hærens. Insuper ea est compactio, qua os scapulę a spina tenuē inchoatum, paulatimque plenius effectum, ad Acromij locum peruenit, ibique brachio connectitur, Alij præter hæc ambo quę coniunguntur, tertiū os, esse inquit, quod in hominibus solum deprehenditur, idq; *Cataclida* & *Acromion* appellant, lib. de ossibus, c. 14. quod etiā *summum humerum* vocat, 1. de vsu part. cap. 10.

Actiones prisce omnes *actiuos motus* nominant, sicuti omnes, qui naturaliter se habent, nisi actiui sint pathemata, quę *passiones* Græci vocant, 2. meth. c. 3.

Actu aliquid tale esse, ex aduerso est ei, quod est facultate, vel potentia, 1. de simp. med. fac. c. 9. at quod energia siue actu calidum, frigidum, humidum, siccū, vnumquodq; tale esse dicitur, vel quod summam habet eiusmodi qualitatem, vel vincentem qualitates cōtrarias, vel ad cognati generis mediocre aliquid, vel ad vnumquodlibet a nobis est collatum. 3. de temp. c. 5.

Acuta exercitatio est, cuius celeres motus sunt, 5. de sanitat. tuend. c. 3.

Acuta febris, vide *Acutus simpliciter*.

Acutus morbus est, qui ob sui magnitudinem, & suam vehe

vehementiam, ad summum vigorem celeriter properat, & cum ægri periculo tempora sua celerrimè percurrit, 2. aphor. 23.

Acutus simpliciter, morbus est, qui intra quartumdecimum diem integrè iudicatur; *Acutus* verò *ex decidentia*, seu *delapsu*, vsq; ad quadagesimum terminatur, 2. aph. 23. *Peracutus* verò *morbus* qui ad septimum vsque diem extèditur, qui longius procedit, *Simpliciter acutus*. *Ex ætè peracutus* est, qui quartum diem attingit; *Non ex ætè*, qui septimum, *Ex ætè acutus* qui ad decimū quartum; *Non ex ætè* cui ad vigesimum vsque durat, quamquam & ipse acutus sit: quod autem ex delapsu acutum ad quadagesimum vsque diem porrigitur, 2. de dieb. decret. c. 12. *Acutum* ex delapsu, siue ex decidentia vocat, Hipp. *Acutum* adauctum, & *Acutum* ex conuersione morbū notat 3. pro. 25. *Acutas* etiā simpliciter vocat eas febres, quæ maxima ex parte continue sint 2. de cris. 12.

Acutus ex decidentia, vide *Acutus simpliciter*.

Acutus adauctus, vide *Acutus simpliciter*.

Acutus ex conuersione, vide *Acutas simpliciter*.

Adedentes, id est *Phagedæna*, lib. de aer. aq; & loc. c. 2. vide *Phagedæna*.

Aden, id est *Glandula*, conuolutio quædam est sicca, & carnosâ, vel carnosâ conglomeratio, l b. finit. medi. fol. 97. Eundem *Adenem* *Corpus carnisforme* vocat, quod utique velut cuneus quidam, vasorum diuisionibus incubans, fulcimentum ipsi tutum suggerit, vt à nullo violento casu afficiantur, 4. de vsu par. cap. 20. quem *Adenem* *Thymum* vocat, 6. de vsu part. cap. 4. Adhuc & *Adenas*, seu *Glandulas*, vocat carnosâs partes raras, & spongiosâs, quæ in alis, inguine, & collo sunt, 13. method. cap. 5.

Adeps, qui & *Axungia* dicitur, & *Saum*, differt, à pinguedine,

guedine, quod ille crassior sit, animantibusque totam naturam magis terrestrem habentibus prouenit, velut humilioribus pinguedo: At tu, si voles, oleosam, & pinguem in animalibus substantiam omnem, *Adipem* appellato, ut plerique Medici, sed & *pinguedinem* appellare totum hoc genus licet, i i. de simp. med. fac.

Adiapneustia, id est, *Impedita perspiratio*, i i. meth. 10

Adiunctio, vide *Apposicio*.

Adiutorios, id est *Oscum humeri*, quod maximum omnium est, fore nore excepto, l. de ossib. cap. 18.

Adnata tunica, quæ & *Agnata*, vide *Rhagois*.

Astringens, vide *Attrahens*

Ægilops, siue *Anchilops*, Arabibus, *Algaras*, abscessus quidam est angulum oculi, qui naribus propior est, os continens, quod erumpens, aut os exedit, aut ad angulum, vel vsque ad nares destillat, l. qui introd. dicitur, c. 15. & 5. de cõp. med. loc. c. 2 & l. de remedi. paratu. cap. 12. quod vlcus, si neglectum fuerit, in fistulam desinit, lib. de oculis, cap. 9. Est affectio ægrè curabilis propter corporum tenuitatem subiecto osse corrupto, met. l. 7. c. 87.

Æqualis ad pondus temperatura, est in omnibus animalibus, & stirpibus, ea quæ ex pari elementorum commixtorum spectatur mole, non quæ tum animalis, tum stirpis naturæ conuenit, (conuenit enim alijs, ut humidum sicco, & frigidum calido præponeret,) sicque æqualis temperatura ad iustitiam est, non quæ pondere, & mensura: sed quæ eo, quod pro dignitate conuenit, qualitatem explorat; animalia enim, & stirpes optimam, etiamque habere in suo genere temperiem dicimus, non utique absoluto sermone; cum ea mediocritas, quæ potentatem refertur, & cuiuslibet mixti naturæ accommodata est, his adsit, 5. de temp. cap. 6.

Æqualis

Æqualis inæqualitas dicitur, non in pulsibus modo, sed aliis prope omnibus, quæ pristinam naturam immutantia, siue magnitudine, siue qualitate æqualia, vel inæqualia capiunt incrementa: nam quatenus æqualitatem commutant, vocantur inæqualia: sed quatenus æquam semper mutationem assequuntur, æqualiter dicuntur mutari; sed quæ pristino constat statu, nec accipiunt parem mutationem, hæc semel inæqualia vocatur, 1. de diff. puls. cap. 11.

Æqualis morbus est, qui equales habet motus, & symptomata similia, cum non, vt inæquales morbi aliquot diebus vehementiores fuerint, postea sine aliqua significatione torpent: deinde rursus adauæti continuitatem accipiunt, sed perpetuò sibi constat; quo argumento ab Hipp. dictum est continuorum morborum, & æqualium acutiem non posse vltra diem decimum-quartum protendi, 2. aph. 23.

Æqualis pulsus est, cum omnes ictus æqualem inter se seruat proportionem, ita vt secundus respondeat primo & tertia secundo, è contra dicitur Inæqualis, 1. de diff. puls. cap. 10.

Æquinoca sunt: quæ non sunt vnius generis, quæcumque enim nomina vnam speciem in multis singularibus significant, vniuocè de ipsis dicuntur, quæ vero de multis differentibus specie, ea æquinocè nuncupantur, & res quæ ipsis subiiciuntur, ab ipsisque significantur, æquinoca sunt; com. 3. in 1. de his quæ in med. fiunt, 24.

Aerosis, quasi *Aeratio*, sanguinis portio maximè ærea, vaporosa, aeri, qui per inspirationem attrahitur, permixta, ex qua spiritus generantur pariter, & instaurantur. Quin ἀήρσις idem est, quod vel sanguinis attenuatio, & in halitus solutio, est & custodia, vel conservatio, vel restauratio spiritus deperditi ex respiratione & trans-

& transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, vapore, 11. method. 3.

Æruginosa bilis, quæ ærugini similatur, vide *Bilis pallida*.

Ætiologica, ἀιτιολογική siue *Pathologica*, medicinæ pars est, in qua ea, quæ præter naturam sunt, inquiremus, inorborum causas, accidentium concursus, & affectuum statum, 1. introd. c. 7.

Affectio sanguiflua est idem quod ἀιμορροαγία, in qua plurimum sanguinis profunditur, comm. 2. in 6. de morb. vulg. 14

Affectus præcordialis, vide *Affectus flatuosus*.

Affectus melancholicus, vide *Affectus flatuosus*.

Affectus granis, & *magnus* dicitur; aut propter præcellentiam partis laborantis, aut propter affectus magnitudinem, aut propter ipsius concoctionem, 4. meth. c. 6. spectatur autem affectus magnitudo tripliciter, ex lætæ actionis præstantia; propria affectus essentia; & ex facultate, quæ laxum corpus gubernat, 7. meth. c. 12.

Affectus flatuosus præcordialis & melancholicus est, quod plurimum, qui inclinante ætate plurima venere utitur, sub autumnum maxime inflatur, & tumescit ventris, com. 3. in 6. de morb. vulg. 12.

Affectus implicatus est, in quo multæ sunt affectæ partes, a diuersis tum morbis, tum causis morbidis oblectæ; nam potest idem homo non solum laborare ex thorace, sed etiam simul & eodem tempore ex pulmone, capite, & imo ventre, & ex jecinore decumbere, com. 2. in 3. de morb. vulg. in argum.

Affectus qui & *Schesis* dicitur, est dubia, & non certa, & firma corporis dispositio; is vero, qui firmus, & certus, & quasi habitus, *Ælexis* dicitur, 8. meth. c. 3.

Affectus,

Affectus, quos Græci *Pachemata* uocāt, passiones sunt, quæ in corporibus nostris sunt præter naturam, com. 2. in 1. de morbo vulg. 23. *Affectus* uera siue affectio- nis vocabulum, ab *Afficiendo* dictum, de multis effertur rebus, sed in medicina recessus in statum præter naturam, qualescumque ij fuerint, *Affectus*, siue *Affectiones* nuncupantur, lib. de cur. rat. per sanguinis infusionem, cap. 3.

Affectus puerilis, vide *Comitialis morbus*.

Infusio nutrimenti, Græcè *Parenchyma* dicitur, lib. Introd. c. 9. vide *Parenchyma*.

Agathon, significant apud Hipp. idem quod idoneum, naturæ nostræ congruum, certum, stabile, verum, & perpetuum, ut auctor est Gal. com. 2. in 1. de fract. Idem verò testatum reliquit in com. 1. 2. de artic. *Agathon* apud Veteres id omne dici solere.

Agerasia, id est *Infenescentia*, 1. de marcore c. 2.

Agglutinatio, vide *Prosthesis*.

Agitatio, vide *Vibratio*.

Agnata tunica, siue *Adnata*, vide *Ophthalmia*.

Agonia, est inæqualis motus ex timore, & irâ compositus; timore intro & ad vitæ principium tum sanguinem, tum spiritum una cum refrigeratione eorum, quæ in summo corpore sunt, abducente & contrahente: ira verò foras agente, & fundente calorem, simul spiritum & sanguinem, 2. de symp. caus. c. 5.

Agrestis lichen, id est *Imperigo*, 6. de comp. med. per genera, c. 2. vide *Imperigo*.

Agrypnia, id est *Vigilia*, 2. meth. 2.

Apathia, Perpetua passibilitas, ut *Apathia*, *Impati- bilitas*, lib. art. med. c. 8.

Ala quid sit, hinc patet, *Brachium* appellatur, quod inter duas juncturas humeri, & cubiti intercedit, totius brachij

chij pars: superhumeralis verò, id est, *ἐπ' ὤμης* superior humeri pars, quæ ad collum vergit, nam humerus totum id quod in dearticulatione hac apparet, vocatur: nam quod non apparet a posteriori parte, est osticapulæ, ab inferiore est id, quod dum totum brachium attollitur manifestum fit, quæ *Ala* in specie etiam nuncupatur. 1. de artic. 4.

Ala aurium, uide *Aures* uide etiam 1. Intro. c. 10.

Ala narium sunt tenuia, cartilagineaque corpacula, utrique nasi lateri a parte inferiori adnata, 1. de ossibus, c. 4. quæ etiam *pinnulas* vocant, 1. Intro. c. 10. vocant adhuc & *pinna*s, 2. de loc. affect. c. 2.

Alcaria ossa, uide *Sphenois*.

Alba vitiligo uide *Leuce*, & *Vitiligo*.

Alba pituita, consuevere Medici, quandam aquæ intercutis speciem, *Leucophlegmatian* nominare tanquã quæ vel liuida quadam pituita, vel secundum suam certe ipsius rationem alba semper manet, sed propter alios quoddam humores admistos, verum exactumq; colorem mutante constat, 7. aph. 29.

Albaras, uide *Ægilops*.

Albugineus oculi humor, similis *Albumini oui*, aliàs & *Aqueus* opposita parte vitrei humoris exterius, ante crystallinum positus, non concretus, ut alij humores, sed liquidus in foramine tunicæ ueræ collocatus, superfluitas est crystallini humoris aquea, ad ipsum defendendum sed humiditate aduersus uisibilia uehementiam, 1. de anat. uiuor. Vide *Hyalæides*, & *Crystallinus*.

Albogo, cicatrix est crassa, & profunda, ulceri inducta, lib. finit. med. non quacunque corporis parte, sed solum in scide oculi, 1. Intro. c. 17.

Albulam uocant aquas aluminosas, quin & *Rhætiæ montem*, niuihus iugiter obsitam, 8. meth. 2.

Alexipharmaca medicamenta sunt, quæ deleteria, id est, lethalia venena intus assumpta euacuant, obtundunt & fagant, 5. de simp. med. fac. c. 18. & 1. de sem. c. 16.

Alexiteria medicamenta sunt, quæ venenatarum bestiarum morsus, & ictus, aut venenosa sanant. Siqui, inquit Gal. ea quæ ven. &c. *Alexiteria* nominare velint; quæ verò medentur deleterijs *Alexipharmaca*, disceptandum cum istis de nominibus non est: nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex rerum ipsarum cognitione, 5. de simp. med. fac. c. 18.

Albacab, est illud ligamentum, quod ad musculum non extenditur, sed ab vno osse natum, continuatur inter duo extrema ossium, aut inter alia duo membra, annectendo vnum alteri, firmiter subsistit, 1. de anat. viuar.

Alica, ex genere tritici est, 1. de alim. fac. c. 6.

Alienam caliditatem vocat Arist. externā, non insitā, neq; natiuā in quocumq; rerum genere, nam hæc coque- re apta est, externa autem & extrema corrumpere so- let, & putrefacere, 2. de diff. feb. c. 9.

Alindefis fuit corporis exercitatio, quā oleo delibuti, sese in puluere volutabant. Hipp. l. 2. de Diæta.

Allantoides, vide *Chorion*.

Alopecia, capillorum defluuium est, propter vitiatos humores, sic appellata, quod vulpibus frequenter accidat, 1. de cōp. med. loc. c. 2. in qua locus affectus apparet *Scaber*, colore prorsus exanguis; de re med. part. facul. c. 6. quam etiam *Areas* vocant aliqui vocabulo specialiori, 2. met. 2. euenit autem pilis hoc vitij genus eadem ferè quā stirpibus ratione, quæ corrumpuntur, intereuntque; in- terdum penuria nutrientis ipsas succi, interdum immu- ratione huius in alienum ac contrarium.

Alphi, id est, *Vitilignes*, ex humorum vitiositate, quæ in cute est, quemadmodum etiam de Lepra planum est;

oriuntur, lib. de humor. com. 3. vide *Vitiliginum*.

Alteratio, est alimenti concoctio, vsque dum in similitudinem partis, quæ nutritur, transmutatur, 8. de comp. med. loc. cap. 6.

Alteratrix, vide *Attratrix*.

Altus pulsus, vide *pulsus latus*.

Alucoli, vide *Phatnia*.

Aluus liquida appellatur, in qua liquida deijciuntur, com. 2. in 1. prorrh. 3.

Amara bilis, ea & pallida, & flaua, 2. de dif. feb. c. 1. vide *Bilis pallida*, & *Piera*.

Amaurosis (quasi dicas *obscuritatem*) est totius in oculo lucis impedimentum, acutis morbis accidens, quæ est imbecillis facultatis animalis signum, com. 2. in 1. prorrh. 11. 20.

Ambai, vide *Ambona*.

Ambiotica medicamenta, id est, *Abortiua*, vide *Abortus*.

Amblyopia, est visus hebetudo, in qua oculi nec phlegmone tenentur, nec influxu torquentur, nec ulcerati sunt nec aliud quiduis mali perpessi, 5. de simplic. med. facult. c. 23. ob occulta quadam causa proueniens. *Ægin.* lib. 3. cap. 22.

Ambone, sunt margines siue labra, siue supercilia ceylarum, & cavitatum, 2. de vsu part. c. 17. quas quidam etiam *Ambas* appellant, 1. de art. 10.

Ambusta sunt, quæ igne vel ardenti aqua comburuntur, ita vt bullas aliquando excitent. 9. de simplic. med. facult. quæ etiam *Ambustiones* vocantur, 11. de simplic. medic. facult. Constat autem, si quis in aqua feruenti visus fuerit, hunc etiam affectum *Pericauton*, seu *Pyricauton*, id est *Ambustum igne*, nominari, 1. de com. med. per gener. cap. 4.

Amentia, vide *Ana.*

Ametria, est a iusta temperie recessus, 2. meth. c. 4.

Amiculum, vide *Chorion*.

Ammata Fasciæ Græci vocant quibus venter pectus, costæ, lumbique alligantur, 3. de sanit. tuend. cap. 2. *ἀμμά*, nodus, aut nexus est, qui fasciarum cruribus implexis, aut nex'is efficitur: qua dictione sæpè vtitur Hippocr.

Amnium vide *Chorion*

Amolynta, id est, non inquinantia medicamentâ, similia his, quæ propriè *epithemata* dicuntur de compos. med. per. gen. c. 11. *ἀμόλυντόν* Cælius Aurelianus vertit, quod attritatum manibus, nihil à se inquinamenti dimittit, c. 37. l. 2. d. morbo acut.

Amphiblestræides, seu *Retiformis*, id est, *Vericularis tunica*, quæ à cerebro ad oculos profecta; vitreum, & crystallinum humorem ambit, cuius tunicæ figura in laum diffusi, atque expansi nerui, ventriculo similis apparet, ad placit. c. 5. vocant ipsum nonnulli propriè tunicam retiformem, quod figura quidem reti sit similis, cæterum nullo pacto est tunica; neq; colore, neque substantia, sed si exemptam ipsam reposueris, in vnum accurru conjiciens, tibi plane videbere videre Cerebri portionem quandam exemptam, 10. de usu par. c. 2. vide *Chorogides*.

Amphemerina, febris est, quæ singulis diebus accenditur, atque intermissione finitur; idem enim est ac quotidiana simplex; nullâ alia sermoni adiectione facta: eam vero quæ intermissionem nō habet, non *Cathemerinam*, ut quidam sed *Quotidianam continuam* vocat Gal. 2. de diff. feb. cap. 7.

Amphismela, est instrumenti genus, quo Anatomici secant corpora, 6. de anat. adin. c. 10.

Amuleta medicamenta, quæ Græci *Periapta*, aut *Periammata* vocant, sic appellantur, quòd de collo suspēdantur, aut alicui corporis parti alligentur, l. de remed. part. fac. c. 1. quæ qualitatibus familiaritate attrahunt, aut totius essentiaē similitudine noxā depellunt, 5. de simp. c. 17. Galen. autem ea *Periammata* rejicit, quæ non vi quadam medica, sed ignota quadam ratione, aut latente efficacia, mirabilique contrarietate hominibus incognita, aliquid efficere dicuntur.

Amygdalæ, vide *Paristhmia*.

Amylum, ex tritico cibus, 1. de aliment. fac. c. 8. *Amilion* Hipp. quod cæteris *Amilum*, ita dicitur, quòd molam non sit expertum, ac sine mola fiat, vt testatur Dioscorides. Fit verò ex omni tritico, ac siligine, sed optimum trimestri. Plin. c. 7. l. 18.

Anabatica, id est *assurgens*, vide *Continua & Epacmaistica*.

Anabrosis, quæ & *Diabrosis* dicitur, est solutio continuitatis in osse, vel in vase aliquo, ex erosione ab humoribus mordacibus introducta, 5. loc. aff. vide *Diabrosis*.

Anacolle mata, medicamenta sunt restringentia fluxiones oculorum, de remed. par. fac. c. 1. quæ frontis, & temporibus imponuntur; 11. de simp. med. fac.

Anadiplosis, est accessionum reduplicatio, lib. de Typis, cap. 4.

Anadosis, est nutrimenti per venas transitus ad hepar, quòd idem est ac *Digestio*, seu *Distributio*, differens a *Diadosi*, quòd sit translatio, traditio, vel porrectio nutrimenti in singula simplicium, & inuisibilium nervorum, & arteriarum, extimarumque partium substantiam intimam nutrimento à lateribus illorum vasorum attracto, & translato, 2. de nat. fac. 6.

Analeptice, renutritoria refectoriaque vocata, est vi-

Etus ratio, 7. meth. 6. inde *Analepsis*, id est, resumptio, l. de marcore, c. 9.

Analogismus, est comparatio, & perceptio causarum morbidarum; præsidiorumque iuuantium per similitudines, ad Thrasib. c. 11. siue *Analogismus* est ratio, quæ ab euidenti auspicatur, rei obscure faciens cognitionem, 1. prog. Dogmaticorum propria, vt *Epilogismus* Empiricorum.

Anaplerotica, medicamenta sunt, quæ cicatrices crassant, atque in carne alta vulnera complent, & lymphant, lib. de Dynamid.

Anasarca, ἀσάρκα, vel diuisis nominib⁹ τὸ αἷα σάρκα quæ & *Catasarca*, *Hyposarcidium*, & *Episarcidium* dicitur, Hydropis species est prima & mitissima, in qua humidi substantia tenuis copia, & cruditates in tota inferiore thoracis regione aceruantur, habitusque totus pituitæ plenus redditur, 4. de rat. vict. 111. diciturq; *Anasarca* & aqua inter cutem, quod per carnem ille humor pituitosus crudus fluat, l. finit.

Anastoichiosis, quod reelementationem seu resolutionem in elementa dixeris, est colliquatio seu resolutio; seu dissolutio, aliquando totius corporis substantiæ, aliquando succorum, qui in venis sunt, duntaxat: quod autem ex ea colliquatione prouenit, alias ad ventrem confluit, alias ad vrinas, alias ad sudores pellitur, 3. de symp. caus. c. 2. Gal. ἀναστοιχείωσιν, ἀνάλυσιν, & συνήθησιν idem æstimare videtur, l. de symp. caus.

Anastomatica, idest, aperientia medicamēta quęcunq; valorum oscula aperire apta sunt, extergendo, incidēdo, obstructions tollendo, & diuidendo: differuntque a rarefacientibus, seu Diaphoreticis, quę cutis tantum metatus referando sudores, αὐτὴν ἀραιόθηντα διαπύου.

promouent, 5. de simpl. med. fac. c. 14.

Anastomesis, vide *Osculorum apertio*.

Anacasis, vide *Carasis*.

Anatome, est humani corporis totius, ab litarumque imprimis eius partium dissectio, & speculatio, vt sensibus, quæ in iis de litescunt, patefiant, pleniorque & faciliior earundem instituaturs curatio, lib. finit. med.

Anatripsin, id est, *refrictione m*, seu *defrictionem*, veteres Græci solent appellare, non eam duntaxat, quæ ab inferiori parte sursum dicitur, sicut compositio videtur significare, sed absolute omnem quomodocumque factam. Nos autem *Tripsim*, *frictionem*, seu *fricationem* vocamus, comm. 3. lib. de his quæ in med. 25. ἀνατριψις nomen Antiquis crebro vsurpari, τριψις autem rarum esse, testatur etiam Galen. in Hippoc.

Anchilops, vide *Ægilops*.

Anchoralis processus, vide *Ancyroecides*.

Anchyle, vide *Ancyle*.

Ancon, est cubiti gibbus, & eminentia aut cubiti flexura, vel gibbi medium cui innitimur, diciturque *Ancon*, alterum maius & acutissimum ossum cubiti, quod & *Olecranon*, hoc est, *Vlnæ verticem*, & *cubitum* vocat Hippocr. 2. de vsu part. cap. 2. vide *Brachium*.

Ancos, siue *Galianconas*, quasi musclæ cubito præditos, eos vocat Hippocr. quibus clauis augerentur eorum corpora, ex luxatione brachij, vel ex capitis humeri prolapsione in aliam, os brachij breuius euasit, 3. de artic. 88.

Ancyle poplitis, sunt partes retrorsum post genua spectantes, eiusdemque flexuræ & curuaturæ, lib. Intrad. cap. 10. vnde *Ancylas*, siue *Anchylas*, vocat difficultatis artuum motus, & ligationem neruorum, & articulorum

contractiones, vbi præ tumoris duritie, aut crassioribus infarctis humoribus contrahuntur, cum extendentibus in membrum musculis tendo non obsequitur. Id in Poplite, cubito, & digitis contingit, 7 de compos. medic. per gen. cap. 6. vide *Poples*.

Ancyoblepharon, ἀγκυλοβλέφαρον, vitium est in oculis, in quo palpebræ vel inter se, vel cum alba aut nigra oculi parte concresecunt & cohærent. In causa vlcus est negligenter, & imperitè curatum. Sanescendo enim quo diduci potuit, & debuit, agglutinatur. Ἀγκύλωσις τοῦ βλεφάρου igitur Actio, qui & πρόσφυσιν τοῦ βλεφάρου id vitij appellauit, lib. 7. cap. 66. vbi eius curationem persequitur.

Ancyroides, proci flus acutus & riguisque est in interiore parte ossis ceruicis & scapulæ, qui cum anchoræ, vel coruini rostri similitudinem referat, *Ancyroides* a nonnullis, *Coracoides* ab aliis nuncupatur, quandoquidem extrema eius pars, vti Corniculæ rostrum ad exteriora inclinat, lib. de ossibus, c. 14. quem etiam *Ancholarem*, & *Cornicularem* nominant, 1. de art. 2.

Aneurisma, est affectio, qua os in arteria fit ex vulnere, cum ad cicatricem peruenierit, quæ ei adiacet cutis, manente verò arteriæ ulcere, ea neque conglutinata, neque ad cicatricem simul perducta, neque a carne obstructa; quo fit, vt arteria sanguinem iaculetur, qui contineri non potest, lib. de tumor. cap. 11. Vbi etiam hæc addit: Dignoscuntur porro Aneurismata, arteriarum haud solum pulsibus, sed & quod cum premuntur, omnis tumor delitescat, recurrende in arterias sanguine, qui illum fecit, tenui spirituosus, & est venosi vasis dilatatio, aut spirituosæ materiæ per subsultum distributæ sub carnem dispersio. Paulus Aegin. c. 37. lib. 6. Aliis de-

scribitur

scribitur arteriarum & partium, quibus illæ implantantur, tumor præter naturam, pugni interdum magnitudinis, pulsus edens velut arteria, magnus, & molestus, qui cum premitur ex parte refugit, sed mox iterum erumpit. Causa antecedens, est arteriarum substantiæ nimia dilatatio, orificiique earundem apertio; proxima est sanguis arteriolus tenuis, ex arteria erumpens sub cutem, qui eum tumorem attulit, illicque sinum sibi efformat, in quem arteria sese exonerat.

Angina ab *Angendo*, quod angat guttur, siue *Synanche*, ex phlegmone, aliis extra collum, ut partes tumescent, aliis intra tonsillas, ut simul partes quoque afficiantur respiratione, & ægra spiratio sequatur, lib. finit. vel brevius, est tumor ad venas iugulares, siue a glutinosa, frigidaque fluxione, quam *pituitosam* vocant, siue a calida & acri, quam *Picrocholambiliosamque*, appellationis, quæ & *Cynanche* dicitur, 4 de rat. viét. 30. Tandem Hipp. omnes affectus gutturi accidentes, si spirationem quoquo modo reddant deteriorem, *Synanchen* vocat, aliis *Paracynanche*, aliis *Parasynanche* dicitur, 4 loc. affect. 3.

Angor, est natiui caloris cordis contractio, & in centrum retractio, ad quam sequitur eiusdem cordis dolor, palpitatio, & tristitia, pessimumque est signum si in principio acutarum febrium aduenerit, lib. de humor. comm. 1. de differ. puls. cap. 3. & comm. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Anguli oculi sunt interioris oculi termini, ubi palpebræ coalescunt, alter iuxta nasum, iuxta tempora alter; hic *parvus*, ille *magnus* dicitur, uterque autem *Canthus* dicitur, idest, *Angulus*, lib. introd. cap. 10. Dicuntur & *hirci oculorum*, lib. de venæ sect. contra Erasistratum, cap. 6.

Angustus pulsus, vide *Pulsus latus*.

Anhelosi sunt, qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt, quod contingit in affectionibus, multa inspiratione indigentibus, ut à cursu, aut vehementi exercitatione, & ardentibus febribus, 3. de diffic. respir. cap. 11. etiam Anhelationes *Asthmatica* vocat, 8. de simpli. Clarius autem, inquit, qui citra febre[m] densè respirant, qualiter faciunt, qui velociter cucurrerunt, ab accessione hac, Medicis Græcis *Asthmatici*, Latinis *Anhelosi* appellantur; eosdem etiam ab alia accessione, *Orthopnoicos* vocant, quod thoracis corpus rectum habere coguntur, & erecta ceruice spirare, ob timorem suffocationis; quin, & stratum circa supernas partes, ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectius faciunt, ne dormientes strangulentur, 7. de comp. med. loc. cap. 6. & 3. aphor. 26. & com. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Anima (apud Galenum) aut temperamentum activarum qualitatatum est, aut illud, quod temperamento alteratur, & organo veluti in operando utitur, 3. loc. aff. 7. & com. 5 in 6. de morb. vulg. 5. vide *Calor natus*.

Animalis motus est, qui animantium corporibus cum sana sunt pro arbitrio, voluntate, ac impetu nervorum, muscutorumque ministerio fit, quem Medici *voluntariam actionem*, siue *animalem*, appellare solent, lib. de trem. & palp. cap. 2.

Animalis virtus est, quæ ex Cerebro originem ducit, quæque ex motuum voluntariorum vigore, aut imbecillitate deprehenditur, ut virtus, quam ex corde prodeuntem agnoscimus, quam *vitalem* nuncupamus, ex pulsum debilitate; at quæ ex hepate oritur, ac *naturalis* dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio aquosis, atque tenuibus, postmodum verò crassis ad modum fæ-

cis, 1. ad Glau. 14.

Annotatio, quam *Episemasiam* vocant, est accessionis febrilis principium, 2. aph. 1. Dicitur etiam *Annotatio*, siue *Significatio*, siue *Semeiosis*, idest morborum dignotio ex similibus, ac dissimilibus cōsideratione, ante alia artis opera, *Diagnos*is, 1. de his quæ in medic. fiunt.

Annotatio incompressa, quæ hæcticarum febrium proprium est indicium, est, cum pulsus maior statim, ac velocior à cibo efficitur, sine aliquo horrore, dormitatione, pigritia, frigefactione extremorum, inæqualitate pulsus, aut frigiditatis, aut caliditatis sensu, 1. de differ. feb. cap. 9. vide *Febris significatio*.

Anodyna, medicamenta sunt, quæ ad sedandos dolores, sensum stupefaciendo parantur, sopientia & narcotica, 12. meth. 1. Eadem *Anodyna* dicuntur, idest, *Indolentia*, quoniam dolores sedantur, non tamen dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt, 2. ad Glau. 6. sed rectius *Anodyna* dolorem sedantia sunt, & facultas *Anodyna* alia re vera est, alia improprie dicitur, tanquam si quispiam hominem mortuum dicat *Anodynion*, quia dolore vacet. Cæterum, vera *Anodyna* facultas est eorum, quæ primo ordine calefaciunt, si utique in essentia tenui contineantur: at facultas eorum, quæ improprie dicuntur *Anodyna*, sed non sunt, frigidum est, quæ absoluto vtentia frigore partem obtupefaciunt, vnde & *Narcotica*, idest, stupefacientia dicuntur, 5. de simpl. medic. fac. cap. 9.

Anoa, Græcis ἀνοια, idest, *Amentia*, est ratiocinatricis functionis veluti paralytis, & abolitio, lib. de sympt. differ. cap. 3.

Anomomeres, membrum est, quodd ex dissimilibus partibus est conflatum, 7. meth. 6.

Anorexia, idest, *Inappetentia*, & ciborum fastidium;
idem

idem significat quod *Astitia*, & *Apositia*, idest, abstinentia à cibo, 4. aph. 17. vide *Apositia*.

Antecedens, vide *Antegressa*.

Antegressa causa, quæ & *Procatarchon* dicitur, est, quæ extra corpus posita, quidquam in corpore alterat, quæ & *Procatartica*, *Anticipans*, & *Antecedens* dicitur, quod eas, quæ in corpore dispositiones sunt, antegredia-
tur, 5. de caus. puls. cap. 1. quascunque dispositiones, vel motus in ipso animali præter naturam, morborum præcedentes causas nominant; quæ verò extrinsecus adveniunt, & alterant corpus, atque naturam vehementer transmutant, *præincipientes* appellant, in lib. de caus. morb. c. 2. eadem *Primitiva*, & *Initiatrice* dicitur, 6. de loc. affect. 4. eadem *Prophasis* & *Occasio* dicitur, com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Antendeixes, & *Endeixes*, sunt contra-indicationes, seu contradictiones indicationum; Item communitates, scopi, & auxiliorum materiæ, & indicationes, quæ sunt auxiliorum inuentiones, 9. method. cap. 7. vide *Endeixis*.

Anthera, idest, *Florida* appellatæ compositiones, quod colorem floridum habeant, ac prærubrum, 5. de comp. med. loc. av' *Ἰνπο* etiam dicuntur Hippocr. floridi, & robore valde perfusi, quos idem *ἑσπέρους* vocat, ut scribit Galen. capite humorum calidiorum copia repleto.

Antiaides, sunt *Tonsillæ* Latinis dictæ, hoc est, Glan-
dulæ duæ supra laryngem sitæ, quæ sibi ex aduerso in-
oris termino utrinque respondent. Item earum mor-
bus & inflammatio, aut earundem ex fluxione tumor,
eodem *Antiadum* nomine donatur, 3. de caus. sympt.
cap. 4.

Anti-

Anticardion, sic dicitur cauum illud quod est sub pectore carneum, molleque ad os ventris pertingens; vocatur etiam *sphage*; Rusus verò cavitatem eam pectoris, quæ est ad clauiculas, tradit ab Homero dici *Leucaricon* à Medicis verò *Anticardion* & *Sphagen*.

Anticipans morbus est, qui cum diuersis horis semper accedat, & remittat, præuenit quidem continuo, citiusque horas persoluit, vnde *Anticipans* dicitur, siue *Prolepticus*: quæ verò tardat, *Hystericus* siue *posterius veniens* nuncupatur, lib. de Typis, c. 3. vide *Antegressa*.

Anticheir, est magnus digitus manus, qui & *Pollex*, & *Promanus* dicitur, lib. de muscu! dissect. c. 22. *Antixep*, est digitus primus à carpo, siue brachiali incipiens, cuique per *Diarthrosim* insertus, reliquis quatuor digitis inuito inferior, & illius non recta, sed ex obliquo oppositus. Sic à Græcis dictus videtur, teste Galeno, quòd solus ipse tantum valeat, poleatque, quantum cæteri quatuor, Latine *Promanus* dicatur; quod manus actiones omnes per eos habeat firmiores, eo solo tantum roboris præbente, quantum reliqui digiti simul iuncti: easque omnes æquè cessare & aboleri necesse est, siue ipse solus, siue alii desint: itaque à *Pollendo* etiam *Pollicem* Latini appellauere. Sunt autem qui *αὐτίξερα* dictum velint, quòd cæteris digitis oppositus sit, ex auerso situs. Dicitur & *μέγας* propter magnitudinem, seu præstantiam.

Anticnemion, vide *Gastrocnemion*, *Sura*, & *Tibia*.

Antidotus, medicamentum est, quod non extrinsecus impositum, sed intus assumptum, malignas, cæcas, & latentes corporis affectiones sanat, l. de Antidotis, cap. 1. Mos est iunioribus Medicis, *Antidotus* appellare, non modo quæ aduersus mortifera medicamenta, quæque ad moriis, ictusque venenosos exhibent; sed etiam quæ

contra malas corporis affectiones, præsertimque diutinas valent, ex aliquo ulcere, aut abcessu confurgentes, 2. de antidot. c. 6.

Antispasis, id est, ad contrarium reuulsio, auertitur enim sanguis, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus: illud *Parocheusius* hoc *Antispasin* Græci vocant, 5. meth. c. 3. vide *Reuulsio*. αἰρισπᾶσαι est reuellere.

Antispasicon, id est, auxilium in diuersa reuellens, 13. method. 11.

Anthrax, id est, *Carbo*, vel *Carbunculus*, seu *vlcus escarosum*, seu *crustosum*, cui adiungitur multa partium circumstantium inflammatio, 6. aph. 45. Ortum autem ducit ex sanguine melancholico putrescente, adeoque per incensionem ardente, vt cutem deurat, Gal. lib. 2. de prælag. ex pull.

Antitasis est, cum quæ dissident ossa, ad hoc, vt è dicto admoucantur, prius retrorsum trahuntur. Hæc ad oppositum tractio *Antitasis* dicitur, aliis *Diatasis*, id est *extensio*, 6. meth. 5.

Anulus, est recti intestini orificium sphinctere musculo donatum, per sedem prodiens, quo excretionem, cum lubet, aliquandiu retinemus, sic dictus à figura, ab officio verò *strictor* dicitur, lib. introd. cap. 10.

Anus dicitur inferior corporis pars, qua excrementa redduntur, 3. de vsu part.

Apagma, id est, *Abductio*, Medicorum appellatio propria est, vulgò inusitata: quoties ossis finis, qua parte maxime cum alio committitur, abrutus est, 6. meth. 5. vide *Abductiones*.

Apantismos, est subtilissima linea, quæ ægrè videri potest, quasi tu exolescentem lineolam diceret, cui simillimæ sunt venarum quædam propaginee filorum.

araneæ, aut capillorum modo angustæ, & extensæ, quæ
venæ capillares dicuntur, lib. de dissect. venarum & ar-
ter. cap. 8.

Aparachyton, vinum meracissimum originale, cui
marina aqua non est admixta. Erant autem huiusmodi
vina generosa, atque ignobilibus aut imbecillis vinis
marina immiscebatur, indeque *τὸ παρὰ τὸν οἶνον ὄρυον*;
dicebatur, 4. de comp. med. per genera. cap. 7.

Apechema, diremptio est ossis superficialis, vel etiam
profunda in partibus ictui oppositis, lib. finit. med.

Apepsia, idest, *Cruditas*, 2. meth. 2. vide *Concoctio*.

Apeptaphymata, solitus est Hippocr. nominare *Cruda
tubera*, seu tumores præter naturam, nervosa corpora,
vertebris ipsis, atque spinali medullæ insita, exten-
dientia; causam nempe gibborum effectricem, 4. de
loc. affect. c. 3.

Aperientia, vide *Anastomatica*.

Aperistatum, idest, *Cavum* vlcus apertum, 2. de comp.
med. per gen. c. 1.

Aphonia, idest, *vocis carentia*, *privatio*, seu *defectio*,
quæ agris solet accidere, læsis duntaxat iis, quæ voci
efformandæ subserviunt instrumentis, vel etiam iis
quæ respirationi deputavit natura, vel ob recentem
quandam exolutionem, & afflictionem virtutis, 4. de
ratione, vict. 23.

Aphorismus, est ratio, quæ omnes rei proprietates
brevissimis verbis circumscribit, 1. aphorism. 1. quin &
aphorismos definitiones appellat, 3. de his quæ in
med. 32.

Aphthæ, sunt vlcera puerorum, summam oris partem
occupantia, ob mollitiem maximè facta instrumentorū,
quæ neque tactum, neque qualitatem lactis sustinent,
sed non parvam in se serosam contineant partem. Est

autem

autem serum natura abstergendi facultate præditum; adeo ut nil mirum sit, si in mollioribus corporibus quædam in superficie exulcerationes efficiat, 3. aph. 24. ex quo etiam habent aliquid igneæ caliditatis, vel adhuc quod infans lac non probe concoxerit, 6. de comp. med. loc. c. 4. & com. 3. de morb. vulg. 12.

Apices matricis, sunt processus quidam mammillares utrimque ad latera matricis ad ilia inclinantes, à Græcis *Cornua matricis* appellantur, per quæ cornua semen à propriis testiculis vulua attrahit, ut virile per collum, lib. de conſect. vuluæ, & t. de ſemin.

Apios, cibus est potus omnis qualitatis, quæ ſenſu deprehendi poteſt, expers, qui neque adſtriſtionem, neque acrimoniam, aut aliam inſignem facultatem obtinet, qualis inter humidas ſubſtantias eſt aqua, 1. de alim. facult. 8.

Aphæa, ideſt, *Ablata ſpiratio*. 2. de rat. viſt. 42.

Apoclymata, ideſt, *Abruptiones*, vide *Abduſtiones*.

Apocope, ut *ὀστέου ἀποκοπή*, *offis abſciſſio*, aph. 28. lib. 7. idem quo *διακοπή*, aph. 19. lib. 6. cum offis pars abſcinditur, & detrahitur, vide *Aoſciſſio*.

Apocruſtica, ideſt reprimētia & repellētia medicamenta, quæ adſtringendi vim obtinent, 11. meth. 15.

Apodacrytica, ideſt, de lacrymatiua pharmaca, & re-percuſſoria lacrymarum 4. de comp. med. loc. c. 5.

Apolepſis, vide *Interceptiones venarum*.

Apomeli, mellis decoctum intelligo, quod nos conſicimus aceto cum melle commiſſo, tantisper tamen ſimul decocto, quod utrorumque qualitates inter ſe vniuntur, & aceti vis retinetur, 3. fract. 49.

Aponeuroſes, ſunt tendines, quos mulculi generant, qui ad artuum fines pertinent, qui ab Hippoc. *τένοντες*

ideſt,

id est, *Chorda*, dicuntur, 3. de aliment. facult. 5. Dicuntur autem in *Aponeuroseis*, quasi deneruationes, & nervæ musculorum extremitates, 1. de anatomi. adm. c. 5. quoniam musculi in eos desinunt, 1. de motu muscul. cap. 1. vide *Nervi*, *Tendines*, *Deneruationes*.

Apophlegmatismus, medicamenta, quæ ore colluntur, aut denticibus inaduntur, omnia vna nomenclatura comprehendentes, *Apophlegmatizonta* nominant, ac eorum facultates, *Apophlegmaticas*. 5. de simplic. 20. Rectius autem *Apophlegmatismus* est medicamentum, quod pituitam per os educit ex capite, aut thorace, 6. de sanituend. cap. 10.

Apophthora, vide *A'ortus*.

Apophysis, est extranea ossis pars, instar tuberculi prominens, seu adnata appendix, li. de ossib. in proemio. ἀποφύσεις dicuntur etiam Hippocr. excrecentiæ carneæ tantum in massa carnea, & fœcu apparentes, quasque processus, ac exortus membrorum & protuberantiæ, non certæ, aut exactæ distinctiones, quales in fœtibus in visceribus contingere dicit.

Apoplexia, est ablatio sensus, & motus in totò animalis corpore, seu vehemens, & repentina totius corporis esolutio, ac stupor, 3. de loc. aff. o. & 2. aph. 41. vide *Caros*, & *Paraplegia*.

Apoplectica vena, quæ & *Sphagitides*, & *Iugulares externæ*, seu *Superficialia*, Arabibus *Guidez manifesta* vocantur, sunt quæ infernè ad aures utrinque singulæ feruntur, a quibus superficialiæ omnes, tum colli, tum capitis partes nutriuntur, 6. de usu part. & initio secundæ erat. vi. 1. *Apoplectica* vocantur, quod harum ex interceptione, & obstructione, *Apoplexia* oriatur.

Apocemmatia, ἀποεξιμμάτια, seu ἀποεξιμμάτια, id est

decubitus humorum vocantur, cum qui prius vnum membrum infestant humores, co relicto, ad alterum transeunt, 2. ad Glau. Interdum ab Hippocr. dicuntur morborum transmutationes, & transitus, vt apior. 156. lib. 6. dicuntur etiam à Galen. ἀποσκήματα corporis excrementa, quæ in alium deponuntur, totumque corpus, aut etiam partem quandam, veluti humoribus in eam decumbentibus exonerant, com. 2. in prognost.

Aposceparuismus, abscissio est ossis, cum eius pars decussa vulnerando fuerit, fracturæ species, lib. finit.

Apositi, & *Anorectoi*, more antiquorum Græcorum, ij appellatur, qui appetentia carent, & cibos refugiunt, com. 3. in 3. de morb. vulg. 72.

Apositia, ciborum fastidiū; vide *Andrexia*. ἀποσιτικά Galen. in exeg. exponit, quæ cibi fastidium & inappetentiam inducunt.

Apospasmata, auulsa omnia nominantur, de constit. art. cap. 6. quæ verò continui solutiones, *Apospasmata*, idest, *Auulsiones* vocantur, instrumentariarum tantum modo partium propriæ sunt passiones, de differ. morb. cap. 11. vide *Rhegma*.

Aposphagma exponitur Galeno: apud Hippocratem *faculenta colatura*, aut *excolamentum*, quod & ἰπρόσφαιγμα dicitur. Intelligi autem potest sanguis qui supposito vase pecudi iugulatae defluit, & excipitur, ac in cibum varia conditura formatur, vt testatur Plin. lib. 28. cap. 14.

Apostasis, fracturæ species est, quæ sub generalem affectionem subijcitur, quæ est continuitatis dissolutio, ita enim (ait Galenus) ego totum hoc genus soleo appellare; at Hippocrates, *abscedentia corpora*, quæ ita affecta sunt, vocat, vt & affectio ipsa, *abscessio*, meritò nomine

tur, tametsi vna quedam species generis huius sit, quam proprie *Abscissionem*, & *Abcessum*, idest, *Apostasin*, & *Apostema* nuncupant, 3. de his, quæ in med. initio. i. *Apostasis*, & *Metastasis*, differunt, quodd *Apostasis*, idest, *Abcessus*, iudicationem infert, ægrumque à molestijs omnibus liberat: *Metastasis* autem, idest, *Communitatio*, aliarum habet principium accessionum, vt & aliud exigat tempus ad coctionem mali aliumque corporis locum, ad quem infestantium humorem facta est translatio, 4. de rat. vict. 68. ex quibus colligitur ea inter se differre vniuersali & singulari notione. Cùm sint enim vtraque humorum in partem aliquam illapsus, & decubitus, generalius tamen quiddam ἀποστασις continet, quæ vitiosos humores felicius & velut ex toto vacuat, solutionemque facit: *Μεταστασις* autem, peculiarem partis cuiusdam depositum significat, in quam illapsi humores iudicatione vacuari nequeant, sed concoctione indigent.

Apostema, vide *Apostasis*, & *Sinus*.

Aposyrmata, Delquamata dicuntur, aut summæ cutis abrasiones. Est solutio continuitatis in superficie speciei abrasa scilicet cute. Vide *Abrasa*.

Apothepapia, nunc pro postrema parte omnis probe peractæ exercitationis sumitur, nunc pro ea medicinæ parte, quæ lassitudinem ex immodico exercitio succedentem, submouet, 3. de sanit. tuenda, cap. 2.

Apothermus, *Sapa*, *Diræon*, *Hopsema*, nomina Synonyma sunt, significantia mustum plurimum coctum, 1. de alim. fac. cap. 13. de attenuante vict. rat. 12.

Appetitus caninus, vehemens est comedendi desiderium, quo, & plurima edunt, & maxime grauati assumpta inalterata paulopost reuomunt, 7. de comp. medic.

loc. cit. 2. & 1. de sympt. caus. cap. 7. ὀρεξις ζυνώδης affectio est τῇ ἀνὸς ῥίᾳ prorsus contraria . Prouenit magna ex parte ab humore aliquo vitioso & acido , siue is pituitosus sit, siue melancholicus, qui in os ventris impactus, ipsum mordet & irritat . Talis namque mordacitatem iustioni similem inducit , & ventriculi tunicis coactis adstrictisque inanitionem perinde , ac naturalis fames inuehit , atque inexplebilem cibi cupiditatem . Itaque eorum copia grauati , coguntur cibos euomere ; deinde cibis denuò se ingurgitate ; postea redire ad vomitum, inde ad cibum , atque ab eo identidem ad vomitum, canum modo in eandem horam relabentes, à quâ per vomitum fuerant liberati . Quò fit, vt tantam ventriculus imbecillitatem contrahat, vt nihil continere possit, sed perpetua ferè laboret vomitione . Nec verò vomitu tantum reddunt ingestos plus æquò cibos , sed alui etiam profluuiò aliquando deijciunt : quò fit, vt his succedant ; & cæliacæ , & dysentericæ affectiones ; & ipsa aqua inter cutem , propterea quò tante prioris cibi concoctionem, ingestio alio ; cruditas vitari non potest .

Appositio, quæ & *Adiunctio* , & *Prosthesis* dicitur ; finis est actionis, quæ ab attrahente vi perficitur, attractum enim , & adductum nutrimentum singulis partibus apponit assimilandum , 3. de nat. fac. cap. 1. vide *Prosthesis* .

Aprychia, idest, *animi deliquium*, com. 2. in 1. prophet. 20. & 1. aphor. 23.

Apystus, i. *morbus sine sputo*, præsertim morbus lateralis, cum pars dolens exquisitè angusta fuerit, & veluti alligans in se ipsa , vniuersum fluxum cohibuerit, nec per sputum se exonerarit, 2. cris. c. 10 ἀπυστός πλεῦριτις

Pleuritides, in quibus nihil expuitur. In Coac. prænot.

Aqua inter cutem, seu *aqua intercus*, idest, *Hydrops*, vel *Hyderos*, 5. de loc. aff. 7. 4. aph. 11.

Aqualiculus, qui & *Pabes* nonnullis dicitur, & *Epife-ion*, est ea trunci pars, in quam Thorax finitur, vbi & masculorum pudenda constituta sunt, quin & feminarum, ad femoris vtriusque exortum, vt sub hoc occultentur, lib. introd. cap. 10.

Aqueus humor, qui & *Albugineus*, vide *Crystallinus*.

Aquosa urina, quæ & *Cruda* dicitur, est ea, quæ alba est, & tenuis, 1. de cris. cap. 5.

Aquosus hydrops, hydropis species ea est, quæ *Asciten* vocant, cuius proxima causa aquosus humor est, partim a iecinore manans, partim a tota carne corporis, veluti in aquam resoluta, a quo aquoso humore totum *Abdomen* distenditur, qui colligitur inter *Peritoneum*, & *Intestina*, veluti in vtre quodam, vnde illi nomen dedit, opposita alteri hydropis speciei, quam Hippocrates vocat *Siccum hydropem*, qui & *Tympanias* dicitur, vide *Ascites*, *Hydrops*.

Aquila, vide *Hydatis*.

Aracnoeides pulsus, aranæ speciem referens, siue aranealis, hoc est, paruus, ac brevis auræ agitati mouetur, lib. finit. medic.

Araotica, idest, *rarefacientia*, ἀραιωτική φάρμακα, meatus cutis aperiunt, 5. simpl. cap. 14. vide *Anastomatica*, & *Rarefacientia*.

Araneatela, ἀραχνιδής, est oculi tunica, quæ cum Rhetina perfectam sphaeram efficit, circundantem crystallinum humorem, diciturque aranea, quia ad modum telæ aranæ subtilis est, ne impediat lumen ingrediens ad crystallinum, & albugineum humorem, lib. de anat.

viu. vide *Rhagois*.

Arcuatus morbus, vide *Arquatus*.

Ardens febris, vide *Synocha*.

Area, vide *Alopecia*.

Argemon, ἀργεμον & ἀργεμα, est oculi ulcusculum, quod in iridis circulo nascitur, partem quidem aliquam candidi, partem verò etiam nigri comprehendens. Id extra quidem iridem rubicundum, intra verò candidum apparet. Per ipsum tunica vniformis aliquando proci-
dit, si profundius sordidiusque euaserit: Quo vitio qui la-
borant, ἀργεμονος vocat Galenus.

Argyrite, ἀργυρίτις γή, argentea terra, quæ ex ar-
genti metallis sumpta pluribus paruis terræ particulis,
plures paruas argenti mistas habet particulas 9. simpl.

Ariditas, est summorum pilorum lanuginosa superfi-
cies, puluere conspersis adsimilis, lib. finit. med.

Arygena, vide *Arytanoeides*.

Arytenocides, ἀρυτανουίδης guttalis, est cartilago
laryngis, tum ordine, tum positione, tum magnitudine
tertia; in suprema innominatæ cartilaginis parte sita;
gutturinis, in fundibulisq; quas *Arytenas* appellant, non
absimilis, lib. vocal. instr. diff. ca. 4. vnde aliqui eam *Ary-*
tenā vocat, & *Guttalem*, 7. de vs. par. 11. vide *Cricoeides*.

Armatura conceptus, ab Arabibus *Abgas* tunica est
postrema tenuis, toti fœtui vndique circumiecta, ipsius
velut sudorem excipiens; quali agnium à mollitie
deducto nomine, *Amnion* Græcis appellata, 15. de vi
part.

Arquatus morbus, qui & *Regius*, & *Icterus*, & *Aurigi-*
nosus, & *Arcuatus* dicitur, est bilis in summam cutim
effusio, interdum cum febre acuta, interdum sine illa,
cum interiorum adustione, & stomachi vitio, lib. Introd.

5. loc. aff. 7. Clarius, *Flauabilis*, quando sui seruans naturam, vñ cum sanguine per totum corpus defertur, morbum facit, qui *Icterus*, idest *Regius* appellatur: sola verò quando secreta est ab aliis succis, & in aliquo membro consistit, Herpetem concit. 2. ad Glau. 1.

Arteria, est vas membraneum, ortum habens à corde teres & cauum, duplicique compactum tunica, quò vitalis spiritus & tenuissimus calidissimusque sanguis per corpus vniuersum pulsu distribuitur, lib. de anat. viu. differt autem à vena, quod vena sit vas sanguinem continens, non pulsans, sed arteria vas est pulsans, lib. de caus. morb. cap. 3. quondam non dum eas, quæ similiter vt cor, pulsant, arterias (in solam eam quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriam, arteriæ nomen inferentes) sed venas appellabant, in totum velut alias, quæ non pulsant; sic etiam pulsantes, postea verò consuetudine obtinente, arteriæ appellationem in pulsantibus dici propter æquiocationem asperæ nomen apponentes, eam, quæ ex larynge in pulmonem descendit arteriam, *asperam arteriam* appellarunt, quam ipsam etiam *Bronchum* vocant, quoniam cartilaginosa corpuscula, quæ plurima eius pars sunt, *Bronchia* appellant, 7. de comp. med. 1. loc. c. 1. *Aspera* autem *arteria* dicuntur, quæ in pulmones diuisæ sunt, quæ verò toto insunt corpore, quæque ex asperis arteriis contracto corde, spiritum transumunt, *laues*, 7. de anat. ad 4. & 7. de vsu part. cap. 9. vide *aspera arteria*.

Arteria crassa, vide *Arteria aorta*.

Arteria magna, vide *Arteria aorta*.

Arteria aorta, *magna*, *maxima crassa*, synonyma sunt, significantia vnum omnium arteriarum tanquam caudicem, à sinistro cordis ventriculo propagatum, quæ omnes tum sibi inuicem, tum eorum pulsandi

modo respondent, 7. de anat. adm. cap. 1.

Arteria venosa, est vas à sinistro cordis ventriculo ad pulmonem procedens, ore rotundo, & admodum patenti, quod in ipso ferè ortu, in duos ramos diuiditur, Eorum dexter sub basi cordis productus, & in cordis inuolucrum subiens, in dextrum pulmonem multifidus spargitur; sinister verò in sinistram pulmonis partem multis propaginibus inseritur. Ambo pleni sunt aeris, quem è pulmonibus in cor transferunt. Arteria vocatur, quia pulsat; Venosa autem, quia venę tunica vestitur; quæ uero ex dextro cordis ventriculo est, Vena arteriosa, siue arterialis dicitur; Vena quidem ab usu, arteriosa autem, quoniam arteriæ corpus est duplici tectum tunica, 7. de anat. adm. 4.

Arteriæ emulgentes, sunt duæ propagines magnæ, à maxima arteria, quæ spinæ incumbit, profectæ, non aliter quam duæ uenæ magnæ, quæ in renes inseruntur, quibus renes urinam a sanguine secernunt, & trahunt, qua ratione *Vena* & *arteriæ emulgentes* appellantur, lib. de dissect. Ven. 5. 14. & 16. de usu part.

Arteria aspera, uide *arteria*.

Arteria carotides, quæ & *Soporaria*, & *Apoplectica*, & *Subiecta* dicuntur, sunt, quæ infernè a corde ad iugulum recta tendunt, atque ad partes collo superiores distribuuntur, de dissect. art. & 16. de usu part. Sic autem à ueteribus Medicis eiusmodi arteriæ dictæ sunt, quod uinculo exceptæ earum, lethargum, & apoplexiam inducant.

Arteriæ leues, uide *Arteria*.

Arteriam coniugem uocant, non eam arteriam, quæ uenæ est per membranas coniuncta; sed eam, quæ cum alteri adiuncta sit, ad eundem usum extiterit, 16. de usu part. cap. 13. nusquam enim uena ab arteria relinquitur,

sed ubi uas arteriosum uideris , ibi necesse est uenam
etiam esse, 16. de usu part. cap. 14.

Arteria, & Vena umbilicales sunt, quæ acetabulis uteri
adhærescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & alimen-
tum traxit, 14. & 15. de usu part.

Arteriace, ἀρτηριακόν. Mos est recētioribus Medicis
arteriæ pharınaca *Arteriaceas* appellare, non apponen-
tibus, num Anti lotos dicant, an iuxta aliud significatum,
quidam uerò *Eclecta* nominant ipsa, non apponentes
pharınaca ; at quidam penitus nullum discrimen ipsis
adscripserunt; aliqui uerò raro addiderunt, alii ad uoce
interceptam; alii adhuc generalius ad læsam; sunt qui &
ad exasperatam arteriam, & ad exulceratam uel inflam-
matam, ut aliquando per magnas uociferationes acci-
dit, eandem huiusmodi accommodata esse scripserunt,
7. de compos. medic. loc. cap. 1.

Arteria trachea, uide *Aspera arteria*.

Arteria coronalis, uide *Stephaniæ*.

Arteriosa vena, uide *Arteria venosa*.

Arthritis, siue *morbus articularis*, est artuum uitium,
siue articuli tumor dolorificus, quem fluxio in eum de-
cumbens excitauit, 11. method. 20. sunt & ex genere
Artritidis, Ischias, Podagra, & Chiragra: quod enim in
omnibus, aut multis simul articulis *Arthritis* est, hoc in
uno iuxta coxendicum quidem *Ischiada*, hoc est, *Coxen-
dicum morbum* appellant; iuxta pedem autem, *Pod-
gram*, iuxta manus, *Chiragram*, 19. de compos. med. loc.
cap. 2. unde *Arthriticos* uocant, qui hoc articulari uitio
laborant, 11. meth. 20.

Arthrodia, per appositam sibi articulationis speciem,
Enarthrosin, clarius intelligitur; utraque enim est spe-
cies *Diarthroseos*, id est, *Dearticulationis*; sed *Enarthrosis*
est, cum excipiens cauum admodum altum est, caputque

quòd in id inferitur, oblongum; *Arthrodia* verò, quæ tantum leue superficialium, & capitulum etiam de pressum habet, lib. de ossibus, in præm.

Articulus, est naturalis ossium syntaxis, seu compositio, vel per *Diarthrosin*, idest, *Dearticulationem*, quæ est ossium structura, quorum motus est euidens, vel per *Synarthrosin*, quæ est ossium manifestum motum non habentium compositio, lib. de ossib. in præmio. Sed rectius, *Articulus* est, cum duo ossa, ita inuicem coeunt, ut alterum quidem ipsorum sit quod mouetur, alterum velut sedes quædam ei, quod mouetur, & firmamentum, ut in ossium cardinibus apparet; unde manenti, cavitatis, (quæ *Glene*, idest, *Pupilla*, & *Coyle*) idest, *Acetabulum*, ei, quod mouetur, conuexitatis, (quæ *Condylus* dicitur) inest, 1. de motu muscul. c. 9.

Articularis morbus, vide *Arthritis*.

Artomel, idest, primum iusculum ex pane, & melle, 10. method. 6.

Artus, extremæ, & compositissimæ corporis partes sunt, crura scilicet, pedes & manus.

Arythmus, pulsus est, non is, qui absolutam abolitionem significat, omnique rythmo aut modulo orbatus est, sed is, qui nativo rythmo caret: cui opponitur pulsus, qui *Eurythmus* dicitur, 1. de diff. puls. cap. 9.

Asaphia, ἀσαφεια, est vocis obscuritas, vel propter vocem efformantium organorum offensam (quam ex nervorum vitio contraxerunt) vel propter mentis læsionem, com. 2. in 1. prorrh. 2. ἀσαφεις agri dicuntur Hipp. qui obscure loquuntur, nec clare differunt.

Ascarides, & *Helminthes*, sunt tenues & minuti lumbrici, in parte præcipue inferiore crassi intestini progeneriti; rotundi verò siue teretes lumbrici sunt vermes, qui

in superioribus magis intestinis generantur, aded vt ad ipsum quoque ventriculum quandoque ascendant; latus est, qui & longissimus est, & per tota sæpè extenditur intestina, 3. aphor. 26.

Ascensus morbi, augmentum, incrementum, synonyma sunt, significantia totius morbi, siue paroxysmi secundum tempus, 1. cris. 3. ait, vbicunque accenditur, atque augetur caliditas præter naturam, isthuc ab aliis partibus sanguinem solere confluere; quo verò tempore confluit, illas quidem partes mandantes refrigerari, priuatas sanguine, est necessarium; quòd verò patitur membrum grauari, ac distendi, ac sanguinè ipsum confluentem alterari, tum quia aliis, quæ iam putruerunt, superfluitatibus permiscetur; tum quia intrusum diffilari non potest, atque hoc tempus accessionis principium nuncupatur. Cum verò iam caliditas materiam conuicerit, tunc hoc tempus, & ascensus, & augmentum vocatur; in hoc verò usque aded calor augetur, vt non modò locum exurat, qui est quodammodo putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur; ac cum iam ad summum seruatoris deuenierint humores accensi, id accessionis tempus consistentia appellatur; tunc verò vniuersum laborantis corpus igneum videtur, extensa per totum corpus æqualiter caliditate, 2. de differ. febr. 11.

Ascia, est reuolutio fasciæ, quæ cum parùm à recto declinet, in obliquum tamen nondum vergit insigniter: à fabricorum ascia, quæ paululum à recto abiens, in summitate decuruatur, dicta, 3. de fract. 21.

Ascites, hydropis species est, in qua in membrana abdominis interiore, *Peritoneo* Græcè dicta, aut potius inter *Peritoneum* & *Omentum*, humor serosus veluti in vtre quodam continetur cum paucissimo spiritu, vnde

eam vocat Hippocr. *aquosum hydropem*, præcipua eius causa frigiditas est. Contrà, *Tympanias* (quam *siccum hydropem* vocat) in qua *Abdomen percussum* talem sonum edit, qualem *Tympana percussa*, quoniam in illis percutem extentam subiectus aer flatuosus percutitur, quemadmodum aer in hoc morbi genere, qui in profundo *Abdominis* conclusus coercetur. 4. aphor. 11.

Ascitem etiam *utricularium hydropem* vocant, lib. finit.

Aselli, vide *Axes*.

Asema, crisis est, quæcunque a nullo dierum indicantium antea fuerit indicata, unde sine signo dicitur, 3. de Cris. 10. ἀσμη πνέουσα spirationem exiguam, & obscuram, ac velut interceptam, nullamque ferè sui significationem edentem significant. lib. 6. Epidem. 3. lect. 7.

Astia, idest, ciborum abstinentia, fastidium, & inappetentia, aliquando etiam vasorum inanitio *astia* dicitur, tanquam nomine generis in specie uti liceat, 2. de rat. vict. 47.

Aspera arteria, est particula simplex in animalis corpore, quæ aliarum omnium est durissima, solo osse mollior, quam Græci *Chondron*, idest, *Cartilaginem* vocant, quam totam in exactam naturam circuli circumferentiam contorsit, circulorum multa serie continua in longitudine interiore compositorum, à pharynge ad pulmonem usque pertingens, sanguine vacua, 7. de usu part. cap. 3. eademque prout corpus est ex cartilaginibus (ut instrumentis vocis) & ex vinculis membranosis, (ut instrumentis respirationis) compositum, *trachea arteria* dicitur, ab inequalitate, & ad differentiam arteriarum leuium, ibidem cap. sexto, quam *Bronchon*

nominant, ibidem cap. undecimo.

Asperæ arteriæ dicuntur etiam, cum enervæ sanguinolentiores apparent, & magis asperæ, carnosæque, & fici acinis similes, lib. introd. cap. 15.

Aphyxia, idest, *pulsus privatio*, siue *defectio*, cum non percipitur nostro tactui motus, atque hoc per totum animal accidit, ut nulla vsquam arteria moveri videatur, quoddam tamē, si ad veritatem exigas, in corpore vivum nunquam cadit, ad nostrum tamen tactum frequenter reperitur, 1. de prælag. ex puls. cap. 3. quam Hippocrates vocat *spirituum interceptionem*, 4. de rat. v. c. 26. Quod si in quibusdam partibus arteriæ moveri videantur, in aliis verò immobiles sint, iam non *ἀσφυξία* erit, sed differentiæ species in longitudine pulsus. Galenus lib. 1. de præservat. ex puls. *ἀσφυξιοι* dicuntur Galen. pulsu privati, & in quibus motus arteriarum cordis non sentitur, lib. 4. de diff. puls.

Aspreudo oculi, est duritia, & asperitas inæqualis, quæ intra genas oritur, lib. finit.

Assa, idest, *stomachi fastidium*, & *nausea*, 4. de sanit. tuend. cap. 4.

Assidentia signa, quæ & *mox apparentia*, Græcis *συνεπύκνωτα* dicuntur, & distinguuntur à *patognomonicis*, seu passionis infallibiliter & firmissimè significatiuis signis; exemplo morbi lateralis, in quo acuta febris spirandi difficultas, tussis, pungens dolor lateris, passionis significatiua sunt; quod autem dolor ad hypochondrium, aut ad clauum perueniat, aut quoddam facilius inlatus patiens, quàm in alterum æger decumbat, assidentia signa sunt, 1. aphor. 12.

Assimilatio, & *assimilatrix facultas* est, quæ ab actione ipsa generaliter alteratrix, in specie verò *assimilatrix*

dici;

dicitur, quod id quod nutrit, alteratur, & ei, quod nutritur, simile fit, 3. de nat. facult. c. 1. naturalium actionum. prima, ac propemodum maximè necessaria, nutritio est, quæ alteratricis actionis quædam est species; est enim & concoctio, quæ in ventre peragitur, alteratio, non lecus autem & quæ in venis, quibus accedit ea, quæ in quaque est particula, post quam quarta est, quam *assimilationem* vocant, nomine quidem a nutritione dissidens, re autem non dissidens, 3. de caus. sympt. cap. 2.

Assistentes, siue *Astites glandulosi*, vel *Parastata*, vide *Glandulosi*.

Asthma, idest, creber *anhelitus*, aut *anhelatio*, affectus est, in quo propter angustiam organorum spiritus, & bronchiorum oppilationem, apparet summè moueri, vique ad operta scoptula & scapulas, thoracem, etiam citra febrem motu celeri ac denso, ut etiam in iis, qui velociter cucurrerunt, quique respirando pinnas narium mouent, quas in spirando contrahunt, expirando dilatant, comm. 2. in 3. de morb. vulg. 4. vide *Anhelosi*. Morbus hic nomen habet à symptomate: neque enim anhelatio ipsa morbus, sed mordi symptoma: namque fistularum & cavitatum pulmonis angustia, ipse morbus est.

Astites, vide *Glandulosi assistentes*, & *Parastata*.

Astragalus, idest, *Talus*, (*os ballistæ* vulgo) 3. de vfu part. c. 6. est principalissimum ossum, quæ ad pedes mouendos pertinent, in circumferentias quasdam desinens, magnum quidem, & maximis supernis ossibus dearticulatum, in medio tibiæ, & calcanei locatum, ibid. c. 8. Est & *Astragalus fruticellus* exiguus, foliis & ramis, Ciceri similis, 6. de simplic. medic. facult.

Astrictio, est densitas cutis, & necessariorum excrementorum suppressio, ad *Thrasibulum*, cap. 27.

Ataria

Ataxia, & *Acosmia*, est inordinatio decretoriorum dierum febrilium. *Cosmon*, idest, *ordinem*, appellauit Hippocrat. decretoriorum ordinem dierum; vtenim *Acosmias*, idest, *inordinationis*, proprium est *Ataxia*, idest, *inordinatio*; ita *κόσμου*, idest, *ordinationis*; *ταξις*, idest, *ordinatio*. Et ob eam rem appellauerunt mortales vniuersum hoc, *Cosmon*, argumento ordinationis, 3. prognost. 7.

Ater succus, est melancholia, quartus naturalis humor in ordine, frigidus, & siccus, sanguinis limus velut & fex, quem humorem, cum ex vitione quapiam, ac putrescentia, in acidam migravit qualitatem, *atrambilem* nuncupant, siue *radentem*, 2. de natur. facult. cap. 9. vide *Acidabilis*, & *Melancholicus humor*.

Athera, vide *Atheromata*.

Atheromata, *Steatomata*, & *Melicerides*, alii quidem inter Abscessus reponunt, alii verò ad aliud genus referunt; omnes tamen tumores præter naturam sunt, quorum natura ex ipsis nominibus patet, puliculæ enim, aliquid simile, quæ αθήρα dicitur, in ipsis atheromatibus inuenitur, melli verò in ipsis meliceridibus, seuo autem, in ipsis steotomatibus, lib. de tun. cap. 5. ipsum verò *Atheroma* Græci quoque αθήρον vocant, 14. method. cap. 14.

Athymia, idest, *animi deiectio*, *desponsio*, ac *desperatio*, 6. de loc. affect. cap. 1. αθυμος significat eum qui animo est abiecto & desperato, quique animum despondet, lib. 3. Epidem.

Atrabilis, vide *Acidabilis*, & *Ater succus*.

Atroos, est secretio & alteratio p.n. subito facta, violenta, dolorosa, ex ipso diuidentium genere, videturque in omnibus sensibus, ex secretionē, ac diuisione continui,

nui. vñtiq; corporis, dolor excitari, cum sensoria, vel uniuersa, vel inagnis portionibus, & celeriter (quod Græci ἀθρόως vocant) diuiduntur, aut alias affatim corruptiue alterantur, incidit, i. de sympt. caus. c. 6. ἀθρόον, astrictum, densum & in seipsum contractum signat. Contrarium est distracto, atque disperso.

Atrophia, est talis species, cum particula aliqua corporis, vel diminutè alimentum attrahit, vel non trahit, vel perperam trahit, unde corpus non nutritur, siue id quidem, quodd nutrit, & quantum & quale esse oportet, suppeditetur, siue non. Cæterum symptoma aliquod in retentricæ facultate incidit, simile his, quæ in ventre sunt dicta, quod nutritionem tollit. *Atrophia* quoque excreticis vitio accidit, cum plus quam opus est, vacuatur, de sympt. diff. cap. 4. & i. method. 9. Est adhuc quædam *Atrophia* in oculo, cum ex longa imbecillitate, vel alia quadam latente causa, paululum quasi propulsus, deinde cauatus ad radicem, cum dolore minor euadit, obscurèque, aut nihil omnino videt, lib. Introd. cap. 15. ἄτροφοι dicuntur, vt ait Plin. lib. 22. c. 25. qui cibum non sentiunt, idest, qui non aluntur.

Atrophuse, ἀτροφῶσαι, idest corporis particulæ, quæ ex nutrimento fructum non sentiunt, 2. meth. cap. 7.

Attonicus morbus, idest, *Apoplexia*, 2. aphor. 19. quem & morbum stupidum vocant, 8. de placit. cap. 6. Est autem obstructio principij communis neruorum, sensum motumq; omnibus corporis partibus repente adimens, & principes actiones offendens.

Attratrix virtus est, quæ peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere & attrahere potest; altera quæ generatim *alteratrix* dicitur, qua succus attractus similis euadit parti, quæ alitur, quæ membratim

in hepate, *sanguificatina* dicitur. *Retentrix*, qua pars attractum succum coquit, donec in suam ipsius naturam eum mutauerit. *Expulatrix*, quæ a concoctis quod inutile est, secernit, idque *excrementum* vocatur, 5. de loc. aff. & cap. 7.

Attrahens, siue *Attrahoria*, siue *Epispastica facultas* est, quæ ex alto vehementius attrahit propter essentiam calidam, & tenuium partium siue talis essentia sponte nata sit, siue ex putrefactione acescente generationem sortita, directe opposita est repercutienti, & adstringenti virtuti, quæ in altum occurrentes, sibi succos repellit, 5. de simplic. cap. 17.

Auditorius meatus, est rotundum foramen, quod ad aures pertinet, non solum usque ad Cerebri membranam pertinet, sed etiam neruum auditorium contingit, qui in ipsa Cerebro descendit, 6. method. 6. quod & *cæcum foramen* dicitur, lib. de neruor. dissect. 6. Græcè *τυφλὸν ὀπήμιον*, vide *Aures*.

Auditus grauitas, vide *Obauditus*.

Augmentum morbi, vide *Ascensus*;

Aures, qua frons ad tempora porrigitur, in ipsius terminis sitæ sunt, quarum pars aperta, *Ala* dicitur, refracta ab interiori, in posterius, ipsis summitatibus inflexis Cubiformis, sub qua semicirculus rotundus in mucrone exurgens, Græcè *χρυσῆρ* appellatur, huius acumini concavum quod subiacet. *Conchula*, in cuius medio, quod conspicitur rotundum foramen, *meatus auditorius* nuncupatur, lib. introd. cap. 16.

Aures cordis, sunt duo sinus cordis, concavi, nigriores, nervosiores, & magis cuticulares: membranosioreque corde, in utraque cordis parte, sinistra & dextra collocatæ ad similitudinem aurium, 7. de anat. adm. c. 9.

Nominatæ autem porrò ita sunt, non ab utilitate, aut actione aliqua, sed à parua similitudine, quòd vtrinque cordi ipsi, vt animalis capiti, aures adiaccant; 6, de vsu part. cap. 15.

Aurigo, & Auriginosus, vide Arquatus.

Autopsia, est eorum observatio & memoria, quæ proprio intuitu vnusquisque inspexit, de part. art. medic. cap. 2. Vocabulum est Empiricæ sectæ proprium, quo significabant memoriam eorum, quæ frequenter & eodem modo visa essent.

Autopyrus, qui & *Syncomistus* dicitur, panis genus est, quòd ex farina uniuersa comportata, confusa veluti & permista, non discussis fufuribus, constat, libr. de ren. affect. dignot. cap. 6. *Syncomistum panem* vocant, qui mediùs est inter exquisitè purum, & fufuraceum; vocant autem nonnulli eundem panem *Autopyrum*, quoniam ad puri panis confectiõnem farinam, non qualis natura est, talem ad consueiendum panem assument, sed prius purgantes fufur excernunt: contra autem, in fufuraceo prius adimunt eam farinæ partem, quæ purissima est; panis autem, qui *Autopyrus* appellatur, qualem habet ex natura farinam triticum, talem etiam seruat, 2. ad Glauc. 7. αὐτὸς ὁ αὐρὸς, idest, ipsum triticum totum.

Anulsa, vide Anulsiõ, & Apospasmata.

Anulsiõ est, cùm ossa, quæ membrum colligant, diuulsa dicuntur, com. 3. in lib. Hipp. de his quæ in medic. 31. vide *Vnionis solutio*.

Axes ipsos, *Asinos* appellare consuevit Hippocr. & paruos axes, *Asellos*, quas etiam *Succulas* vocant, 2. de fract. 48.

Axillaris vena est, quæ per axillam percurrens, maior humerali per totum brachium in ramos scinditur

duos, superiorem, inferiorem, externum, internum; ille *vena hepatica*, 3. de anat. acm. cap. 5. hic *subalaris, basilica*, & *vena cubiti interna* appellatur, lib. de anat. vir. & contra Eriastratum, cap. 6.

Axiomata, propositiones indemonstrabiles vocant, 1. meth. 4.

Axungiam, omnes soliti sunt vocare *adipem suillum veterem*, 1. de comp. me. 1. per gen. c. 4. Dictum Latinis à *Axungia*, quod axibus rotarum inuagendis accommoda sit. Acceptum tamen Græcis nomen, neque *suillo* *adipi* tantum attributum, sed & *τράγισιον ἀζούργιον* *adeptus hircinus* dicitur, Gal. vi. de *Adeptis*.

Azygos vena, est propago, ex eadem caua superioris trunco exoricens, parte dextra, & octo costis inferioribus inserta, quam sub corde oriri semper a se obseruatum fuisse, testatur Gal. 5. de loc. aff. 2. & initio secundum de vict. rat. & 2. de vsu part. in iis videlicet corporibus, in quibus thorax longior erat: nostro verò sæculo propter thoracis breuitatem, supra cor, & pericardium, exoritur, ad quintam plerumque thoracis vertebram: & per eiusdem ramulorum officia aperta materia pleuritica effunditur. Capiunt ex ea nutrimentum, tum costæ octo inferiores, tum earum spatia, iisque propinqua dorsifimedula, & thoracis membrana, & qui spinæ eo loco inseruiunt muscoli, eiusque rei gratia in octo pluresue ramulos finditur. Ac cum natura omnes venas geminas creauerit, vnâ dextram, atque sinistram, hæc dextra tantum est, eamque ob causam *ἀζούγης*, à Græcis, & vulgò ab Anatomicis *vena sine pari* dicta est. Verum natura ne sinistrum latus alimento suo defraudaret, in id interdum insignem ramum mittit, qui perinde in sinistrum, atque ipsa *Azygos* in dextrum sese explicat.

Azymus panis, idest, fermenti expers, 1. de alim. facul. cap. 2.

B

B *Allisteos*, vide *Astragalus*.

Barycoia, *Obanditus*, siue *Obanditio*, est auditus grauitas, & difficultas, proportionem respondens *Amblyopia*, quæ est vilus hebetudo, siue diminuta visio, 1. de caus. sympt. cap. 4.

Basilare os, quod & *os Palati*, *os Cunei*, *os Sphenoidis* dicitur, est os, quod toti *Caluariæ* subternitur, quod a nonnullis inter *Capitis*, ab aliis, inter *Maxillæ* superioris ossa (cum inter vtrumque sit medium) numeratur, cap. 1. lib. de ossib. & in fine, 1. de usu part.

Basilica vena, vide *Axillaris*.

Basis cordis, quam alii *caput visceris* appellant, est vertex cordis, figura turbinata, quæ & circulus est, 7. de anat. adm. cap. 3. quam & *mucronem* appellant, 2. de placit. cap. 4.

Bathmides, sunt sinus quidam, ac cavitates in brachij osse vtrinq; singulæ, in quas extendentibus totam manum, & flectentibus, Cubiti ipsius *Coronæ*, siue proclivus ingrediuntur. Conditæ sunt à natura ac vel præter modum flecteretur cubitus, vel tantum, etiam extenderetur, & in posteriorem partem recederet, quantum modo adducitur in anteriorem, 2. de usu par. c. 15.

Bechica medicamenta sunt, quæ tuum sedant, vel ciunt, 1. de simpl. cap. 1.

Belenoeides os, vide *Graphioeides*, & *Lithoeides*.

Beneolentia dicuntur, quorum vapores a corporibus defluentes aeri ambienti permisti, ac deinde per narium inspirationem in Cerebrum delati, familiares sunt Cerebri naturæ, & animali spiritui, proportionem quadam ad ea, quæ linguae sunt dulcia; è contra,

græneolentia, 4. de simplic. 22.

Berenicium, quod est *nitrum*, vel *spuma nitri*, valens maxime ad vulnera neruorum, 6. de compos. medic. loc. cap. 1.

Bilis simpliciter si proferatur, siue *biliosus humor*, audimus pallidam & amaram, non acidam & nigram: hanc enim semper cum adiectione nominamus, appellationi humoris colorem adiungentes, lib. de tum. cap. 9. *Bilis*, sine adiectione, *flauam* & *amaram* significat; sed cum adiectione, *bilis atra*, humorem melancholicum, 7. aph. 32. & 1. de nat. hum. 27. & com. 5. in 6. de morb. vulg. 14.

Bilis acida, vide *Acida bilis*.

Bilis æruginea, vide *Bilis pallida*.

Bilis amara, vide *Bilis*.

Bilis atra, vide *Bilis*.

Bilis flaua, vide *Bilis pallida*.

Bilis isatodes, vide *Bilis pallida*.

Bilis nigra, vide *Nigra bilis*.

Bilis pallida est, quæ ex bile syncera, & tenui aquosa, ferosaque humiditate, ex qua etiam vrina sudorque, prouenit, constat. *Flaua* verò, quæ & *Vitellina* dicitur, calore pallidior, tenui humiditate constans, sed crassiori quàm pallida, crudo vitello ouorum, & colore & consistentia similis, in vasis genita. *Porracea* verò, in ventriculo genita, pororum colori similis: *Æruginea*, quæ ærugini assimiliatur: *Isatodes* autem bilis, quæ ab Isatide cæsum colorem referente, dicta est: sic etiam & *rubram*, nonnulli bilem nominarunt, quæ consistentia ad tenuem sanguinem proximè accedit, sed quoniam non concrefcit, idcirco *Bilem* eam nominant, lib. de atra bile, cap. 2.

Bilis porracea, vide *Bilis pallida*.

Bilis radiens, vide *Acidabilis*.

Bilis rubra, vide *Bilis pallida*.

Bilis vitellina, vide *Bilis pallida*.

Bis-feriens pulsus, vide *Dicrotus pulsus*.

Bissum corpus est, cuius pectus primum in partem anteriorem redditur; *Rhebum* autem; cum posteriores partes, quæ ad spinam pertinent, gibbæ redduntur, lib. de caus. morb. cap. 7. *παιβός*, *incursum* & *obortum* significat, & propriè *Varus* dicitur, cruribus recurvis & contractis; cui cura sunt introrsum obtorta. Dicitur & *ποικός*, Ei opponitur *βλαισός*. *palsus*.

Blena, siue *Mucus*, *μύζα*, est humor per palatum, & nares delinens, concocius, adeoque crassior, minusque acris, & mordax, propterea & crassior pituita ab Hippocrate vocatur, lib. de totius morb. tempor. cap. 5. & 2. de scind. cap. 6 *βλέννα*, siue *βλένα*, frigidus humidusque succus, quem omnes homines *φlegμα* vocant, ut scribit Galenus, lib. 2. de facult. nat. vide *Phlegma*.

Borborymos, est sonus, vel murmur, in crassis intestinis factum a flatibus, cum excrementorum sunt vacua, humidum excrementum denuncians, & flatum in humore versari. Flatus namque siccior cum sono prodiens, *βόμβος* nuncupatur, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide *Physis*.

Bothor, vide *Exanthemata*.

Bothrion, est ulcus cauum, corneæ tunicæ in oculo, paruum, angustum, puncturis rotundis simile, vlcusculo altius, lib. introd. cap. 15. sic dictum est a cavitare, quasi fossula, *βόθρος* enim *foveam* significat. Differt *ἀπὸ τοῦ κοιλώματος*, quod hoc amplius, & rotun-

dus

dius sit *Bothrio*, sed ininus profundum. Est & *Βόθριον* autore Galeno, cuiusque dentis alucolus, & canas. vide *Phatnia*.

Brachiale, quod Græci *Carpan* dicunt, Arabici *Ras-cetta*, est prima pars palmæ manus, octo constans ossibus, in superficie leniter gibbis, sinuatis intus, 1 br. de ossibus, cap. 18. cuius inferior pars (quatuor ossibus, quæ quasi post brachiale, vel metacarpium dixeris) colligatur, ibid. cap. 16.

Brachichronius, vide *Polychronius*.

Brachium, totius manus pars maxima, cuius termini infernè sunt articulus, qui in curvatura cubiti est, quem *Ancona*, siue *Cubitum* cui innitimur, vocamus; superne autem rursus, *humeri articulus*, lib. 2. de motu muscul. c. 2. *Brachium* insuper appellatur, quod inter duas iuncturas humeri, & cubiti intercedit, totius brachij pars: *Super-humeralis* verò, id est, *Epomis*, superior humeri pars est, quæ ad collum vergit: nam humerus totum id, quod in articulatione hac apparet, vocatur: nam quod non apparet, a posteriori parte, est os scap. æ, ab inferiori est id, quod dum totum brachium auctum manifestum fit, & *ala* nominatur, 1. de art. 4.

Bradypepsia, est imbecilla & imperfecta cibi concoctio, vide *Concoctio*.

Branchos, alias, *raucedo*, *deffillatio*, & *Coryza* nominatur, 5. de sanitat. tuend. cap. 8. Qualis in ventre, diarrhoea passio ex mala concoctione fit, tale *αδρηνξ* est in Cerebro Catarrhus; & *Coryza*, Catarrhus scilicet est, cum, quod superuacuum est, in os diffluit: *Coryza*, cum in nares: *Branchos* autem, siue *raucitas* Catarrhis superveniens fit faucibus humore imbutis, quod si in Gargarionem fluxio procumbit, aut (quam ex simili-

tudine, Greci *σταφύλην*, idest, *aeinum* vocant) in-
 vuulam, hanc in tumorem attollit: at si in Glandulas,
 quæ sibi ex aduerso in oris termino vtrunque iacent,
 Antiadas: si autem in ea, quæ his proxima sunt humo-
 rum fiat decubitus, oriuntur Paristhmia, 3. de sympt.
 caul. cap. 4.

Bregma, Latinè *Synciput*, est pars anterior capitis
 supra frontem sita, & a lateribus ad tempora, vsque
 protensa. Ea constat duobus ossibus propemodum qua-
 dratis, quorum vnum dextrum, alterum sinistrum est,
 Ambo autem parte quidem posteriore lateribus suturæ
λαμδοειδίους, anteriore verò sutura coronali, a late-
 ribus *προκολλήμασι*, siue suturis *λεωιδειδείσι*,
 superiore denique ea sutura terminantur, quæ vtrique
 communis est, & secundum longitudinem capitis recta
 procedit, *ὀβελία* in nominant, constant; vt & reliqui
 ferè omnia crani ossa, duabus squamis, inter quas valdè
 fistulosa raraque apparent, nisi quæ temporum ossibus
 coniunguntur: hic enim tenuissima quidem sunt, sed so-
 lida & minimè fistulosa, Nec frustra quidem hæc ossa
 machinata est, quod toto vitæ decursu tenuia, & hali-
 tuola cerebri excrementa maximè per synciput diffusi
 oportebat. Est enim cerebrum eà cranij parte quam re-
 liquis copiosius. Sunt qui *ἀπὸ τοῦ βρέχην* dictum pu-
 tent, quod hæc pars capitis humidissima molliissimaque
 sit, præsertim infantibus, vt videri possit *βεβρέχθαι*,
 hoc est madefacta esse. Ex quo fortè etiam ob hoc uices
 partem eam *fontem capitis* appellant.

Brenis pulsus, vide *Pulsus latus*.

Bronchia, sunt asperæ arteriæ cartilagines, penè cir-
 culares, in totum pulmonem diuisæ, & sigma literæ fi-
 guram referentes, 4 loc. affect. cap. 8. hæc cum in medio
 crassiores

crassiores sint, extremis partibus attenuantur, & tandē in membranam degenerant, qua parte œsophagum respiciunt, eique incumbunt, eandemque constructionem per totum pulmonem sparsē habent, membranas plures sortitæ sunt: vnam quidem propriam, quomodo & ossa omnia, & præter eam alias duas, vnam internam, crassam & validam, sed tenuem; alteram externā, proprię membranę pertinacissimē connatam: quibus omnibus cartilaginee illæ sibi inuicem connectuntur. Dicta sunt *Ερόγχια* diminutionis forma ἀπὸ τοῦ βρόγχου, quod *asperam arteriam* significat. Vide *Arteria*.

Bronchocele, idest, gutturis tumor magnus & rotundus, aut in aspera arteria exoricens: vtrumque enim *βρόγχος* significat, 2. de comp. medic. loc. c. 17.

Bronchus, idest, *trachea arteria*, ita dicta, quod maxima ex parte cartilaginibus constet, quæ *βρόγχια* appellantur, 7 de vlu part. c. 11. vide *Aspera arteria*.

Bubo, βουβών, est tumor, præter naturam, in collo, & secus aures, vel inguina, emissaria veluti communia iis, quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte, vel prope magnam arteriam, aut venam cauiam vlcus est natum, ortus, 13 method. cap. 5. vide *Scruma*.

Bubonocèle, est tumor mollis in inguine factus, peritonæo, [idest, membrana interiore] plus nimis dilatato, vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, diciturque *ramax in inguine*; quod si Umbilico hoc accadat, dicitur *Exomphalos*, libr. de tumor. capit. 16.

Bulimos, est vehemens esuritio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta, 1. de caus. sympt. c. 7. Symptoma est malę affecti oris ventriculi, quo primum quidem ægri expleri cibis nequeunt,

paulò verò post destituuntur prorsus appetentia, animo linquantur, viribus deficiunt exoluuntur, decolores sunt, torquentur stomacho, refrigerantur corde, & extremis partibus, pulsusque habent admodum obscuros. Differt autem *Bulimus* a *canina appetentia*, quod ille sit casus potentiae naturalis appetitiuae, tractricis, & concoctricis, ex frigidityte exteriori, qui a fame quidem inchoauit, sed non habet eam amplius adiunctam; Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores acidos, melancholicos, lancinantes, & venarum suctioni similem sensum inferentes, quos exorbuit os ventriculi, 2. aphorism. 21. Præterea verò inter se differunt, quod in appetitu canino, propter insatiabilem ingluuiem vomitiones perpetuae infestent, Bulinus autem sine vomitu sit.

Bulla, id est, *pustula oculis nata*, 9. de simpl. medic. facult.

Bursa testinum, est communis tunicarum, vtrumque testem cooperientium, rugosus sinus, vtrique testiculo circumdatus, οχεον Græcis, Latinis *Scortum*, aliis *Scrotum* dicitur, lib. ac dissect. vuluæ, & Intro. I.

C

Achexia, prauus corporis habitus est, 1. met. 9. Contraria τοῦ οὐρεῖα: (hæ autem duæ sunt τοῦ ἰγῆως differentiae, Medicis supra cæteras viurpatae. Etenim autem solidaru in corporis partium deprauatio, qua alimentum omne corumpunt. Habitus enim corporis ipsæ solidæ partes appellantur, quas continentia Hippocrates appellauit. Hic ubi permultum recessit à naturali temperamento, tertiam alimenti concoctionem, quæ

in ipso, hoc est, in solidis partibus peragi debet, in al-
 perficat, alimentum corrumpit, & in qualitatem a na-
 tura alienam depravat: Inducitq; cacochymiam (quam
 perpetuo illa coniunctam habet, cum è contrario non
 sit necesse, vbi cacochymia sit, illic esse protinus & ca-
 chexiam) atque omne excrementi genus, inde *Cacheri-*
cus, id est, *mali habitus homo*, lib. de cur. rat. per sang.
 cap. 19. vide *Habitus*.

Cocochymia, vitiosus succus, seu redundantia vitiosi
 alicuius humoris in toto corpore; vide *Plethora*.

Cacoethe ulcera, ex discipulorum clarius intelliguntur;
 quæ enim ex humorum confluxu vel multorum, vel
 acrium oriuntur, ita ut locus affectus hanc dispositio-
 nem qua id, quod influit, licet bonum sit, tamen ipsum
 corrumpat, non habeant, *Dyspeptora* nomino; quæ
 verò dictam dispositionem iam obtinent, præcipuo vo-
 cabulo *Cacoethe*, id est, *maligna*, appello, i. de compos.
 medic. per gen. cap. 18. sed generalius, quæ ulcera
 omnibus rite decenterque factis non sanantur, ea Me-
 dici *Cacoethe*, id est, *maligna*, *consumacia*, *rebelliaque* di-
 citur, 4. meth. 5. Adhuc generalius, *Cacoethes* morbos,
 id est malignos, appellamus, quicumque periculum mi-
 nantes, spem salutis non adimunt; nam quòd summè
 perniciosum existit symptoma, non *Cacoethe*, sed *morti-*
ferum dicitur, com. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacopbonia, id est, *vitiosa vox*, de sympt. differ. c. 3.

Cacosphyxia, id est, *vitiosus pulsus*, circa pulsum
 actionem est symptoma, ibid. c. 4.

Cacotrophia, id est, *vitiosa nutritio*, ibid.

Cairos, occasio & opportunitas rei cuiuslibet agen-
 dæ, quomodo apud Hippoc. *καιρός ὁρῶς* dicitur: Item
 tempus, propriè pars anni, quæ & *ἔρπαι* vocatur. Dicitur
 & in morbis spatium id temporis, quo insignes in-

lis mutationes sunt. Habent enim & morbi sua tempora, a temporibus anni & ætatibus non valdè dissimilanea, insignioribus, ut & illa, mutationibus distincta, quæ quadruplices à Medicis annotantur, à quibus totidem morborum tempora statuuntur, ἀρχή, principium αὐξήσις augmentū seu incrementum, quod & ἀνάβασις vocatur & ἐπίδοσις vocatur; ἀρχή, vigor, seu status, παραρχή, declinatio. Hæc quatuor tempora non modò in vniuerso morbo, sed in singulis etiam totius morbi accessionibus spectantur, illa, vniuersalia, hæc particularia appellantur. Non est autem ea facile in singulis morbis definire, quia pro morborum causarum, symptomatum, naturæ, virium, & reliquarum substantiarum varietate variis quoque spatiis signisque distinguuntur. Summatim quidem & in genere circumscribi possunt, ut principium dicatur primus morbi motus: incrementum tempus id, quo non modò ipse morbus, verum eius etiam symptomata grauiora fiunt: status autem in quo ea quodammodo consistunt, neque augescunt, neque se remittunt: declinatio verò, cum primum decrescere incipiunt, donec morbus ex toto desierit. Particulatim verò, in singulis morbis cuiusque horum exordium finemque exprimere, & certos limites assignare difficile.

Calchoeidea ossa, sunt tria ossa parua circa calcaneum posita cuneiformia, quæ certis nominibus carent, inferiori lauiiformis ossi per synarthrosin copulata, cum quibus etiam exterior ex parte *Cyboeides* pariter connectitur, 3. de usu part. & de ossibus, cap. 24.

Calcaneus, seu os *Calcis*, quòd Greci πτέρων vocant maximum, & principalissimum est pedis os, ad firmationem pertinens, quòd *Astragalo* subest, 3. de usu part.

part. & de ossibus, cap. 24.

Calcis os, vide *Calcaneus*.

Calculus, siue *Calculosus morbus* est, vbi in renibus ex collecta crassorum humorum copia, a calore immoderato calculi generantur, libr. finit.

Calefcere & *calefactum esse*, non parum refert dicere, exemplo lebetis, & aquæ calidæ: feruens enim aqua in frigidum lebetem injecta, vel feruens lebes aquam frigidam excipiens, illic quidem aqua calefacta est, & lebes calefit, iuxta typum putridarum febrium, hic lebes calefactus, aqua calefit, ad morem febrium hæcticarum, 1. de differ. febr. c. 2.

Calidum, hoc ipsum verbum aliquando transferimus ad qualitatem, cuius proprium nomen est *caliditas*, aliquando denominatiue totum corpus. Dicimus *calidum* a caliditate; estque hic modus loquendi plurimus in omni vita, 1. aph. 14. Sæpe etiam Hippoc. a qualitatibus nominat elementa, calidum quidem appellans, neque solam qualitatem, neque quod ab eis exuperantia dicitur, sed corpus, quod summani participat qualitatem, vt ignem, 1. de elem. c. 8.

Callicreas, siue *Pancreas*, caro glandulosa est, substructa arteriis, venisque ventriculi, quæ ea parte in ramos capillares finduntur, lib. de ven. & art. dissect. cap. 1. vide *Pancreas*.

Callosum corpus, id est, *calli naturam referens*, regio quædam in cerebro est, in qua naturalis concavitas esse videtur, quæ ex superiacentibus, & circumdati corporibus, portione in alimenti non perfecte elaborati, (*Peritoma*, siue *Recrementum* vocant) recipit. 9. de anat. adm. cap. 3. quod *Recrementum* ab Aristot. *Excrementum* dicitur, lib. de instrument. odor.

Callus, idem quod *Clavus*, Græcè *τέλος*, 6. simpl. diciturque

diciturque etiam *Tophus*, ex crudo humore, qui crassus est, ac similitudinem puris crassioris, 10. de comp. med. loc. cap. 2. vide *Myrmecia* & *Tylosis*.

Caluaria, sine *Cranium*, os capitis appellatur, lib. de ossib. cap. 1. vide *Cranium*.

Calunata, *Ferramenta* appellat Hippocrates, quæ rotunditatem quandam leuam in extremis partibus habent, cuiusmodi sunt specillorum capitula, & quæ *Nucleata* appellantur, & *Spatularia*. *Oblonga* verò his contraria nuncupat, quorum extrema minime sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionem & cataractam punitione tollendam accommodata instrumenta quodammodo similia, 1. de artic. 43.

Caluities, est capillorum defluuium, propter humorum ex quibus nutrirî consueuerunt, inopiam; si verò propter eorundem humorum vitium corrumpantur, & cadant, non *Caluities*, sed *Alopecia*, *Area*, & *Ophiafis* dicitur, 1. de compos. medic. loc. cap. 2. vide *Madarosis*. Capitis sanè cutis, pueris, mulieribus, & Eunuchis humida est; sed Caluis immodicè arida. Cerebrum quidem in iuuenibus molle cum sit, atque humidum, Caluariam tangere, omnemque interiorem inanitiem complere; in senibus verò siccescens subsidensque ab ea distare sæpius in animalium dissectionibus conspiciamus: in quibus caluescentibus syncipitis ossa, fistulosiora aliis, & molliora, ac superincumbentia ob Cerebri distantiam exarescunt, cum ad ipsa usque non pertingat, neque ea attingere possit: subidet enim, in suamque, ac ipsius basin depressum cadit: consequenter igitur, ossibus istis resiccatis, & ipsis obtenta cutis inarescit, atque ipsi sentui valdè sicca in Caluis apparet, ut rationali demonstratione non egeat, comment. 3. in 6. de morib. vulg. 2.

Calx, est totius pedis posterior pars, libr. Introd. cap. 10. Clarius, *Calx* est os pedis maximum, ossi scaphoidei seu naviculari subiectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos, quos habet processus in sinum eius inserit, parte qua ingredimur leuiter rotunda, & latiuscula, lib. de ossib. 24.

Camarion, $\psi\alpha\lambda\iota\delta\omicron\upsilon\iota\delta\iota\epsilon\varsigma$. siue $\gamma\alpha\lambda\omicron\iota\delta\iota\epsilon\varsigma$ corpus, est pars Cerebri, quæ supra communem cavitatem est, (qua Cerebrum Cerebello sua perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in sphaeræ superficiem concavam circumacta, ad similitudinem testudinum, & fornicum, quibus Architecti vtuntur, ne medius Cerebri venter cõcidat. Dicitur $\alpha\pi\omicron\tau\omicron\upsilon\ \psi\alpha\lambda\iota\delta\omicron\varsigma$, quæ *Cameram* & *Testudinem* significat, 8. de vlu part. c. 11. vide *Fornices*.

Camerosis, est ossis perruptio, cum ex alterutra refractum parte similem Cameræ figuram acceperit, lib. finit. vnde recentiorum nonnulli vehementissimis fracturas vocant *Camarinata*, & $\epsilon\gamma\gamma\iota\sigma\omega\mu\alpha\tau\alpha$ quidē, quæ in medio sui membranæ innituntur; *Camarinata* vero, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent; Cæterum, quæ primum ab integris fracturæ partibus deduci ægra cepere, intro magis recedunt, ac membranæ innituntur, 6. metho l. 6.

Camisia fœtus, vide *Chorion*.

Campylon, Erotianus exponit apud Hippocratem, minimè rectum, sed tortuosè incuruatum & flexum. vide *Helosis*.

Cancer, est tumor præter naturam, fusci & liuidi coloris, in quo venulæ quædam exaltatæ primo occultæ (& *Cancrum latens* vocant, libr. de atrab. c. 4.) deinde manifestæ, à crasso & nigriore sanguine fæci
vini

vini affimiles sunt, 1. meth. 9.

Canina cupiditas, est praua qualitas oris ventriculi superioris multa impetuose ingerentis, nec potentis deuoratorum pondus sustinere, quare ea inalterata superne, vel inferne excernere cogitur; ita in renibus quoque, vbi ex diabetica passione accidit, serosae humiditatis cupiditas tanta adest cum virium imbecillitate, ut & humiditatem affatim attrahere, ac eam deinde in vesicam confestim renes impellere cogantur, 6. loc. aff. cap. 3. vide *Bulimos*.

Canini dentes, quos Græci *Cynodontes* vocant, sunt duo utrinque mandibulae superiori, & inferiori inhaerentes dentes, inter Incisórios & Molares, qui Canum dentibus quam simillimi sunt inferiore basi, lati, parte superna acuti, quibus singulae quoque radices longissimae insunt, ut, si quid propter duritiem ab incisoriis dentibus, scindi minus potuit, id frangere possint, lib. de ossib. cap. 5. vide *Dentes*.

Canities, est pilorum ante legitimam ætatem in albu commutatio, lib. finit. Cani autem ob id contingunt, quod longo tempore permanente in homine humido, id quod candidissimum est, secernitur, & in summam cuticulam illabitur, ita ut attracta candidiore humiditate pilus quam antea candidior euadat, ipsaque summa cuticula, eo praesertim loco ubi cani sunt, quam quouis alio candidior existat. Quique à prima origine canos habent in capite, illis summa cuticula, vbi cani sunt, quam alia quæuis candidior existit, quod illic albissima humiditas insit. Sic autem se res habet: qualem humorem caro attraxerit, siue album, siue flauum, siue nigrum, talem etiam colorem capillus imbuat. Hippoc. de natura pueri.

Canthus oculi, vide *Anguli oculi*,

Capil

Capillaris vena, vide *Aphantismus*.

Capillitium, vide *Trichiasis*.

Capistratio, vide *Phimosi*.

Capitis vena, & *Cephalica*, & *Humeralis*, & *Extern* dicitur, est, quæ ex iugularibus externis iam diuaticatis, quibuscum radicem habet communem, vtrunque extra thoracem ascendit, & per humerum in externam regionem decliuis excurrit; initio secundi de ration. vict. vide *Axillaris vena*.

Capreolaris, siue *Hederarius infractus*, est arteriarum & venarum ad vtrunque testiculum descendentium non recto itinere, sed instar *Capreoli*, aut *Hedera*, variis modis inuolutarum connexus, 1. de semin. cap. 12. vide *Glandulosi assistentes*.

Caprizans pulsus est, vbi motum arteria interpellat velut & interrumpit, ita vt motus à quæcetero alter celerior primò, & vehementior sit, 1. de differ. puls. c. 29.

Capsula cordis, id est, *Pericardium*, vide *Membrana Pericardios*.

Caput, est suprema corporis pars, quam nonnulli *ventrem superiorem* nominant, collo terminatur, & partes animales continet.

Caput cordis, est ampla, & orbicularis superna eius pars, & basis, 6. de vlu part. cap. 7.

Caput ossis, est extrema tenuis processus ossium pars crassior, & orbiculata, lib. de ossibus, in proœmio.

Caput purgia, sunt medicamenta omnia, quæ capitis purgandi gratia induntur, siue naribus, & dicuntur *Errhina*, siue ori, vt colluendo, vel mandendo per spiritum caput purgent, & vocantur *apophlegmatizantia*, seu *apophlegmatismi*. Sunt autem eiusmodi calidæ & acris facultatis, per quam pituitam partim eliquantia, partim attrahentia, partim etiam facultatem, quæ in cerebro

peribro est, alieni expultricem irritantia, actionem suam perficiunt, 5. de simplic. cap. 20.

Carbo, qui & *Carbunculus* dicitur, cum melancholicus humor, in cutem decumbens simul cum febre, exanthemata per cutem crassescentem, sicciscentemque concitat, affatum sanguinem indicantia, libr. de atrabile, c. 4. *Carbunculus*, vlcus est crustam citò, cum inflammatione totius partis vicinæ valida, faciens, ut & febres vehementes, & extrema pericula inferens, 5. de compos. med. per gen. c. 15. cuius crusta nigra est, & cinerulenta, aliter quam quæ sanguine suffusa sunt, aut quæ algore frigent. non enim vehementer liuidus, ut in illis, tumor est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen & pix; talis autem est exacte atrabilis, l. b. de tum. cap. 6.

Carbunculus, vide *Carbo*.

Carcharacenta, dicuntur animalia, quæ ferratis sunt dentibus, ut Vrsus, Leo, 9. de anat. adm. cap. 1.

Carcinoma, siue *Cancer*, est tumor durus, inæqualis, concolor, dolens (ad differentiam *Schirri*, a quo solo dolore differt) quem & a cancro animali *Carcinon* vocant. lib. de fin. med. Si verò vlceretur, oris prætumidis, aspectu teter, liuidus, & dolens, ab atrabile genitus, serosum, cumque acrem, exodat humorem. In quacunque corporis parte oritur vel sine, vel cum vlcere; atque in ipso quoque oculo, ut plurimum tamen in mulierum mammis frequens est. Venæ in ea parte manifestè apparent, sanguine nigro & crasso plene, atque tumentes, ita tumori circumpositæ, ut Cancris figuram referre videantur. Siquidem tumor ipse Cancris corpus, venæ tumidæ crassæque eiusdem pedes oculis repræsentant.

Carcinos, καρκίνοσ, *Cancer*, etiam vinculi genus est
apud

apud Galen. lib. de fasciis, quod capiti conuenit : fascia scilicet in plures partes scilia, canerorum pedum speciem referentes.

Cardia, hoc est, *Cor*, quod non solum ei visceri (quod sua natura palpitat, & principium vitalis est facultatis) nomen fuit apud antiquos, sed etiam ori ventriculi superiori, pro confesso habetur apud omnes, 4. aphor. 65. propter affinitatem maximam quæ est illi cum corde, & mutuum consensum, Galen. lib. 2. de plac. Hippocr. & Platon.

Cardiaca dispositio, est innati roboris labefactatio, & languor; fit plerumque conflictante ore ventriculi & stomaco cum sudorum immodica vi; sunt qui *Cardia*, id est, Corde phlegmone laborante, fieri affectum putauerint, atque ab hac virium exolutione, quod euenit malum, *Cardiacam*, vel *dispositionem*, vel *syncopen* (quæ & *stomachica* dicitur) nominarint, 1. de caus. symptom. c. 7. & lib. finit. *καρδιακός* dicuntur, qui propter oris ventriculi languorem animo deficiunt, & sudoribus resoluntur. Est autem os ventriculi in his primario affectum, per consensum autem cor ipsum vehementer offenditur.

Cardiacus morbus, vide *Cardialgia*.

Cardialgia, id est, *cordis*, seu *oris ventriculi dolor*, & *morsus*, qui & *Cardiogmos* dicitur, a forti ventriculi cæstu, flaua bile in ipsius tunicis ebulliente, quin & a pituita impensissimè frigida, & flatuoso spiritu frigido genitus, 15. aphor. 65. dicitur etiam *Cardiacus morbus*, lib. Introd. cap. 13. & 8. de comp. med. loc. cap. 1. Symptoma est non cordis quidem, hoc est, visceris huius, quod vitæ pulsusque principium est, sed oris ventriculi. Nec verò omnis ori ventriculi dolor *καρδιαλγία*

appellatur, sed ille tantum, quem humorum acrimonia irritando & mordendo excitat: Id quod fit in angoribus, unde mærore confecti bilem euomere consueverunt. Neque dolore vexatis tantum, verum etiam iis, qui diutius paulò ieiunium tolerarunt, accidit ut mortuus hos ventriculi sentiant, præsertim cum vehementi aliqua exercitatione fatigati cibum nullum assumpserint. Siquidem & mæror, & vehementior exercitatio facit, ut flava bilis in ventriculum confluat, a qua postea irritati, & morsu homines cordis doloreprehenduntur.

Cardiognos, vide *Cardialgia*.

Carnosa cutis, vide *Musculus cuticulofus*, aut *Panniculus carnosus*.

Caro vocatur propriè tantum ea, quæ in musculo est, reliquarum partium villam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci; sed quæ in visceribus, seu iecore, renibus, liene, pulmone, visuntur carnes, eas *Parenchymata* (quasi *effusiones* dixeris) Greci vocant, quæ in intestinis, ventriculo, stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt, i. i. meth. i. i. *Parenchymata* autem eas partes vocant, non carnes, propterea quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia con crescat, i. i. de simpl. in initio.

Caros, siue *Sopor*, est deperditio sensus, & motus in toto animalis corpore, illæsa manente spirandi facultate, læsa autem anteriore Cerebri parte, & temporum ulculis; (sed tamen & medius ventriculus sæpe consentit. Sequitur inde somnus profundus, oculis perpetuò clausis: Nec tamen ita perit sensus, quin si pungantur, sentiant, non tamen propterea vel loquuntur, vel oculos aperiunt,) si verò spirationem adeò vehementer opprimat, ut quis vel magno conatu vix spirare

re possit, eorum exemplo qui per grauem somnum iterere solent, *Apoplexia* tunc affectio nominatur, cui *Paralysis* sæpissime succedit, 4 loc. aff. cap. 2. & 13. meth. 21. & coin. 2. in 1. prorrh. 29.

Carotides, idest, *soporaria arteria*, sunt duæ illæ, quæ ab arteria magna, a sinistro cordis ventriculo emergentes; recta ad caput feruntur, omnibus, quæ sunt supra cor, partibus distributæ, 16. de viu part. c. 12. & 1. de plac. c. 7. sed has non rectè *Carotidas*, & *Soporarias*, & est. & cici, censendum est, sed iam obtinent nomen ex multa omnium, qui post Hippocrat. fuerunt Philosophorum, & Medicorum ignoratione, vt sentiunt, Soporalem affectionem propriam esse, dictarum arteriarum, 1. de plac. cap. 7. vide *Soporaria*.

Carpon, & *Carpos*. *Carpus*, est pars manus quæ cubito per articulum coniungitur, vide *Brachiale*.

Cartilago, quam Græci *Chondron* vocant, est particula simplex in animalis corpore, quæ aliarum quidem omnium est durissima, toto autem osse est mollior, 7. de usu part. c. 3. Quamuis autem diuersa sit ab osse *Cartilago*, sæpè tamen ætatis spatio in os degenerat, imo verò nulla fere sunt ossa, quæ ante cartilagine non fuerint. Ossâ namque omnia, & dentes genis adhuc conclusi infantibus *cartilago* sunt, quæ tandem in ossa duratur, vt *cartilagine*, quæ inter sterni ossa continentur.

Cartilago ensiformis, est extrema ora ossis mediij pectoris, quæ est propter os ventriculi, cui alligatur; Græce dicitur *Chondros Xiphæides*, 6. de usu part. c. 2. Eadem dicitur *nucronata*, lib. de ven. & art. diss. c. 5. Aliqui vult, qui *ensiformem cartilaginem* dicunt esse, totam pectoralis ossis figuram (non eam tantum, quæ in imò eius est) quia gladij similitudinem repræsentat, lib. de

omib. cap. decimotertio.

Cartilago innominata, est secunda laryngis cartilago, quæ nomine caret veteribus, recētoribus *χρῖνος* *εις* id est, *anularis* dicitur, quod annulo similis sit: in internis partibus, qua Oesophagus est, positionem habens, 7. de usu part.

Cartilago peltalis, est imperfectus circulus in principio asperæ arteriæ collocatus, admodum peltæ, cuius gibbositas apparet in gutture, ac *Adami pomum* appellatur; eius vero defectus est versus gulam, unde *cartilago peltalis* dicitur, cuius defectum supplet quædam cartilago supposita isti inferius, faciens etiam circulum imperfectum, sed contrario situ cum superiori, quia eius gibbositas interius est versus gulam, defectus exterius, versus guttur, diciturque *Cartilago cymbalaris*, vel *Coopertoria*. Estque ibidem tertia Cartilago nomen non habens, cum modò versus partem exteriorē, nunc versus interiorem collocetur, nunc cum cibus deglutitur, ut os trachæ arteriæ, nunc cum vox formatur, ut os guiæ regat, lib. de anat. viv. Cartilaginum præcipuus usus est duplex: unus ut partes quædam leues, ac politas ad motuum promptitudinem efficiât, in articulis scilicet, alter ut violentiæ foris occurrentium mediocriter cedant. Cartilaginis enim substantia maxime idonea est ad tegendum, & defendendum partes subiectas. Non enim potest comminui & frangi, ut dura & friabilia, neque incidi & contundi, ut mollia & carnosâ.

Caruncula, nunc partes sunt substantiæ intestinorū, quæ in difficultate intestinorum excernuntur, acq̃ magnæ, ut possimus eas *carnes* nominare, 4. aphorif. 26. nunc vero carnosam quandam particulam, in summo ore pendentem, quam & *Columellam* vocant, significant, 6. de compos. medic. loc. cap. 3. vide *Gargareon*, &

& difficultas intestinorum.

Casus, qui & *signa*, & *symptomata* mox apparentia dicuntur, 1. aph. 12. vide *Indicatoria signa*.

Cataclida, siue *Subclanium* dixeris, primam Thoracis costam parvam significat, lib. de musc. dissect. c. 12.

Catagma, id est, ossis fractura. 2. meth. c. 2.

Catagmatica emplastra, quæ & *Cephalica* vocant, sunt quæ Caluarie fracturis accommodantur, habentq; abstergerendi, digerendi, & siccan. si potestatem, quibus plerique & paululum ex astringentibus pharmacis admiscant, 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur & *Catagmatica ligamenta*, quibus fasciarum instar ossis rupturæ deligantur, 1. de comp. medic. per gen. c. 4. vi de *Cephalica emplastra*.

Catalepsis, est deperditio sensus visus, apertis palpebris, seruata tamen secundum naturam spiratione in, quâ posteriora Cerebri potissimum, & neruorum exortus intemperie frigida & sicca, vnde etiam affectus hic neruorum *Exortus* dicitur, afficiuntur, 4. loc. aff. c. 2. licet alibi *Catalepsim* dicat esse spiritus cohibitionem, lib. de muscu. dissect. c. 26. & alibi dicat *Catalepsim* fieri refrigerata prima parte sensitiua, id est, Cerebro ipso; quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mista humiditati, facit lethargicas passiones, cum siccitate verò eas, quæ à Græcis *Καταληψις* dicuntur, id est, *Deprehensiones*, 2. aph. 3. eundem affectum, *Catochen*, & *Catochon* vocant, 4. de caus. pull. c. 16. vide *Catoche*.

Catalotica medicamenta sunt, quæ cicatrices grossas æquant, & lymphidant, lib. de Dynamid.

Cataphora, id est, *veternosa affectio*, prorrh. 1. quâ ægris sopori graui simile quid obuenit, fiuntque tum omnis sensus, tum vocis expertes, 1. de dieb. decr. c. 4.

Cataplasma, compositio est pulti similis, ex aliquo

farinæ genere, floribus, & aliquo humido, siue vnctuo-
so, 3. de compos. medic. per gen. cap. 2. siue, medica-
mentum est molle, & consistentiâ mediocri, quod re-
pellendo, concoquendo, digerendo, resoluendo, laxan-
do, vacuando, detergendo, calefaciendo, siccando, do-
loriq; sedando adhibetur. Quæ crassiora siccioraq; sūt,
Emplastra, & *Cerata*: quæ liquidiora *συγχρίσματα*
& *Unguenta* appellantur.

Cataporia, idest, *pilula*, de remed. par. fac. cap. 6.
κατά τοτον aut *καταπόριον*, medicamentum quod
deuoratur, aut de iudicatur, neque diluitur, lib. 5. Epid.

Cataptesis, morbus non est, sed symptoma comitia-
lium, attonitam concidentiam repentinam significans,
lib. de tot. mor. b. temp. cap. 4.

Cataracta, siue *suffusio*, est pituita inter vucam, &
crystallinum humorem coagulata, prohibens spiritum
vilibilem ab oculo exire, & intrare, lib. de oc. part. 4.
cap. 12. vel *suffusio* est, cum cernendi facultas deper-
ditur, apparente, siue non apparente in oculis malo ali-
quo, & aut propria affectione molestatis, aut oris ven-
triculi, aut cerebri ex cognatione, & consensu iisdem
afflictis, 7. loc. aff. cap. 2. quam vocant Græci *Hypochyma*
10. de usu part. cap. 1.

Catasarca, vide *Anasarca*.

Cataschesis, dispositio est, quæ facillè discutitur; op-
ponitur hæticæ dispositioni illi, quæ tenaciter inheeret
& habitata est fixa, firma, 3. loc. aff. cap. 2.

Catastasis, *Constitutio*, apud Hippocratem dicitur
collocatio cuiusque rei in suam sedem. Idem etiam sic
solet vocare omnem cuiusque rei formam, vt scribit
Galenus, sed peculiariter dicitur de aere & morbis:
Ac in aere quidem est eius præter naturam temperies,

Quæ enim secundum naturam est *ὥρα*, hoc est, anni tēpus dicitur, suntque illius quatuor differentiæ propriis temperamentis & nominibus designatæ: ver, æstas, autumnus, hyems, in quæ si aliqua præter naturam temperies inciderit, ea non iam *ὥρα*, sed *κατάστασις* propriè nuncupatur. In morbis verò *κατάστασις* vocatur quædam veluti forma morbi, secundum quam ex tantis & talibus constituitur vniuersalibus temporibus, seu qualiscunque ex totius morbi temporibus compositio, vt docuit Gal. lib. 1. τοῦ κρείστων. Hæc autem non aliud est quam totius morbi duratio circumscripta temporibus quatuor, quasi totius morbi tempora, seu vniuersalia appellamus.

Catataxis, est ad inferna loca corporum tractio, quæ obitur partim organis tentoriis, è regione oppositis, partim transtumpione in contrarium, nempe transmissis per rotulas principiis, quæ tentionem moliantur, ac superius adnexus. Opposita huic est *Anataxis*, quæ est tentio ad loca superna per traductionem, libr. finit. *ἀνὰ τὴν θύραν* contentis esse viribus, firmis & integris, aut contra obniti & se erigere significat, quod totum Celsus per firma viscera complexus est.

Catarrhus, *κατάρρως*, seu *Defluxus*, est multorum humorum delatio ex cerebro, per palati foramina & nares, quæ in exitu vnâ cum flatu egrediente, strepitum quendam faciunt, libr. finit. Nascitur eiusmodi distillatio a cerebri intemperie frigida & humida, & ab omnibus quæ replent caput. Vide *Coryza*.

Cathartica, seu *purgans facultas*, vel *medicamenta*, duo significant, alterum commune omnium, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant; alterum, quod per excellentiam, de iis tantum dicitur, quæ aut

per vomitum, aut per ventris defectionem purgant; neque ejusdem est generis cum iis, quæ per nares, aut vulvæ adnota, expurgant. §. de simpl. med. facult. c. 20. Primi generis sunt quæcunq; vel calefaciendo, vel humectando, vel crassa lentæque extenuando, & obstructa solvendo vrinam mensesque mouent, aut ex pectore sputa eliciunt, aut aliu laliunde vacuant. Secundi verò, quæ trahendi facultate vacuationem molliuntur, siue per aluum, siue per vomitum, siue per vrinas, siue per vterum, seu alia quavis ex parte. Quæ enim vrinas mensesque mouent aut sputa, tum quæ naribus purgandi gratia infunduntur, aut ore colluantur, aut dentibus manduntur, si trahendi humoris vitiosi facultatem possident, eaque vacuationem perficiant, ejusdem sunt generis cum iis quæ per vomitum aut per alui defectionem trahendo purgant.

Cathemerina febris, idest, *quotidiana*; ita enim consueverunt vocare quidam Medici recentiores eam febrem, quæ singulis diebus accenditur, neque ullam habet intermissionem; ego verò (inquit Gal.) solitus sum eandem febrem *Amphimerinam continuam* appellare; nam *Cathemerinon* vocabulum, nusquam apud Græcos scriptum inuenitur: omnem verò rem, quæ quotidie eodem modo fit, *Amphimerinam* vocant: vocetur itaque, quæ singulis diebus accenditur, & finitur febris, *Amphimerina*, idest, *quotidiana simpliciter*; quæ verò non intermitit, *quotidiana continua*, 2. de diff. febr. cap. 7.

Catheretica medicamenta sunt, quæ excrescentiam carnis vlceribus detrahunt, §. de simpl. cap. 2. eisdemque cicatricem inducunt, ibid. cap. 15. Ea genere quidem & facultate *συνωτική*, hoc est putrefacientia sunt, sed multò tamen iis imbecilliora. Siquidem extimam modo superficiem quam contigerint, detrahunt, & vt

sunt testacea omnia vsta . Vide *Septa* .

Catheter, est fistula cannulaue vrinaria, cuius extremum aliquo cataplasmate, linimento, aut oleo illinimus, & ad remouendam vrinae suppressionem, virgæ immitimus; ad *Thrasib* cap. 23. Siue, est instrumentum chirurgicum cauum, & altera parte recuruum, quo vrina retenta elicitur, & vesicæ vitia probantur. ἀπο τοῦ καθίεθαι, dest, ab *immittendo*, siue *infundendo*, quo sedò instrumeto in vesicam iniici solent, quæ iniicere expediat, Gal. lib. 5. meth. med. Caterum καθήτης ab Hippocrate non pro eo instrumento vsarpatur, sed pro linimento torto quod intra vlcera inditur, vt Gal. annotauit.

Καθετηρισμός, est administrationis chirurgicæ ratio, qua inuicimus per Catheterem in vesicam id quod ad eius curationem conuenit: vel eximimus id quod impedit ne vrina reddatur, siue concretus intus sit sanguis, siue calculus, siue aliud quippiam, recto siphone immisso, quem Græci καθήτης vocant.

Catixis, seu secundum rectitudinem, eruptio sanguinis est, cum sanguis e directo loci affecti, effluit, & emittitur, lib. de cur rat. per sang. miss. 15.

Caroche, qui & *Cathæcus*, vigilans sopor est, 3 loc. aff. cap. 5. estque solius Cerebri affectus, veluti & per totum corpus conuulsionem, comm. 3. in 1. prorrh. 69. Aliter est insomnium, sed sine somno & febre, propensio, per quam & oculi manent aperti, & seruatur secundum naturā spiratio. Eo qui detinentur κατόχοι & κατεχόμενοι dicti sunt. Habent autem tensores apertosq; oculos, non vt comatosi & cataphorici clausos. In his siquidem humiditas affectionis causa est, neruorum

firmitatem roburque dissoluens: in illis verò propter siccitatem tensio oritur. Galen.com.2. in 1. prorrh. Est quoque *Cathocus* fascia longior, quæ in orbem faciei, & capiti circumdatur, vt operculum comprehendat, li.de fasciis. *Καθολκεύς* autem appellatur fascia oblonga, quæ capitis totum vinculū quod *παρασκεπαστρὰ* dicitur, continet, & prohibet ne ipsum vinculum diducatur. Galenus de fasc. vide *Catalepsis*.

Catoterica medicamenta *κατωτερικὰ φάρμακα*, quæ & *Hypelata* Græcè dicuntur, sunt medicamenta deiectionia, quibus renes, vesica, & gibba hepatis, cum multo vitioso succo sunt referta, expurgantur, sin mediocri, per vrinales meatus, vt Caua iecinoris & intestina, deiectione, tantum ventriculus autem vomitu deiectioneque inanitur, 7.meth.13.

Caua vena (sic appellata, quod venarum omnium, quæ per corpus animalis disseminantur, latissima sit, & capacissima, 4.rat. vict.27.) est vena magna a gibbis hepatis orta, lib.de ven.& arter.diffect.cap.2. per quam hepar, ex particulis, quæ ad ventriculum attinent, attractum alimentum, & in ipsa hepatis substantia elaboratum, in omnes superiores corporis partes distribuit, 4. de vsu part. cap. 13. quæ à connexis iecoris partibus orta, tum *cava* propter sui magnitudinem, tum *iecoraria*, à viscere vnde egreditur nominatur, 8. de plac. cap. 1. Nec vero a iecinore solum hæc vena, quæ a gibbis hepatis egreditur, sed alia etiam, quæ a simis & concava ipsius parte, quam *portas* vocant, (vnde & *vena porta* appellatur) promanat. 4. de vsu part. cap. 13.

Cauda, vide *Coccyx*.

Cauernosa ossa, *foraminulenta*, *Isthmoidea*, & *spongiosa*.

sa, seu *spongoeidea*, sunt ossa quædam parua supra nasi radicem, ante meningas in meatu olfactorio posita, à Cribri, vel spongiæ similitudine sic dicta, 8. de usu part. cap. 7. vide *Ossa Itimoeidea*.

Cavernosum nervum appellant *Penis colem*, à quo *Penem*, & ipsum totum nervosum dicunt. *Coles* enim in marium genitalibus, & uteri cervix quoniam extendi, & in se rursus retrahi, & subsidere videntur, *nervosum* proinde dicunt, com n, i. in 6. de morb. vulg. 2. diciturque *flatusus*, & *sistulosus*, 6. de loc. aff. 6.

Cauledon, Καλυδὼν, hoc est *caulis* in morem fractura facta, est species fracti ossis, quæ fit per transversum, in qua fracti ossis partes ita a se dissident, ut è directo non iacent, 6. met. 5. Paulus Ægineta author est τὸ καλυδὼν κατὰ μέτρον dici ἐτ παφανδὼν, & σικινδὼν, à similitudine fractæ radiculæ & cucumeris. vide *Schidacedon*.

Caulos, id est, *puendum virile*, 14. de usu part. cap. 12. quod vulgò *Virgam* appellant, & *Penem*. Sic etiam *Ostium* uteri vocatur in mulieribus. Dicitur in Plantis & Oleribus *Scapus*, & in altum surgens veluti *Virga*.

Causa morbi, est id, quo præsentè afficimur, & quo sublato, statim cessat affectus, 1. de loc. affect. cap. 2. aut quod ei, qui fit in morbo, aliquam generationis partem tribuit.

Causa præincipientes, Vide *Febres putridæ*.

Causa præcedentes, Vide *Febres putridæ*.

Causodes febris, id est, *Incendens*, 1. aphor. 12. quam etiam *Causon* vocat, id est, *Febrem ardentem*, 1. de cris. cap. 4. Vide *Continua febris*.

Causos, Vide *Causodes*, *Continua*, & *Synocha*.

Causos legitimus, qui ex redundante flava bile fit;

Nothus verò, qui ex putrescente crassa pituita, 4. de rat. viſt. 13.

Caustica, hoc est, *urentia medicamenta*, sunt, quæ & vehementer calida sunt, & consistentia crassa, quæque ignis instar corpus colliquant, & sæpè *escharas* hoc est, *crustas*, ritu cauterij efficiunt, 5. de simpl. c. 15. quocirca & ἰσχαρωτικά appellantur. Eorum materia sunt: *Lixinium*, *Calx viva*, *Auripigmentum*, *Sandaracha*, *Chalcitis*, & id genus alia inde, & *affectiones caustica*, & *caustica excrementa*, idest, *urentia*, appellantur, quarum virtus est morbum & acutum, & periculosum, & velocis iudicationis reddere, comm. 2 in 1. prorrh. 60.

Καυτήριον, *Cauterium*, est, quod vrendi vim habet. Vsurpatur tam pro medicamento quod potestate vrit, quam pro ferro candente, cuius vsus plerumque necessarius est, vel ad sistendum sanguinis profluuium, vndeunque manauerit, vel ad intercipiendas defluxiones, vel ad ossa cariola, & mala ligna vlcera. Id ferrum, καυτήριον Hipp. appellauit. Erat autem, vt scribit Gal. æreus calamulus perforatus in fudo, per quem paruum ferrum adurens demissum adurebat.

Cedmata vocat Hippocrates fluxiones in crura decumbentes, & ex ipsis eas maximè, quæ primum articulum, ubi coxendix est, occupant, comm. 5. in 6. de morb. vulg. 22. Affert. Erotianus ex eodem Hippocr. χείματα appellari τὰς χρόνιās περὶ τὰ ἄρθρα διαθείσεις, hoc est, vetustas in articulis affectiones.

Cele ex *Hernia*, *Ramex*, *Circocèle*, Medicorum iuniorum nomina sunt, significantia omnes testiculorum tumores, lib. de tumor. c. 15. Barbaram sectantes medici

nam, *Rupturam* uocant; hæc variis fit modis, variasque à parte affecta, affectusque huius causa cōiuncta, etiam appellationes accipit: si enim peritoneo rupto, intestina in Scrotum descendunt, *Enterocoele* Græcis, *Ramex intestinorū* Latinis appellatur: ubi verò intestina suprā in inguinibus hærent, *Bubonocoele*, hoc est, *Ramex inguinalis* uocatur, si humor aliquis lentus in Scroto colligitur, *Hydrocœle*, idest, *Ramex aquosus* nuncupatur.

Quum autem caro dura intra testium tunicas concreuit, *Sarcocœle*, hoc est, *Ramex carnosus* dicitur. In summa, nomen semper a rebus opplentibus, & in tumorem sublata à parte accipiunt. Proinde, si *Omentum* in *Scrotum* deuoluitur, *Epiplocœle*, hoc est, *Ramex Omenti* nominatur, sic, ubi uenæ ultra modum repletæ, ac dilatatæ glomerantur, *Circocœle*, idest, *varicosus Ramex* uocatur.

Celer pulsus est is, cum celeriter, & breui tempore arteria distenditur, fit, 1. de diff. puls. c. 7.

Cenchrias, κέρχρις, alterum est herpetum genus, quod a similitudine, quam habet cum Milio, *Cenchriam* vocant, (κέρχρος enim Milium, semen panico simile, significat) humores mistæ facultatis, bilem scilicet, & pituitam continens, quæ non protinus ulcus faciunt, quemadmodum bilis fœdora; sed admodum exiguas pustulas ad speciem Milii, quæ ramen & ipsæ interposito spatio, in ulcus transeunt; diciturque etiam *Herpes miliaris*, 14. meth. 17. Vide *Herpes*.

Ceneangia propriè & primum uasorum inanitionem significat, atque ob id *Asitia*, idest, *ciborum abstinentia*, *Ceneangia*, idest, *uasorum inanitio*, sæpius dicitur, tanquam nomine generis etiam in specie homines omnes uel conueniant, 2. rat. uict. 47.

Ceneon, Vide *ile*.

Cephalaa, Cerebri morborum symptoma, est capitis diuturnus dolor, difficulter solubilis, qui à parua occasione uehementes habet accessiones, ita ut neque uoces aut motum tolerare possit infirmus, sed tranquillitatem, obscurumque cubiculum quærat, ob doloris uehementiam, cum nonnulli ueluti malleo se percuti, alii caput sibi contundi distendique sentiant, non paucis ad oculorum radices dolor extendatur, (quod signum est Cerebri membranas dolore affectas esse. Nam quandoque in Pericranio tantum est, qui in superficie solum hæret dolor,) suis intermissionibus circumacti, non secus ac qui *Cephalalgia* laborant, sed in *Cephalaa* affectæ partes redduntur multò debiliores, quam in *Cephalalgia*, 3. loc. aff. cap. 9.

Cephalalgia, est dolor capitis, nec diuturnus, nec uehemens, nec cum magna capitis imbecillitate coniunctus, sed qualis à crapula, à Sole, à labore, aut febribus excitari solet, vide *Cephalga*, 2. com. med. loc. c. 2.

Cephalica uena, quæ & *Humeralis*, siue *Humeraria* dicitur, ramus est venæ cavae ad iugulum ascendens, ibique ad farculas diuisa, altera pars humero superposita ad manum tendit, unde & *Cephalica* dicitur, lib. de anatom. viu. vide *Humeraria*.

Cephalica emplastra, capitis fracturarum, quæ usq; ad crassæ meningis duplicaturam peruenerunt, accommodata sunt pharimaca, quorum uirtus est, ut ossium squamam sursum attrahant, & in pristinum locum reuocet, & fragmenta tum ex capite, tum ex aliis corporis ossibus, educant. Nonnulli communi genere hæc etiam vocant *Catagmatica*, propriè verò nuncupata *Cephalica fortiora* sunt, siquidem ex alto superficiem extimam non ossa modo, sed his multò quoq; magis, humorem ali-

aliquem crassum, & viscosum, vel omnino deprauatum
 sua caliditate attrahunt, 2. de comp. med. per gen. cap.
 18. Horum materia est *Iris Illirica*, *Erui farina*, *Manna*
 siue *purgamentum thuris*, *Aristolochia*, *Cadmia elota*,
Squama aris, & omnia quæ extergere citra morbum
 possunt. Similiter adhuc medicamentum siccum, quod
 carnem producat, *Cephalicon* vocant, method. 2.

Cera, mulieres sunt, quarum uterus propriis ex
 morbis, tum qui in processibus eius supernis, & lateri-
 bus consistunt (*Κεραίας* Græci uocant) tum qui in col-
 lo aut fundo, aliquando quidem plura quam prius, uel
 pauciora, uel nulla, uel mala emittit menstrua, 3. de
 sympt. caus. cap. 4.

Cera ocides, *κερά τοιοῦνς χιτῶν*, cornea, seu corni-
 formis tunica vel membrana oculi secunda est, à dura
 meninge orsa, (tunicam choroideam complectens) cras-
 sa admodum, sed parte eius media tenuissima, & densis-
 sima, splendida ad splendorem recipiendum, & trans-
 mittendum, cornibus à modum extenuatis similis; unde
 eam à cornu similitudine *Ceratocidem*, *Corneam*, & *Corni-*
formem appellant, 10. de usu part. cap. 3. uide *Rhagoci-*
des tunica.

Ceratomalagmata, nonnulli medicorum, nomine a
 sola consistentia desumpto, vocant medicamenta, quæ
 corpori imponuntur, non omninò quidem humida, sic-
 citatem uerò tantam nec dum consecuta, quantam em-
 plastra possident, 7. de comp. med. lib. cap. 11.

Cercis, *κερκίς*, *radius*, à figura rotarum paruarum ra-
 dios imitante. Est os alterum cubiti superius, sed mi-
 nus & breuius: Vide *Cubitus*. *Κερκίς* significat etiam
 pistillum, quod sæpè & *δαίδουξ*, *cochleare* alias signifi-
 cans, itemque *τριβήδιον* arque *ύαρος* à Græcis Medicis

appellatur?

Cerchnos, est exiguus quidam ad tussendum impetus, & conatus, non tulsis; sed ueluti nauſeæ uomitio-
nes præcedunt, ita tulsim hoc symptoma; Atque
ut nonnulli nauſearunt quidem, non tamen uomue-
runt, ita nonnullis *Cerchnos* incidit, nec tamen tulsis
propter causæ paruitatem est secuta, 2. de sympt. caus.
cap. 4. nam sæpè ex parua faucium aspredine *ωξερχνος*
fit. Sæpè uerò ex tenui aliquo exiguoque prorsus hu-
more, siue is à capite descendat, siue in alperis arteriis
collectus sit. Sic autem appellatur *ἀπὸ τοῦ κέρχρου*.
Significat enim *ἡ κέρχρος* apud Iones idem quod
ἡ κέρχρος, *milium*. Itaque cùm in faucibus, asperitates
quædam paruæ ueluti granorum Milii sentiuntur, id
τοῦ κέρχρου nominant, à quo *κέρχρῶδες* dicitur, quod
fauces exasperat, & exiguam tulsim mouet, Gal. com. 3.
ὅτι τὸ πρὶ ἀσθρῶν.

Cerealinum appellatio, in toto eorum genere est usi-
tatio, quod legumina uocant, & lib. de attenuan. uict.
rat. cap. 6.

Cerebellum, posterior est Cerebri pars, ex multis, &
paruis corporibus coagmentata, quæ à nonnullis, *En-
cranium*, uel *Parencephalis*, uel *posterius Cerebrum* dici-
tur, 9. de anatom. adm. cap. 2. estque spinalis medullæ
principium, & eius ratione neruorum omnium, qui in
toto animali sunt æquui, fons & origo, lib. tegr. c. 11.
Totum namque cerebrum in duo diuisum est, *anterior*
& *posterius*, sed *supernis* tantum partibus. Nam sua basi
continuum est, non sibi modò, sed spinalis etiam me-
dullæ, & per hanc cerebello. Darius autem sicciusque
est reliquo cerebro, quòd quo ulterius procedit, eo sic-

cus

cus euadit: calore quoque diuersum est; nam cum reli-
quum candidum sit, cerebellum velut vitione quadam
subflauum est, & plenum animali spiritu, quem acruis
duris à spinali medulla prodeuntibus impertit.

Cerebrum, quod Græci à situ *Encephalon* appellant,
(nam nominatur ita, quod *ὀν τῆ κεφαλῆς*, hoc est, in
capite situm habet) animæ ratiocinatricis est domicilium,
neruorum, & sensus omnis, motusque voluntarij prin-
cipium, substantia neruis simillimum, nisi quod mollius;
nam id illi conueniebat, vt quod sensus quidem omnes
recipit, omnesque imaginationes, atque mentis notio-
nes complectitur, 9. method. & 8. de usu part. Substantia
ipsius glandularis est alba, veluti è spuma quadam con-
creta, & humida, lib. finit. Anterior cerebri pars du-
plex quoque statuitur, dextra & sinistra, duosque sinus,
seu ventres habet, dextrum, & sinistrum, qui à corpore
calloso, quod *τυλοειδές* dicitur, dirimuntur. Hi poste-
riore sui parte in tertium sinum mediocrem sub psalloi-
de concurrunt, à quo meatus est longus *τοῖς γλουτίσις*
idest, nātibus (ita enim ob similitudinem quandam vo-
cant) subditus, qui in sinum alium quartum, omnium
postremum minimumque inter cerebelli basim spina-
lemque medullam situm, incidit.

Cerealon, compositio est ex cera, & oleo, 7. de comp.
med. per gen. cap. 2.

Cerion, idest, *Fanus*, vlcus paruum in capite est cum
tumore, ex cuius foraminibus crassior sanies, & quasi
mellitus humor profluit, li. de tumor. c. 5. & 2. de comp.
med. loc. c. 8. Itaque tum ob foraminum figuram, tum
propter excreti humoris speciem *κηρίον*, idest, *Fanus*,
appellatur, & alio nomine *μελικηρίς*. Actius lib. 6. Dis-

fert foraminum magnitudine ἀπὸ τοῦ ἀχῶρος, qui viceris etiam in acute genus est, sed minimis foraminibus præditum, per quæ humor dimanat. Cæterum χρ'ov frequenter in musculosis partibus, in articulis, & plantis pedum oritur: sæpè etiam sextam colli vertebra occupat, & aliquando etiam costas inuadit. Si vero in capite generatur, primum reliquis partibus, deinde calvariæ etiam putre lineam transmittit, vt sæpè dissecto pericranio, os ipsum deradere conveniat: vide *Meliceris*.

Certatoria, hoc est, agonistica aqua frigida vti dicuntur illi, quibus ea & affatum, & frigidissima exhibetur, lib. de marcore cap 8.

Cervix, vide *Spina*. Dicitur & *Cervix*, tenuis ossium processus, lib. de ossib. in præm.

Chalastica, id est, *relaxantia*, seu *remittentia*, vocamus, quæ modicè coeetaciunt, quorum vltus est, vt conuenientia, astrictaque corporis laxent, flatuosum spiritum tenuent, & phlegmones materiam digerant, 13. method. 5. Medicamina induratarum corporum, quæ ipsorum soluant duritiem, *Malastica*, hoc est, *emollientia*, dicuntur: quæ autem tensioni medentur, *Chalastica*, 7. de compol. med. per gen. cap. 9. Cum autem tensio multis contingat modis, non videtur vna esse laxantium species, sed alia humectando laxant, alia calefaciendo, alia molliendo, alia vacuando, alia tumores præter naturam purgando, alia aliud quippiam faciendo. Attamen si vniuersalem quandam horum omnium substantiam constituere licet, ea certè erit ex genere modicè calefacientium. Præcipuas in eorum ordine tenet partes *Oleum chamemellinum*, item, *Adipe*, *Butyrum*, *Ocsypus*, & reliqua quæ intra secundum gradum

calefaciunt . Verùm Methodici multò longiùs τοῦ χαλαστικοῦ nomen extendunt, vt docet Galen. ad omnia remedia significanda, quibus astrictus affectus, quo vna cum fluente humore omne morborum genus comprehendebant, curaretur . Itaq; & venæ sectionem χαλαστικό esse præsidium asserbant, & omnia similiter purgantia medicamenta, vide *Relaxantia*.

Chalazia, id est, Tubercula inftar grandinis (quæ χαλαξία dicitur) in palpebris, quæque *Posthias* Græci nominant, si quando in iis lentus quidam humor concreuerit, 4. de comp. med. loc. cap. 7. estque morbus ex vitiiis, quæ oculos infestant, cum toto genere præter naturam aliquid peccat, 14. method. 19. Sunt, vt ait Celsus, Tubercula parua in palpebris mobilia, simulatque digito huc & illuc impelluntur, condunturque aliquando sub cute, nonnunquam sub cartilagine, non dissimilia κριθαῖς, sed non figuræ eiusdem. Sunt autem rotunda & pellucida, ideoque grandini similia, hisque distinctis humor manat candido oui similis . Dicitur & hic affectus χαλάξωσις ἐν τῇ εἰσαγωγῇ . Sic etiam nominatur vitium quoddam in suis ore, sublingua, Ath. 1. 3.

Chemosis, morbus oculi est, quando album oculi tumefactum circulum Iridis adeo excedit, vt & nigrum, oculi concavum videatur, lib. de anat. oculi. Alibi, *Chemosis* ex vehementi inflammatione, utrasque palpebras in exteriorem partem detorquet, ita vt totus oculus contegi non possit, lib. introd. cap. 15. Ergo, cum nigrum cauum sit & subsidat, album undique tument & attollatur, non ineptè veteres Medici malum hoc τῶν χήμων nomine designarunt, siue illico animal intel

lexerint, quod inter ostrea nominatur, hiatque semper, siue simpliciter hiatum qui *χῆμη* & *χάσμα* dicitur. Ceterum affectum hunc duo maxime symptomata consequuntur; vnum, rubor oculorum propter inflammationem, alterum vero, palpebrarum, vt ait Paulus *ἐκτροπή*, hoc est, *peruersio*, siue *contorsio*, ita vt oculus tegere claudereq; nequeant. Tumor enim oculi impedit, quo minus palpebrae adduci committiq; possint, itaque laborantes oculi perpetuò manent aperti. Scribendum est autem *χῆμωσις* non *χύμωσις*, vt vitiosè multis in codicibus legitur, quia, vt dixi, deriuatur ἀπὸ τοῦ *χῆμης*, vti Gal. testatur ἐν τῷ ἰντῶ, seu quicumque auctus author est.

Chion, *χίον*, idem prorsus quod *κίονις*, hoc tantum interest, vt ait Galen. quod τοῦ γὰρ γαρπῶνα Veteres *κίονα*, posteriores autem *κίονιδα* appellarunt, Vide *Cion* & *Staphile*.

Chironia, & *Telephia*, species vlcerum sunt malignorum, oras habentia duras, callosas, & tumentes, lib. de tumor. cap. 13. Tria tantum vlcera propriam habuere appellationem, *Anthrax*, *Phagedana*, *Herpes*; cætera omnia, communibus deteriora, per se ipsa solebant antiqui vlcera simpliciter *chironia* nominare, quæ in longum tempus protrahuntur, cum ne quidem post multum tempus fuerint ad cicatricem producta, rursumque influente lchorè, ex osse corrupto, in parte penitior inflammantur, & pus generant pessimum, à quo cicatrix eroditur, & caro exulceratur, 6. aph. 45. Inueterata vlcera, & dysepulota, hoc est cicatricem aggreducentia, *chironia* nominant, 4. de comp. med. per gen. Dicuntur autem partim *Chironia*, ab eo nempe Chiro-

ne, qui primum ea sanauit ; partim ab ipsis, qui iisdem sunt affecti, vt Telephium, 2 meth. 2.

Chirurgia, id est, *manualis operatio*, 6. method. 6. Inde *Chirurgica*, ea est medicinae pars, quæ manu medetur, 3. de compos. med. per gen. cap. 2. *χειρουργία*, vel *χειρουργική*, pars est του θεραπευτικῆς morbos, qui in solutione continui, aut in partium externarum immoderatione consistunt, tollens sectione, vitione, restitutione in naturalem situm, & medicamentis foris apposis. Sectione enim & vitione tollit quod redundat, luxata & tracta ossa reponit in locum naturalem. Vlcera medicamentis deterget, carne implet, & cicatrice obducit. Quibus in rebus tria sibi maximè proponere debet Chirurgus, tum vt breui curet, tum vt curet citra dolorem, tum vt maxime tutò. At rursus vt tutò curet, tria potissimum considerabit : Vnum primumque vt absolutionem operis consequatur ; alterum, vt sicubi hanc non consequatur, saltem curandum non læcat; tertium, vt vitium non reuertatur facile. Hæc enim qui præstiterit, meritò optimus Chirurgus censebitur.

Chloron, id est, *pallidus*, & *aruginosus color*, 2. prognost. 20. *χλωρόν* duo significat, interdum quidem viride, vt cum brassicam *χλωράν* dicimus. Quod coloris genus, vt scribit Galen. comment. 1. in progn. rubro nigrius est, & veluti principium quoddam nigri, & liuidi. Prouenit à frigiditate, vt & color niger, sed longè minori. Interdum verò pallidum, quod propriè *ώχρόν* dicitur, ex loquendi quadam consuetudine Asiaticis Græcis familiari, qui aliquos pallore suffusos videntes, quærere solent qua de causa *χλωρόν* euaserint, non arbitantes *χλωρόν* atque *ώχρόν* ab inuicem differre, vt

notauit Galen. comment. 2. *ἐκ τῶ περὶ διατρῆς οὐκ ἐστὶν*
 Hinc *chlorosis*, quæ partim de morbo, tebre pallida, vteri
 vasorum oppletionem; partim de symptomate, discoloratione
 vniuersi corporis habitus virginum nubilum ex vtero ægrotantium usurpatur.

Choana infundibulum, *Scypho*, *Peluis*, *Pyelos*, significant, ductum, canalem seu cavitatem quandam, in qua
 meatus cerebrum expurgantes in palatum delinunt, usque ad
 adenis ventriculum, 9. de vlu part. cap. tertio, quæ vulgo *lacuna* dicitur. Alias, *Choana*, *χίανος*, seu
χίανον, *χέω*, id est, *liquefacio*, *diffundo*, vas dicitur ex
 argilla, quo argentarii, & Chimici utuntur, infundendis ac
 liquefaciendis metallis.

Chænicidas, instrumenta quædam vocant, quibus in
 Caluariæ fracturis vtimur, 6. meth. 6.

Choras, id est, *Struma*, sæpè propter ulcus quod in
 manus, aut pedis digito fit, glandulæ in inguinibus, &
 alis, cum intumescunt, tum phlegmone occupantur, quin
 etiam in collo, & secus aures, sæpè glandulæ his (quibus
 in collo, capite, vel aliqua vicina parte ulcus est natum)
 intumescunt: nominant autem ipsos adenas, cum sic
 intumuerunt, *Bubones*, quod sit scirrhusior earum
 partium phlegmone aliquando fuerit, hæc & ægrè
 sanabilis redditur, & *Chæras*, id est, *Struma*, dicitur,
 11. meth. 5. Oritur non ex calida quidem materia, neque
 ad suppurationem tendente, sed pituitosiore & frigidiore;
 qui subinde affluens, Strumam non modò duram, sed
 miræ etiam magnitudinis aliquando excitat. Omnis
 autem Struma includitur membrana, vti *Steatoma*,
Atheroma, & *Meliceris*. Dicitur autem *χίπας*, *ve*
ἀπὸ τοῦ χοίρου ὡς πετρῶν, vel a porcis, in

quorum gutture frequentes eiusmodi tumores reperiuntur. Alij verò a multiplici partu porcorum, nomen desumptum putant.

Cholagoga, id est, bilis educatiua medicamenta, 4. aphor. 2.

Choledocos, id est, *vesica bilis receptiva*, quam etiam *Iecoris vesicam* nominant, lib. 7. de anatom. adin. cap. 2. eandem etiam *Cystimilis*, id est, *Vesicam bilis susceptricem* vocant, 4. de vlu part. c. 12. ut & *fellis folliculum*, 5. de loc. affect. cap. 7. Est autem *κίστις χοληδόχος* vesica in cauis iecinoris sita, inter venæ portæ & cauæ radices, bilem ex iecinore attrahens. Constat simplici tunica, villos habente intus rectos, nec ita multos, foris transversos, & medios horum obliquos. Ac rectis quidem bilem trahit ex hepate, obliquis retinet, transversis verò expellit. A collo enim suo stomachos habet duos; vnum in hepar inter venæ portæ & cauæ radices, numerosis surculis distributum, quibus bilem in se allicit; alterum verò rarò geminum, sæpius simplicem in ecphyssi d. lapsum, quo in ipsum & intestina bilem flauam expellit, eueria facile gemina membrana eius osculum in ecphyssi claudente. Maximo illa hepatis lobo dimidia mergitur, reliquam simæ hepatis tunica tegit ad venæ portæ exortum, a qua venulas duas, quas *χυστικάς* quibusdam appellare placuit, & a vicina hepatis simæ arteria arteriolas in iunum usque fundum agimittit. Recipit verò etiam vna portione in quandam nerui, qui a sexta coniugatione per collarum radices dextra parte ad partes ventris inferni peruenit.

Cholera, id est, *biliaris*, 1. prog. 25. est acutus affectus, cum vomitibus biliosis multis, aluique deiectionibus. Suris quoque se contrahentibus, ac frigescentibus ex-

tremitatibus, fiuntque in his ægris pulsus minores, & obscuriores. *Cholera* duplex est apud Hippocratem; altera, *humida*, in qua, vt omnes norunt, vehemens est excretio bilis supra infraque erumpentis, intestina grauiter torquentur, accedunt conuulsiones, sæpè etiam crurum Suræ contrahuntur; alteram, *siccā cholera* vocat Hippocrat. ab eadem prouenientem causa, ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluorem, & vomitum, lib. finit. Hic morbus ex continua ciborum cruditate proueniens quibusdam accidit certis intervalis, omnemque corporis redundantiam educit, vna cum vitiosis humoribus, magnam quoque bonorum partem euacuans: tantus est impetus, tantaque vis erumpentis humoris biliosis. *χολερίχοι* seu *χολερίωντες* dicuntur à Medicis, cholera morbo laborantes. Nomen habet non tam à *χολή*, quam à *χολάς*, id est, *intestinum* per quod materia ex ventre egeritur.

Chondros, id est, *Cartilago*, 7. de usu part. cap. 3. pars corporis omnium. post os, maximè tetra & solida, sensus expers. Communi autem significatione dicitur *Gratum*, & quod seorsum ex aliquo concreuit, vt *salis frustum*, aut *grumus*, & *thuris mica* seu *gratum*. quod *χόνδρος λιβανου* à Medicis appellatur. Quod & à Latinis *Alica* dictus sit *χόνδρος*, nemo Doctorum ignorauit; tam cōsentiūt omnia in. et se quæ Græci *περί χόνδρου* Latini de *Alica* prodiderunt.

Chondrosyndesmus, id est, *cartilagineum ligamentum*, 1. de temp. cap. 9. Hinc & *συχόνδρωσις*, vni ossium, cartilaginis interuentu facta.

Chora, *χωραι*, id est, *regiones oculorum*, seu *cavitates*, quæ superciliis subiacent, 8. de usu part. cap. 6.

Chorion, id est, *secundina*, est membrana extrema foetus vulvæ prægnantis mulieris adhærens, multarum venarum, & arteriarum contextu, interualla membranæ obducta habens, cui duæ aliæ membranæ interius adnascuntur: altera, quæ *Amnium*, id est, *Amiculum*, dicitur, toti fœtûi circumiecta: Altera, quæ *Alantocides*, id est, *Intestinalis*, eminentibus tantum partibus, capiti, natibus, pedibus, duplex superiecta, lib. de vulvæ c. 10. quæ Arabicis *Abgas*, *Camista fœtus*, & *profundario sudoris* dicitur, libr. de anat. vii. $\chi\omicron\rho\iota\upsilon\varsigma$ augetur vna cum fœtu, cumque vtero extenditur, ac foetum totum inuoluit, etiam qua os est vteri, vt scribit Galenus. Dicitur $\alpha\pi\omicron\tau\omicron\upsilon\ \chi\omicron\rho\iota\upsilon\varsigma$, quod in eo vasa, veluti in choro disposita sint. Sunt tamen qui $\chi\omicron\rho\iota\upsilon\varsigma$ per ω scribant, quod foetus veluti domiciliû & sedes sit: vel quod vna cû fœtu $\chi\omega\epsilon\iota$.i. *procedit*. Dicitur alias *δευτέρειον*, id est, *secunda*, vt scribit Paulus, lib. 6. cap. 75. Quo tamen nomine non extrema modò foetus membrana, sed totum etiam fœtus inuolucrum tribus membranæ compactum significatur.

Choroecides plexus (qui & *Retiformes* & *Reticulares*, dicuntur, vide *Plexus retiformis*) sunt conuolutiones membranarum cerebri, ex multis venis & arteriis, secundarum instar effigiatæ, nomine $\alpha\pi\omicron\tau\omicron\upsilon\ \chi\omicron\rho\iota\upsilon\varsigma$ id est, *membrana deductio*, quæ foetum extrinsecus in orbem ambit. 9. de anat. adm. cap. 3. Constituitur autem propè medium cerebri ventriculû, 9. de vsu part. c. 7. Dicitur adhuc & tenuis cerebri membrana *Choroecides*, id est *secundiformis meninx*. 8. de vsu part. c. 9. eò, quod cerebri vasa non aliter sustineat, quàm $\tau\omicron\ \chi\omicron\rho\iota\upsilon\varsigma$ vasa ad foetum pertinentia complectitur. Dicitur &

Choroëides, oculi tunica, corpus quoddā retiforme, quasi tunica, (*Amphiblestroëides* dicta) humorem vitreum oculi ambiens, quod ex portione tenuis meningis, & ipsius quasi cerebri supernè descendente, atque amplificata, est conflatum reti simile, quod retiforme corpus, a *Choroëide*, id est, *tenui meninge*, quæ illi supernè committitur, continetur; vnde tunica oculi *Choroëides* dicitur, 10. de usu part. cap. 2.

Chorda est membrum, ab extremitatibus muscoli ortum habens, ad similitudinem Chordæ arcus effecta. Est autem *Chorda* idem quod *Tendo*, non quod *Ligamentum*, 6. aphor. 46 & lib. de anat. vii.

Chordapsus, *Ileos*, seu *Vulvulus*, est tumor eminens, in tenuium intestinorum parte interna, vt videatur intestinum ad similitudinem Chordæ obuolutum, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris, graviter ægros vomitionibus crucians, adeò, vt nonnulli stercus quoque euomere conspiciantur. Hinc *Stercoraria* etiam dicitur *Vomitio*, & *Miserere mei Domine*, 6. de loc. affect. Dicitur autem $\chi\omicron\delta\alpha\psi\omicron\varsigma$, quod qui manus loco dolenti admouerit, is veluti $\tau\chi\omicron\delta\eta\varsigma\alpha\pi\tau\alpha\iota$, id est, videtur sibi Chordam tangere, propter magnam ex intestini inflammatione tensionem. Vide *Ileos*.

Chronica agnitudines, id est, *longa* de part. art. med. cap. 7. vide *Polychronius*.

Chrysis, $\chi\rho\upsilon\varsigma\iota\tau\iota\varsigma\gamma\eta$, terra est aurea, in qua paruis terræ particulis immixtæ sunt parvæ auri partes, quæ ab igne in fornacibus fusæ secum coeunt, 5. de simpl.

Chylus, est hordei lactive cremori analogus succus, albicans ex assumptis cibis, natiui caloris vi elaboratus, partim

partim tenuioribus porti onibus, partim crassioribus constans, ex ventriculo per melaaræas in iecur, ut ibi sanguinis formam consequatur, transmittitur, lib. de atra bile, c. 3. Eius generatio *χύλωση* dicitur, ventriculi propria actio, per quam cibus in Chylum mutatur.

Chymethla, id est *Perniones*, 6. simp. vide *Perniones*.

Chymosis (quæ & *Chemosis*) est utriusque palpebræ distortio, ex inflammatione oborta, 4. de comp. med. loc. cap. 4. Est item *Chymosis*, rubra, carnolaque carneæ oculi pelliculæ inflammatio, lib. de remed. par. fac. vide *Chemosis*.

Chymus, est nutrimentum, seu humor a nutrimentum animalis in hepate præparatus, depositis excrementis, 4. de usu part. Atqui Antiqui *saporem* vocauerunt *Chymum*, id est, *liquorem*, lib. de ocul. part. 2. cap. 1. *Chymi* autem appellatio apud Hippoc. semper humoribus corporis destinata est, ex quibus nos constituimur, sanguini inquam, nutrimur, & fouemur, pituitæ, & duplici b l. flavæ & nigræ. Apud Platonem verò, & Aristotelem, gustabilis qualitas quævis nobis insita, *Chymus*, id est, *Sapor*, nominatur, lib. finit. *χυμός* itaque cōmuni significato omnem humorem designat coctione quodammodo increassatum, tam in animantibus, quam in plantis: Inde τοῦ οὐχομένου & κακογύμου nomina deducta sunt. Quibus ea designantur, quæ humorē bonum malumve, hoc est, nutriendo corpori, seruandoq; aptum aut incommodū continent: In quo nihil differt *χυλός* τοῦ *χομοῦ*, sed peculiari quadam significatione *χυμός* appellatur ipsa gustandi facultas siue qualitas, quam *Saporem* vocant. Hic autem non aliud est, quam partis siccæ terreneque in humore permissio, vel partis siccæ per humorem vi caloris percolatio: efficitur

enim Sapor permiffione quadam.

Chyphofis, id est, *gibbofitas*, (quam etiam *Chyrtofin*, id est, *Incuruationem*, dicunt) est diftortio fpinæ in pofteriorem partem, vt in anteriorem *Lordofis*, *λорδωσις* dicitur. Galenus fcribit, Hippocratem *κυφους* folitum nominare, quos omnes *κυρτους* appellant. Est autem *κυφωσις* vitium fpinæ, quod à calu, icstu, & tuberculis, anteriorem thoracis partem diftendentibus, pulmonemque prementibus aliquando contingit, vt docet Galen. comment. eius aph. quo fcribit Hipp. gibbos ex affthmate aut tuffi factos, ante pubertatem mori.

Chyrtofis, vide *Chyphofis*.

Cicatrix, *οὐλή*, ab Hippocrate nunc fumitur pro ipfis vlceribus, nunc pro confolidatione vlcerum, caro callofa, pro cute induc̃ta, vbi vulneris, quod iam coiuit, hiatus fuerat, i. de artic. 56. Particulatim autem *cicatrix oculi* appellatur, vbi nigro oculi ex alto vlcere, membranæ craffities fuperuenit, & color albior apparet; quæ *Cicatrix*, fi fit & maior, & craffior ex vlcere Iridis nata, dicitur *Albugo*, lib. Introd. cap. 15. vide *Albugo*.

Cilia, extremæ illæ palpebrarum partes funt quæ in fomnis claufis oculis fimul committuntur, quæ & *Tarfi* nominantur, lib. Introd.

Cingentes, fiue *Succingentes*, membranæ fimiles quædam tunicæ funt, telæ aranearum fimiles, (membranæ quidem ab effentia, tunicæ verò ab vfu nuncupantur,) quæ totam vtramque thoracis regionem internam fubcingunt, vocanturque in coftis *Cingentes*, Græcè *Hypozocotes* ubi verò rectà ad iugulum perferruntur, *intercipientes*, Græcè, *διαφραττοντες*, (medi-

thoracem latera duo distrahentes) vbi pulmoni circumhærescunt, huius operimentum sunt, quarum basis supernis partibus septi transversa obicitur; interioribus autem alia quædam membrana, huius per similis substrata, quæ *Peritonei vertex*, & *principium*, iure optimo nuncupatur, 7. de anat. adm. cap. 8.

Cinnumenus, κινούμενος, idest, qui mouetur, morbus est qui diuersis horis sepe accedit, ac remittit. Contrarij huius sunt affectus ἐστώτης, iisdem horis subinde accedentes, & remittentes. Illius species duæ: *Anticipans*, & *longius emanens*, προληπτικός, καὶ ὑστερινός. Ille qui præuenit, citiusque horas persoluit, *Prolepticus*, siue *Anticipans* dicitur, qui tardat, *Hystericus*, idest posterius inuadens, lib. de Typis, cap. 3. Κίνησις omnem motum significat, & pro absurda in ægris motione sumitur, cum aut mente turbati, aut incontinentia corporis vexati, inordinatos & temerarios motus exercet, πίπτασµῶ que iungitur. In Coac. prænot.

Cion, hoc est, *Columna*, idem prorsus quod κίονες. Hoc tantum interest, vt ait Gal. quod τὰ γὰρ γαρεῶνα, Veteres κίονα, posteriores autem κίονι δα appellarunt. Vide *Gargareon*, & *Staphyle*.

Cionis, Vide *Staphyle*.

Circuitus, siue *Periodus*, est tempus intentionum & remissionum in morbis, quæ fiunt: ut Typus est ordo earundem intentionum & remissionum, lib. de Typis, cap. 3. vel *Circuitus*, siue *Periodus*, est similis ab eo nem ad idem reditus, 1. aph. 12. Sic enim singulis accessionibus recurrit morbus, vt redintegrari renouarique videatur. Is in febribus intermittentibus manifestissimus est, atque aliis morbis qui similiter post aliquod inter-

uallum repetunt. Continentes perpetuique morbi circuitus nullos habent. Est autem alius breuior, qui citò recurrit, alius plurium horarum vel dierum, alius analogiam seruat, alius non seruat. Est autem analogia temporis ad tempus, moris ad morem collatio, ut si in eadem hora, vel tardet, vel anticipet, aequaliter aut inæqualiter, ordinatè vel inordinatè, mitius vel sæuius. Omnis autem per circulum videtur fieri, ut qui ab vno statu redeat in eundem, atque id perpetuò ad finem usque morbi obseruetur. Itaque ab horrore qui febrem tertianam inchoat, usque ad alterius accessionis horrorem circuitus vnus est: similiter a rigore febris quartanæ, usque ad initium alterius rigoris vnus circuitus est. Ergo in circuitu remissio continetur, siue perfecta sit, siue imperfecta. Diuiditur enim circuitus in duas partes, *παραξυσμὸν & ἀνέσιν*, hoc est, *accessionem, & remissionem*, uti Hippocrates distinxit, & Galenus multis in locis explicauit.

Circumcisio, vel *Circumsectio*, est ablatio cutis glaudem contegentis in virili pudendo, quæ *Præputium* dicitur, lib. finit.

Circumnuens, vide *Innuens*.

Circumocularis tunica oculi est, quæ à crassa meningē orta, toti oculo substernitur, circumtangens, & circuminduens ossæam oculi substantiam, ne oculus humindatur nudus, lib. de anatom. viu.

Circumossalis membrana, quasi, ossium inuolucrum dixeris, est, quæ singulis ossibus in longitudine circumcitur, 1. de sem. cap. 10. quam in capite, *Pericranium* dicimus, lib. de anat. oculi. In costis autem, aliisque ossibus fere cunctis, *Periostion*, & de anat. adm. c. 10.

Ciri, vide *Cornua vuluæ*.

Cirsocele, vide *Cele*.

Cirfos, idest, *Varix*, alias quoque venas omnes dilatatas, Antiqui sic nominabant, lib. de tumor. cap. 16. Id autem contingit venæ, non etiam arteriæ, propter tunicæ mollietatem. Arteriæ namque tunicæ crassiore sunt atque robustiores. Distentionis causa est sanguis multus & crassus, qui non facile cedit, sed cui contra cedere vena cogitur, præsertim verò fiatulentus, qualis melancholicus est, proindeque ab eo varices ut plurimum fieri, Medici omnes prodiderunt. Fiunt tamen interdum a pituitoso, atque a puro etiam sanguine, præsertim quidem in cruribus propter eiusmodi sanguinis gravitatem aliquando vero etiam in temporibus & in una parte ventris sub umbilico, & circa testiculos & scrotum, atque in ipsis etiam inguinibus. Nascitur & in palpebris, authore Actio, atque ut semel dicam, in omni parte quæ venas habeat, maxime si prona est, & longius distita a fonte caloris natiui, vide *Varices*.

Citta, vide *Cittosa*.

Cittosa, idest, *vitiosi cibi appetentia*, qualis grauidis contingit, 6. de sanitate tuenda cap. 9. Dicitur etiam *Citta*, *Pica*, & *Picatio*, 1. de symptom. caus. capit. 3. & capit. 7. Causa est vitiosum quoddam recrementum, ventriculi tunicis impactum, sed cuius vitium facile explicari non possit. Pro diuersis autem eius qualitatibus varia appetuntur, sed imprimis Acida, Acerba, atque etiam Acris, & aliquando Terra, Testæ, Carbones. Panni veteres, Putria coria, & alia eiusmodi natura abhorrentia. Maxime autem hoc malo grauidæ infestantur ad extremum usque secundum tertium mensem. Quarto namque eo ferè liberantur, partim vitioso humore per uomitum uacuato, partim concocto, atque etiam absumpto crebris uomitionibus, fastidio, & ciborum quibus vitium ali debuisse, abinentia, quodque

quodque austerior eo tempore fœtus vnà cum sanguine vitiosum pariter humorem attrahat, atque conficiat. Verumtamen viros quoque idem affectus aliquando exercet, cùm & ij vitiosum deprauatumque eiusmodi humorem in ventriculo collegerint. Vocatur hoc vitium a Græcis *κίττα*, vel à picæ varietate, (est enim auis varia, nec sibi concolor, sed quæ alias plumas & pennas candido, alias nigro colore præferat) vel quod forte affectu consimili picam laborare obseruatum sit. Plin. grauidarum in alaciam sæpè dixit.

Clauis, siue *Iugulum*, sunt duæ primæ costæ propè guttur, inter os pectoris, ac spinæ finem, quæ ad scapulas est, à natura constitutæ, 13. de vsu part. cap. 11. *Caluiculas* etiam vocant, lib. de musc. diss. cap. 12. quas uulgò *Furculas* dicunt, quarum una *superior*, altera, *inferior* nuncupatur. Recentioribus autem, elatiore in thoracis fine, & quidem in anteriori parte *Claues* existunt; sic dictæ, quòd sterno, Omoplatas, idest, humerum firment; is autem finis uulgò, *Furcula superior* dicitur; Cavitates sub his *Clauibus* *σφαγαι* appellantur, idest, iuguli, ut sint duæ *Claues*, & iuguli totidem, dexter, & sinister: unde & *σφαγιτιδης*, *ingulares venæ* à Græcis appellantur.

Clausus, siue *Gomphos*, est oculi morbus, cùm Vena locum suum egrediens, pelliculas superficie tenus operit, unde eius forma fit, quasi *Clausus*, libr. de ocul. cap. 11. uide *Gomphos* & *Myrmecia*.

Clunes, uide *Coxa*.

Clydones, *Κλῦδων*, Symptoma est retentricis facultatis uentriculi, cibos, uel non complectentis, uel diminutæ, uel uitiosæ, unde flatulentia, & fluctuationes cum sonitu succedunt; flatulentia quidem, ubi & cibi

flatuosi sunt, & uentriculus non admodum frigidus; fluctuationes cum sonitu, cum uel nihil in eo continetur, quod uerti in statum possit, uel uehementer sit refrigeratus. 3. de sympt. caus. cap. 2. Qui hoc symptomate laborant, non possunt concoquere sufficienter, & eo diutius in eorum uenter grauitas manet, quo tardius concoquunt.

Clyster, κλυστήρ, Latinis idem est quod *Lauamen* seu *Ablutio*, a verbo κλύζειν, quod & *lauare* significat; Alio nomine Græcis ἐνέμα, ac ἐν ἡμῇ, *infundo*, dicitur, quæ vox Latinis *injectionem* significat. Medici huius temporis, *Clysteris* & *Enematis* Græcis vocibus quam Latinis malunt uti. Dicitur adhuc & *Clyisma* unde *Dia-clyisma*, idest lauatio ad uiscera, & dentes titubantes, infirmosque. Dicitur adhuc & *Clysmus*, de med. facult. part. cap. 16. Est autem *Clyster* medicamenti genus, quod liquidum intra partem aliquam corporis iniicitur: Sed priuatim etiam instrumentum ipsum significat, quo medicamentum iniicitur. Id Galeno, ut multis apud eum locis videre licet, fuit vesica, cui cornea, vel alterius materiæ fistula recta, & fracta ad finem annexa erat. *Clysteris* usus præcipuè inferuit intestinis, iisque crassioribus; neque enim ad tenuia ferè pertingit. Conuenit tamen, & utero, & auribus, & fistulosis sinuosisque ulceribus: sed qui utero adhibetur, peculiari nomine *μυητροχύτης* dicitur. Est autem multiplex *Clysteris* facultas intemperiem emendat contraria qualitate, deterget ulcera, siccatur, conglutinat, mollit aluum, vim excretoriam sopitam irritat, vacuat omnis generis humores intestinis contentos, soluit flatu, sedat dolores, adstringit aluum, pro varia medicamentorum, ex quibus constat, facultate.

Cneme, *κνήμη*, idest, *Tibia*, seu alterum ex duobus ossibus tibiæ, eodem cum toto membro nomine; alterum verò *Perone*, seu *Fibula* dicitur, 3 de usu part. c. 9. ambigua ergo significationis est. Interdum totam eam partem significat, quæ inter astragalum genuq; posita est, ossibus geminis constantem, quam *Crus* Latini dicunt. Interdum verò id os peculiariter designat, quod eorum est maximu, Latini *Tibiam* vocant, nam quod minus est, *περόνη*, idest, *Sura*, appellatur. Sic *πῆχυς* modo utriq; os cubiti, modò eorum lōgissimu in significat, vt annotat Gal. Certum tamen est, *τὴν κνήμιν* partem esse τοῦ σκέλους, quod Galenus diuidit in tres partes, *μυρόν κνήμιν καὶ πόδω*. Est autem os tibiæ crassissimu, & interiori in parte situm, & ique soli femur per *Diarthrosin* articulatur. Nam *περόνη* tenuior multò est, & exterius sita, nec tam alte atturgit, vt genu contingere possit. Inter se autem hæc duo ossa membranoso ligamento sursum deorsumque colligantur, in medio multum ab inuicem discedunt, vt se habet etiam in cubito & radio. Qua parte verò tibia cum femore copulatur, magnam habet epiphysim, & in eas cavitates duas, in quas duo femoris condyli inseruntur. Inter eas autem corpus quoddam *νευροχονδρώδες* eminet, ipsas etiam cavitates adaugens, & inter duos illos femoris condylos attollitur. Habet autem & tibia inferiore in parte epiphysim interna in parte prominentem & gibbam, sicut & aliam *περόνη* externa in parte, quæ quidem duæ apophyses *σφυρά*, idest, *malleolli* proprie appellantur. Est autem tum tibiæ tum perones figura prope triangularis. Ac tibiæ quidem anterior angulus, quia multum acutus est, a quibusdam *ἀκανθα*; quia verò veluti frons

est τ κνήμης, ἀρτικνήμιον nominatur.

Coadiuvatrix causa est, quæ sua virtute morbum efficere non potest, sed alteri auxiliatur, ut libido articulare morbum promouet, & sanguinis eruptionem remigatio, lib. introd. cap. 8.

Coarticulatio, vide *Abarticulatio*, & *Dearticulatio*.

Coccyx, [vulgo *Canda*] idest, *Cuculus*, est os, quod subest ossi sacro, lib. de ossib. cap. 12. & 3. de art. 104. vide *Cuculus*.

Coctio, quid sit, hinc nosces, cum facultates quatuor sint, atque inter eas non minimè valeat alteratrix, per quam natura alimentum assimilat, *Coctio* nuncupatur nutritivæ substantiæ permutatio, secundum qualitatem, 4. rat. vict. 44. *Perfecta urina coctio* est, quando in vrinis subleiderit aliquid album, & læue, & æquale, & continuum: *Debilis autem coctio* est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanferit, hæc quoque imminutæ, & debilis coctionis est signum, & rufa etiam actenuis, ex eodem genere est, 1. de cris. c. 27.

Coctionis signa sunt, quæ hominis salutem, non tamen per Crisim, futuram ostendunt, quo distinguuntur à *Decretorijs*, quæ salutem hominis futuram, per Crisim ostendunt *Coctionis* autem, quæ inspirandi sit instrumentis, sputa; eiusque in venis, *vrinas*; illius quæ in ventre, *alvi excrementa*, *indicia*, & *characteres* statuere oportet; in febribus (quoniam venosi generis sunt passionēs, nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad *vrinas* præcipue attendere oportet, 1. de cris. cap. 7.

Cæcum foramen, est angustius illud foramen, quod ex duobus inæqualibus foraminibus, quibus quinta.

neruorum coniugatio à Cerebro excipitur, propè aures est collocatum, cui subditur labyrinthus quidam, quem natura effecit, musculis temporalibus consulens, neruum eis durum simul, & labiis immittens, 9. de usu part. cap. 13. Vide *Meatus auditorius*.

Cacum intestinum, siue *Orbum*, siue *Monoculum*, est quartum intestinum in ordine, primum locum inter crassa obtinens, lib. de anat. viu. Quidam illud *sacrum* nominant.

Cælistatus, idest, ambientis non aeris temperies, temporisque præsentis constitutio, 9. meth. 9.

Cælia, κοιλία apud Græcos, sine adiectione omnem ventrem significat, 6. aphor. 20. Apud Aristotelem tamen dicitur *Celia*, illa tantum corporis partis cavitates, in quibus cibis denoratur, & prima concoctio peragitur. Latius tamen patet hoc nomen, nec receptaculum modo ciborum significat, sed omnem etiam cavitatem in profundo positam, ut cerebri, cordis, iecinoris, & reliquarum partium. Apud Hippocrat. nunc cum adiectione superior, & inferior venter significantur; ut *superior* sit ventriculus; *inferior*, omne, quod sub diaphragmate est, spatium latius. Erotianus annotauit τὴν κοιλίαν ab Hippocrate dici non modo spatium illud latius, sed interdum internum quoque thoracis spacium, & ventrem ipsum, & vlcerum cavitatem.

Cæliaca, idest, *Ventralis dispositio*, communis morbus est ventriculo, & intestinis, in ouo materiæ, non mordaces, egerunt, ob intestinorum imbecillitatem, quæ retinet contenta, ne exiguo quidem tempore possunt, sed ea illic excernunt, perinde, ac si graue aliquod onus deponerent, haud secus quam in lian-

guria,

guria, in qua ob acrimoniam & vellicationem vesica iugiter, quicquid ad eam peruenerit, excernit, quod molem ipsius vel exiguam sustinere nequeat; 6. loc. affect. cap. 2. vnde *κοιλιακοι* dicuntur, quibus excrementa læuia, humentia, & semicocta, aluo continenter fluida redduntur aliquanto postquam assumpta fuerint tempore. Causa huius mali, est assidua cibi corruptio, & cibus cacochymus, adhæc frigiditas, aut vehemens ardor, aut plagæ ventri inflicte. Ex longis quoque morbis facile hic morbus contrahitur; vide *Lienteria*.

Cælomata, sunt rotunda, & caua vlcera, bothriis latiora, quæ in oculis circa Irim nascuntur, in cornea eorum tunica, lib. introd. cap. 15,

Cælum. *κοίλον* more vulgi appellat Hippoc. aerem, 1. de morb. vulgar. 1. qui supra nos est, usque ad nubium regionem, comm. 1. in 1. de morb. vulg. 4. quamquam eo nomine *cavitas omnis* designari potest, tamen specialiter *Cælum* vocatur *superioris palpebra superficies*, sicut *Hypocælum* ὑπόκοίλον pars inferior. quæ ei respondet, illud tùm in aqua inter cutem, tùm in alterius generis malo habitu, tùm in diuturnis hæmorrhoidibus, longis mulierum profluuiis, atque inchoantibus ophthalmiis intumescit. Sunt qui *Cælum* τὰ κοίλα oculorum interpretantur cavitates, quæ sub oculis, & vtraq; nasi parte cernuntur, quæ tamen *κρυφοί* dicuntur.

Cerulea oculi tunica eadem est cum *Rhagoeide*, *Vnea*, & *Vviformi*, procul dubio ob versicolorem internam huius superficiem sic dicta, 10. de vitu part. cap. 4. vide *Rhagois*.

Coincidentia, siue *Intercidentia*, quam *Paremptosim* Græci vocant, est, cum aliunde in aliud vas humor fluit, 7. de anat. adm. c. 16. in oculo autem *coincidentia* est, ubi in meatum porumve opticum qui a basi cerebri veniēs, oculo videndi facultatem tribuit, humor ad aperto, vel rupto vase incidit, obturatque eum, unde cum dolore visus offenditur, lib. introd. cap. 15.

Coindicantia sunt, quæ præter proprias cuiusque morbi indicationes, ad hæc ægri virtutem, naturam, ætatem, anni tempus, regionem, consuetudinem, & si quæ sunt id genus alia, considerant, ac a primis indicantibus indigitata præsidia approbant & confirmant, 13. meth. 16.

Cola, dicuntur in homine longiora, maioraq; membra, a Thorace separata, & quasi dependentia, vt brachia & pedes, Latinis dicuntur *Artus*, 3. de usu part. c. 1. verum Pollux *κῶλον* (quod & *κῶλυμα*, nquit, vocatur) ex femore tantum & crure constare scribit. Dicitur & *Cola*, ossa narium, vide *Ithmocidea*.

Colatoria ossa, sunt narium foraminulenta & cavernosa ossa, quæ a cribri similitudine, *Ithmocidea*, vel *Spongia*; *Spongocidea* appellantur: varia enim habent foramina, quo modo & *Spongiæ*; neque ea habent recta. vt cribra, quod per ea superflua Cerebri excrementa transcolentur, & odoratum rerum species ad processus mammillares recta ascendant, 8. de usu part.

Coles, est particula quædam corporis insignis, ad extremum collum vesicæ sita, qua mares fæminas exsuperant, quam Græci *Caulon*, *περίνησιον*, eu *περίνησιον*, Latini, *Penem*, *Colem*, *Mentulam*, *Virgam*, & *Pudendam virile* nominant, 5. de usu part. cap. 15.

Colica dispositio, est morbus plenioris intestini diuturnus,

turnus, in quo cruciatus intolerabiles, difficultates spirandi, sudores, perfrictionesque suboriuntur, libr. finit. Suntque *Colicus* & *Volvulus* intestinorum etiam inflammationes, quorum alter tenuioris intestini affectus est, alter plenioris, quare deiectiones includuntur, & flatus intestinibus inuoluti, eò quòd exitum non habeant, dolores vehementes, & tormenta concitant, lib. Introd. cap. 13. & 2. de loc. affect. 5. Inde Colica medicamenta sunt, quæ ad sedandum *Coli* dolorem sunt comparata, quæ quidem etsi anodyna sunt, a communi tamen anodynorum forma differunt, quòd quæ propriè Colica appellantur, aromatis odoratis, ac urinam cientibus feminibus permiscetur, & quanquam Colica vocentur, non tamen ad Colicū tantum, sed ad omnem dolorem in quacunque corporis parte factum, sedandum admouentur; quo factum est, (inquit Galen. initio libri sexti de locis affectis,) ut antidotos omnes dolorem sedantes, Veteres Colicos nuncupauerint; vide *Narcotica*. Quamuis autem *κολλικόν* variis de causis oriri possit, sic tamen potissimum dicitur, qui à frigido, crassoque aut viscoso humore, aut flatuoso spiritu excitatur. Eum consequuntur nausea & uomitus pituitosi atque corrupti humoris multo grauiore & magis assidui, quam per nephriticos affectus, adhæc excrementorum retentio, ut ne flatum quidem, neque etiam ructum possint emittere.

Sæpè etiam veluti circuire videtur dolor, atque plurima loca occupare, & modo in hoc, modò in illa parte vehementior fieri, cum nephritici dolores eodem in loco stabiles iugiter infestent. Difficile tamen est discrimen, adeò ut non modò plebei, sed Medici quidem discernant, omnesque eos dolores, siue Renes, siue Vreteras, siue Mesenterium, siue tenuia etiam

intestina occupent, *κολληήν* indifferenter appellent.

Colleſtica medicamenti facultas eſt, quæ vlcera, & vulnera glutinat, 5. de ſimp. c. 2. *κολλητικὸν φάρμακον*, glutinatorium medicamentum, eſt quod coniungit & vnit diuiſas partes, vt in priſtinam vnitatem reducantur. Quidam *ἐναιμον* & *τραυματικόν* etiam appellant, quod cruentis, & vulneribus adhibeatur. Verum non in cruentis modò protinus glutinandis eorum uſus eſt, ubi ſanguinem ex plaga adhuc profluentem ſpongia deterſerimus, deinde ſuturis, aut fibulis coarctauerimus, ſed etiam in ſiquibus veteribus, cùm ab omni inflammatione eos vindicauerimus, puerosque medicamenti reddiderimus. Cæterum quod glutinandi facultatem habet, plus ſiccet quidem oportet, quam quoddam carnem producit, nec tamen detergeat, nec expurget, ſed contra prorſus ſubſtantiam omnem in idem cogat, cuiuſmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ *auctera*, & *aſtringentia* vocantur: hæc namque in idem cogendi, ac ſtipandi, non detergendi neque purgandi facultatem habent. Eorum namque ſinis eſt, prohibere ne vlla inter coituras partes ſubnaſcatur humiditas. Eſt autem glutinantium materia diuerſa pro corporum varietate, quæ glutinari debent. Quæ ex Argenti ſpuma, Oleo, & Aceto præparantur, imbecillam, mollemque carnem glutinant: quæ Bitumine, Ærugine, Squama, Aloe, & Myrrha conſtant, robuſtam, & duram.

Colleſtica inæqualitas pulſuum, quæ ex inæqualitate plurium pulſuum eſt conflata, 1. de diff. pulſ. c. 30. quæ & *Systematica* dicitur; vide *Systematica*.

Calliculum idem eſt quod *Nympha*, caruncula pimirum membranola, ad ſiliſuram colli matricis exorta,

quæ

quæ dum virgo defloratur, rumpitur, quam quod multum promineat, Ægyptij in Virginibus excidere concucuerunt, libr. Introd. cap. 10. Atqui plures ex antiquis Anatomicis, tum præsertim Auicenna, dicunt illis, quæ nondum Venerem sunt expertæ, circa medium colli vteri, panniculum virginalem dictum esse, qui *Hymen*, aliis *Hymenæon* vocatur, & ut aiunt, in prima coitione rumpitur, quod verisimile non videtur; nam in dissectione Virginum non apparet, nec vquam quod legerim, meminit Galenus, sed potius credendum est, collum ipsum, quod musculosum sit, & nervosum, ex ipsa textura tantummodo connuere, & angustum esse. Nympha verò est adnata Epiphyllis, & appendix cutacea, lata, intra pudendum muliebri, supra alarum commissuram, ad vrinarium meatum sita; gemina autem est, vtrinque scilicet vna, data est a natura, tum ornamenti causa, (nam quod Peni virili præputium est, & Vua Pharingi, id Nympha vtero) tum etiam ut Vterum à pulvere, frigore, & aliis externis iniuriis tutatur, 15. de usu part.

Colliquatio, vide *Anastoiceiesis*.

Collisio, & *contusio* est, cum exterior superficies percussæ corporis continuitatem seruat, multæ verò exiguæ diuisiones in profundo apparuerint; at cum cavitatis aliqua forinsecus apparet, quam rei collisæ percussor impresterit, tunc *Illisio*, Græcis *θλάσμα* dicitur lib. de sympt. caus. cap. 11.

Collum vteri, siue *Os vteri*, est illud, quod intus est, ubi Vterus desinit, Collum vero incipit, quod magis propriè *Os vteri* diceretur; nam altera colli extremitas, quæ mulieris pudendis coniungitur, non *Vteri*, sed ipsius *Colli os* non sine ratione diceretur, quinto aphor. 46.

Colum, vide *Dorsum*.

Collyria, Latinis medicamenta vocantur, quæ oculis admoventur, Græci Κολλούρια nominant; hæc verò duum generum sunt; quædam enim liquida sunt, & passim *Collyria* nominantur; quædam arida, & hæc barbara voce dicuntur, *Sief*, Græci hæc vocant ξηροκολλούρια; illa verò, υγροκολλούρια. 9. simplic. & 4. c. c. comp. medic. loc. c. 5 Κολλούριον quodque medicamentum est oblongum, rotundum, ex liquoribus, succis, feminibus, fructibus & metallicis, ad varios usus compositum, compactum, cohærensque in modum ferè eius, quod vulgus *Pharmacopolarum Magdalenem* appellat. Sic enim olim reponebantur & asseruabantur *Collyria*, cùmque vtendi occasio esset, ea vel integra, sicuti condita erant, adhibebantur in usum, vel soluebantur in puluerem, qui aut siccus, aut humore aliquo dilutus affectæ parti vel oblinebatur, vel linimento exceptus indebatur, vel suffitionibus, aut alio modo inferuiebat. Namque τὸ κολλούριον Antiquis figuratum fuisse, & certam habuisse formam, ex veterum Medicorum lectione cognoscitur, qui pleraque medicamenta in *Collyrii* formam fingenda præcipiunt. Sunt ex Græcis, qui κολλούριον, sine diphthongo scribant. Sunt etiâ qui malint κολλούριον dictum esse περὰ τὸ κολλᾶ τὸ ροῦν, hoc est; quod comprimat fluxionem: alii verò, περὰ τὸ κωλύειν: utrique credo existimantes, eam modo vnam esse *Collyriorum* facultatem, ad sistendas fluxiones. Verum tamen non ad eam rem modò, sed ad omnes omnium partium affectiones, quibus admoventi possunt, comparata sunt à Medicis *Collyria*, diuersarum omnino facultatum: Fistulis enim induuntur aliàs ad conglutinandum,

nandum, alias ad detergendum, alias verò ad extirpandos earum callos. Imponuntur & naribus ad Polyporum & Ozænarum curationem, itemque auribus vice-re affectis, auctore Galeno. Adhibentur & utero tum ad ciendas purgationes, & ad foetum atque secundas expellendas, tum ad sistendum etiam immodicas sanguinis excretiones, &c. Verùm *Collyria* in oculis præcipuum vsum habent, qui quanto sunt reliquis corporis partibus præstantiores, tantò magis Medici veteres in eorum *Collyrijs* elaborarunt, & eorum copia quodammodo luserunt.

Collobomata Græci vocant partes, quæ in labiis, aut narium alis, aut aure deficiunt, & decurtantur, 14. meth. c. 16. quæ propriè *Curra* vocantur, seu *Mutila*. Huius generis sunt, & quas in maiore oculi angulo *ποιάδας* vocant, eo utique vel impensius extenuato minoreque facto, vel prorsus abolito.

Colon, intestinum quintum in ordine à ventriculo, secundum autem in crassis, inter cæcum & rectum medium, 6. de anat. adm. cap. 9. Dicitur verò *Colon*, idest, *Laxius intestinum*, quod excrementa ex distributione segregata suscipit, lib. introd. cap. 11. quod & *pingue intestinum* appellat Galenus, 2. de symptom. caus. cap. 5. unde propter sui latitudinem, ipsum solum quidam *ventrem inferiorem* appellant, 4. rat. viñ. 112. Id dextra prius illa præternectim, ad sinistram renem emergit, perque ventriculi fundum, & iecinoris cauum ex porrectum, descendit ad rectum intestinum. Abscedit longissime a centro mesenterii, quod non expediat venas mesaraicas valdè exugere ea quæ continet excrementa: cæco autem, ut ait Galenus, ad portionem respondet. Sicut enim cæcum valdè extuberat globosumque est, ita & *Colon* tota sui longitudine multos habet

medios globos, & veluti, cellulas, exiguas quidem, nec tantas quantum cæcum (hoc enim totum veluti quidam venter est) sed ad portionem eius similitudine contactas. In co crassiores fæces diutius commorantur, donec excernendi tempus appetat. Itaque fit, ut sæpè ab his male afficiatur, variisque morbis tentetur, pro contenti excrementi qualitate.

Columella, Κίον, Κιονίς, & *Columna*, siue *Gargareon*, & *Vua*, caruncula est membranosa, in fine palati, a faucibus dependens, vocis instrumentum, quod hiante ore conspicitur, libr. finit vide *Gargareon*, & *Staphyle*.

Coma, idest, *Sopor*, siue *Propensio* & *delatio* in somnum, est, cum vigilare ægri nequeunt, non apertos habentes oculos, sed conuiuentes, & alto somno, detinentur, com. i. in 3. de morb. vulg. 7. vide *Caros*. Hippocr. verò *Cataphoram*, omnem ad somnum propensionem, *Coma* appellat; est enim in somnum delatio non valentibus infirmis vigilantium munia obire, sed cum palpebras claudere cupientibus, tùm dormire sperantibus; cùm autem ægri clausis palpebris dormire nequeunt, sed plurimùm vigilant, *Coma* ἀγπυπνῶδες, idest, *Peruigil*, & somniculosum vocat, com. i. in 1. prorrh. i. Aliquando *Coma* pro *marcore* sumitur, 4. lanit. tuend. c. 4. Marcere enim torpere significat, atq; languore & inertia teneri, vnde Celsus de Lethargo dicit; *Marcor* est inexpugnabilis dormiendi necessitas, & comatosos pro insomnolentos, & inertes appellat. vide *Sopor*.

Comitialis morbus, est omnium corporis partium, ex temporum interuallis facta conuulsio, cum mentis ac sensuum oblæsiōe, qui & *Epilepsia* dicitur, 3. loc. affect. 7. & de differ. morb. cap. 5. Quin etiam *morbis magnus morbus sacer*, *affectus puerilis*, & *Herculeus* dicitur

Puerilis

Puerilis quidem, quoniā pueritiæ tempore sævit; *Herculeus*, non quod *Hercules* eo vexaretur, sed quidam morbi sævitie exprimere volentes, nomen hoc magnitudinem significans, *Herculem* effinxerunt, comm. 6. in 6. de morb. vulg. 7. Dicitur adhæc *Puerilis*, ut qui à pueritia incipiens, ferè semper consenescat; Latini *Comitiales* dixerunt, quod in comitiis, & hominum frequentia maxime ægros corripiat. Quo in morbo quia spiritus se ferè totum in suos ventriculos tanquam in arcem recipit (quod & spiritui vitali calorique accidit, si quid cordi molestum est, tunc enim in cordis ventres, spiritus calorque vitalis se recipiunt, reliquis partibus calore destitutis & frigentibus) idcirco ægri neque vident, neque audiunt, neque aliter omnino sentire possunt, sed facultate pristina destituti muscoli urinam, stercorem, & semen quasi resoluti profundunt. Horum enim symptomatum ego potius eam causam esse existimo, quam cerebri ventriculorum obstructionem. Nam præterquam non est tanta ventriculorum obstructio (qualis in Apoplexia esse perhibetur) ut cursum prorsus intercipiat spiritus animalis, certum etiam est eam non esse communem omnis Epilepsiæ. Tres enim cum sint, auctore Gal. comitialis morbi differentie, una omnium frequentissima cerebri propria est, hoc est, ab humore in ipso cerebro genito, aut cumulato: altera, ab ore ventriculi, affectu scilicet ab eo ad cerebrum per consensum ascendente: tertia verò, à quavis alia parte, à qua affectus ipse incipiens, sentiente ægro ad cerebrum usque conscendit. Vide *Epilepsia*.

Commisura, quæ & *Sutura* dicitur Synarthrosis species est, & ossium compositio, ad confuturam rerum similitudinem, quæ & *Serrata* dicitur, cum Serræ motu, contrario occurſu congregiuntur, ubi dentatæ alterius

terius partes in alterius sinus committuntur , lib. de
ostibus in proëmio.

Communis morbus, siue *universalis*, Græcis *παράκοινος*,
est, qui multos in communi inuadit , cui oppositus est
morbus, qui *Dispersus*, siue *Sporas* dicitur, qui aliquos se-
paratim tantum inuadit. *Σποράδες* igitur siue *σπορά-
δες* *νόσοι*, plures sunt simul morbi vagantes, & gen- re
diuersi siue perniciosi, siue mitiores, quorum alius alium
inuadit. Non ab aere, sed à victus ratione nascuntur ,
quam singuli habent propriam & peculiarem . Inter
communes alii sunt *publici*, quos vocant *Endemios*, in
quo genere *Scorbutus* est; alij, *vulgares*, seu *publici
grassantes*, quos *Epidemos*, seu *Epidemios* vocant, vt est
pestilentia. *Endemius morbus*, si alicuius sit ciuitatis, vel
loci proprius, dicitur *Vernaculus*, com. 1. in 1. de morb.
vulg. in argumento; vide fusiùs, in verbis *Pandemus*, &
Epidemus.

Communis, siue *media Cubiti vena* est, quæ communis
ei, quæ humeralis nominatur, atque ei quæ per axillam
ad manum fertur, 2. de loc. aff. cap. 7. quæ & *Mediana*, &
Corporalis, & *Purpurea*, & *Nigra* dicitur, lib. de anatom.
viu. vide *Media*.

Compages. Capitis sunt futuræ, qua parte ossa capitis
inter se mutuò compacta coaptantur ; futuræ vero ex
translatione dici consueuerunt, Caluariæ enim ossa
a seò exquisitè inter se coniunguntur, & coaptantur, vt
ipsorum coniunctio per Harmoniam, idest, ex compa-
ge, & coaptatione facta, meritò futura ex pannorum,
qui consuuntur, similitudine, dicatur, com. 3. in lib. de
iis, quæ in med. fiunt, 36.

Complexio febrium est, quando duæ febres horis di-
ferentibus inualescunt; *Confusio* autem, quando eodem
tem-

tempore incepterunt, 2. de differ. feb. cap. 8.

Compositus morbus est, qui ex pluribus accessionibus, & remissionibus, siue eiusdem generis, vt duarum, vel plurimum tertianarum, quotidianarum, vel quartanarum, siue diuersi generis, ut unius tertianæ cum quotidiana, vel cum quartana, constat: cui oppositus est *morbus simplex*, unam genere interuersionem, & remissionem faciens, lib. de Typis, cap. 3.

Compressio, est laterum cuiusq; vasis astrictio, & angustatio per coalitum, 1. de caus. sympt. cap. 5. differens ab *obstructione* (quæ & *oppilatio* dicitur, 2. de caus. puls. c. 1.) quippe hæc est meatuum nostri corporis interclusio, ex aliquo tumore, vel corpore interposito, non per coalitum, lib. de differ. morb. cap. 7. Illa autem in primis ab externis oritur causis, E. G. compresso extrinsecus nervo, angustia meatui eius colligit, 1. de symp. caus. cap. 5. & de differ. in orb. cap. 5.

Compunctio, est perforatio, quæ acu fit suffusis, 10. de usu part. cap. 6.

Conarium, vide *Conoides*.

Concaua vena, est *Vena porta*, 5. loc. affect. cap. 3. vide *Vena porta*.

Concausa, vide *Continentes*.

Conceptio, id. est, *seminis comprehensio*; motus est qui-
am contractionis Vteri, dum semem in seipsum eiacu-
tum amplectitur, manu veluti quadam auditissimè, lib.
n animal sit id quod, cap. 2.

Conchula, Κότλη, vide *Aures*.

Concoctio est ciborum a ventriculo, in conuenientem
animali qualitatem alteratio; quæ concoctio si tarda, &
grè longiorique iusto tempore fiat, *Bradypepsia*; si
tem in alteram qualitatem, non in eam, quæ sit se-
ndum naturam, fiat mutatio, *Dyspepsia*; si vero nulla

fiat alteratio, sed quales sunt assumpti cibi, tales in omni qualitate manent, & deiciuntur, dicitur *Aperpsa*, 1. lib. de symptom. differ. cap. 4. Alteratio ipsa, usque quò alimentum in similitudinem partis, quæ nutritur, transmutatur, *Concoctio*: ubi verò iam parti opponitur, *Nutritio* dicitur, 8. de compos. med. loc. cap. 6. *Concoctio* eorum, quæ præter naturam sunt, est ipsa maturatio morbi; at ipsa *Concoctio* in coquentis substantiam deductio quædam est eius, quod concoquitur, com. 2. in 1. de morb. vulg. 44.

Condensantia medicamenta omnia frigida sunt, & aquea, quare poros cutis, & meatus in vnoquoque corpore condensant, & contrahunt: Cæterum, instrumentum vndique totum constringere nequeunt, vnde & *Pycnotica* dicuntur, differuntque à *siccantibus*, quod frigida & sicca sint; ab *obstruentibus*, quod frigida & crassa sint substantiæ, 5. de simpl. c. 14. vide *Obstruentia*.

Condiloma, quali dicas *Nodus*, est extuberatio, quæ cum phlegmone in rugosa contrahentique se ani parte, exsurgit, ubi finit. quæ & *Thyrnus* dicitur, 14. meth. 6. 3. Est adhuc carnis excrecentia callosa in digitis manuum & pedum, in sede item, ac vteri ore coalescens; sic dicitur tumor hic, quod promineat in modum articuli, quem *Condylon* appellant, sed hic affectus in sede præcipue oritur, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet; ubi uerò amplius intumuerit, tunc fit *Condyloma*, & aliquando citra inflammationem fit, & molle est; quandoque verò cum inflammatione, tumque durum est, & dolorificum. Gal. lib. de ossib. c. 5.

Condylus, idest, *Tuberculus*, seu *Nodus*, est gibbæ ossium explantatio Radij, & Cubiti, quæ Carpo dearticulatur,

ticulatur; ob id etiam aliquando *Capita* dicuntur, & *Apophyses*, 2. de usu part. cap. 2. Dicuntur & *Epiphyses*, idest, *artuum capita*; ubi enim os medullam habet, eius finibus utrinque caput instar operculi cuiusdam, ut plurimum vides adnasci, 10. de usu part. c. 18. vide *Nodi*, & *Articulus*.

Confusio febrium, vide *Complexio*.

Congelationes, passionēs omnes dicuntur, quæ à causa frigida, & vehementibus algoribus ortum duxerunt lib. de diff. morb. cap. 5. In specie *Catalepsi*, & *Nervorum rigorem*, sic vocitant.

Conia stæte, idest, *Lixivium destillatum*, 1. ad Glanc. c. 3. *Κορία* tria potissimum significat, *Calcem*, *Cinerem*, *Lixivium*, sed aliquando additur hoc ipsum de quo intelligi debeat, ut *κορία ἀσβεστος*, *κορία ἀσβεστού* *Lixivium calcis*. Simi iter *κορία στακτῆ καὶ δινημένη*, *Lixivium stillatitiū & excolatum*, ex loto & percolato cinere factū, cuiuscumq; generis ille sit, *Vitis*, *Fici*, *Mali*, *Tithymalorum*, *lapidum* partiumve animalium. Ex reliquiis enim quorumlibet corporum visorum ablutis, *Lixivium* fieri potest præditum diversis facultatibus, pro eius quod eluitur natura. Eius enim quod *empyreuma*, seu igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum est, eius quod tale non est, etiam moderatius: Idem verò etiam simpliciter *στακτῆ* appellatur. Quod si *Cineri* cuicumque *Calx* addatur, id *Lixivii* genus *πρωτόστακτον* appellari, *Paulus Aegineta* author est, lib. 7. Sunt & alia *lixiviorum* genera, varias sortita appellationes ab artificibus, quibus illa inferunt; ut *πυλοποιητική*, & *σαπωναρίκη*, quorum illud figulis hoc verò saponariis in usu est, nisi quis malit paratum ex

sapone lixiuium intelligere .

Coniectura artificiosa, quæ prope ad veritatem accedit, 1. de cris. c. 9.

Coniunctiua oculiunica, Vide *Rhagois*.

Coniunctiua causa, Vide *Continens*.

Conoecides corpus, siue *Turbinatum*, quod & *Conarium* dicitur, Cerebri particula est, veluti firmamentum quoddam venis, a magna vena caua propagatis adiacēs, libr. de anat. adm. cap. 3. cuius substantia glandula est, figura autem *Cono* per quam similis; vnde ei nomen quoque est impositum; vtilitatem autem ei eandem esse existimant aliqui, quæ est Pyloro ventriculi; nam vt hunc confirmant esse glandulam, prohibereque ex ventriculo cibum prius, quam is coctus sit, in tenue intestinum transiunt; ad eundem modum, & hanc glandulam *Conarion* in principio meatus eius constitutam, qui spiritum ex medio ventriculo in *Parentecephalidis* ventriculum transmittit, custodem quendam esse aiunt, & velut *Oeconomum*, non plures spiritus de sele emittens, quam quantum spiritus mitti oportet, 8. de vsu part. cap. 14.

Connutritus morbus est, qui longinquo tempore hominum corpora infestat, atque his veluti connatus est, com. 5. in 6. de morb. vulg. 6.

Consistentia urina, huius est tenuitas, & crassitudo, 9. meth. 4. quam Arabes vocant *Vrina substantiam*.

Consistentia, seu *Status Paroxyismi*, *crux*, est illud tempus accessionis febris, cum iam caliditas materiam conuicerit, atque vsque adeo color augetur, vt non modo locum exurat, in quo est putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur; ac cum iam ad summum feruoris deuenierint humores accensi, id accessionis tempus *consistentia* appellatur, tunc vero

verò vniuersum laborantis corpus igneum redditur ,
 extensa per totum animalis corpus æqualiter calidita-
 te, 2. de diff. feb. cap. 11. vide *Ascensus morbi*;

Constitutio, καταστροφis, est in proprium sedem ali-
 ius luxati corporis collocatio, restitutio, & repositio, 4.
 de fra. 38.

Contenta, ἰχόμενα dicuntur ab Hippocr. humores
 solidarum partium spatis & cauitatibus conclusi: qui
 tamen non hac tantum ratione contineri dicuntur, sed
 quod etiam ab ipsis solidis partibus regantur & guber-
 nentur. Quod enim si gignantur, quodque vñibus cor-
 poris inseruiant, id habent a solidis partibus, Vide
Contentia.

Contentina, Vide *Continens*.

Contentus pulsus, idem est ac vehemens, 3. de differ.
 puls. cap 5.

Continentes causa (quæ *continua*, & *coniuncta* dicun-
 tur) sunt, quæ cum præsentis sunt, morbi quoque ad-
 sunt, cum tolluntur, morbi etiam discedunt; aut (vt
 in Scholis dicunt) quibus positus, ponitur; sublatis
 verò tollitur morbus; vt spina, telum: opponuntur
evidentibus, seu *procatarëticis*. & *antegressis causis*, quæ
 cum aduersam valetudinem creantur, separantur &
 secedunt ab ea: ut, labor, Solis vñtio, cruditas. *Con-*
cause sunt, quæ affectum sua vi generare licet possint;
 generant etiam, & alteri cohærentes, vnde *Synaitia*
 dicuntur: vt, lapis in vesica, & inflammatio; nam,
 ambæ vrinæ suppressionis causa sunt, etsi per se vtra-
 que illam generare possit. *Coadiutrices causarum par-*
tes sunt, quæ sua virtute morbum efficere non possunt;
 sed alteri auxiliantur; vt libido articulare morbum
 promouet. *Præcedens causa interna* est, quæ ab eviden-

tibus, vel præparantur; vel coadiuvantur; vt sanguinis abundantia, nutrimenti soboles est. Introd. cap. 8.

Continens febris, vide Synocha.

Continentia, ἡ *χορτα* vocat Hippocrates solida corporis membra, vt quæ comprehendant, regantque humida; *Contenta* autem appellat humores, vt qui a solidis comprehenduntur, quæ cum impetu feruntur spiritus siquidem in omnem corporis partem momento temporis, & facile, & citrà impedimentum perveniunt; lib. de trem. palp. c. 5. *Continentes* ergo partes erunt, vt corpus solidum cordis, arteriarum, & aliarum partium cavarum, atque aliquid suo sinu concludentium, quæ sunt bases, radices, & fundamenta aliarum: in ipsis enim singulis triplex adest substantia verè solida, & ipsam ambiens, muniens, fouensque, carnosà, & per vtramque sparsa, spirituosà, in quarum trium substantiarum & maximè in solidæ quantitate idonea, & iusta qualitate seu temperamento, vitæ primum robur & firmitas residet. Hæc ob id omnium maximè continet ac regit reliquas duas, & huius præcipuè beneficio corpora solida dicuntur *χορτα* ab Hippocrate, à quibus singularum partium actiones proficiuntur. Nàm ventriculi solidum corpus trahit, retinet, coquit, expellit calore suo & spiritu adiutum. Eadem hepatis solidum corpus præstat, suis duabus aliis substantiis similiter adiutum. Pari ratione & reliquæ partes. Ex quibus fit, vt Hippocrates optimo iure corpora solida continentia vocauerit, non aliter quàm faciem vini vinosam & spirituosam eius substantiam fouere & continere videmus. Neque enim continere tantum significat loco aliquo, & spatio concludere, sed etiam regere, moderari & gubernare, quomodo & Præceptor discipulos, & Imperator

rator milites continere dicitur.

Continua febris, *Εὐρεχὴς τῷ περὶ ἐς* est, quæ ad infectionem, antequam ex toto solvatur, non devenit, et si declinatio aliqua & remissio sensibilis appareat. Cuiusmodi declinatio aliqua sensibilis non fiat, semper vero à primo principio febris, usque ad crisin similis perseveraverit, erit *febris deurens, ardens, Causon*, à continuis sola acutic differens (quæ enim idem cum genere nomen sortiuntur, atque in pluribus particularibus accessionibus continentur, *continua* appellantur) quæ & *Synocha* appellatur; alia quidem *Epacmastica*, siue *Increfscens*, siue *Anabatica*; alia *Homotona*, siue *Acmastica*, in eodẽ semper vigore & tenore perseverans; ultima, *Paracmastica*, siue *decrefscens*, 2. de cris. 6. & 2. de diff. c. 2. Bifariam Veteres uti *continui* nomine, & *intermittentis* videntur; nam *continuas* vocant febres, quandoq; omnes, quæ nullum tempus liberum habent a accessione; quandoque non omnes, quæ accessione nunquam vacat, sed solas præcipuè illas, quæ omni carent, usque ad iudicium mutatione. Ita *Intermittentes* interdum appellant illas solas, quæ accessionem perpetuam non habent; interdum eas, quarum equidem non recedit accessio, sed insignes sunt mutationes singularum accessionum, in initio, incremento, vigore, & remissione. At Medici quidam iuniores, quæ non magnam mutationem habent, non *Continuas*, id est, *Synochas*, sed *Synochos* nominant: *Continuas* autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt singulis accessionibus, has vocant Antiqui, interdum *Continuas*, interdum *Intermittentes*: nam sunt rectè inter *Continuas*, & *Desinentes* in integritatem, mediæ, Proinde rectè, ubi cum *Synochis* conferuntur, *Intermittentes* appellantur, cum ad integritatem venientibus, *Continuas*,

comment. 3 in 1. de morb. vulg. 2.

Continui solutio, ἀπὸ σπασμα, vide *Unionis solutio* ;

Contractiones, uide *Ganglia*.

Contraindicare, uide *Endeixis*.

Contraria, apud Hippocratem & Medicos sunt, non in corporum modò qualitate; vt cali lum frigido, humidum sicco; sed in quantitate etiam; vt magnum paruo, laxum denso. plenum vacuo, quæ Aristoteles *Opposita* vocat; quo sensu dicunt Medici, curationem fieri per contrariâ, 11. method. cap. 12.

Conturbatio, seu *Perturbatio* τάρaxis, vide *Taraxis*.

Contusio, θλάσμα est, cum graue aliquid supra corpus incidit, ac id ipsum collidit; ita vt carnea pars dirumpatur; cum verò caro contusa, in loco sub cute, cruorem contraxerit, sine vlla cutis diuisione; *exuocatio*, *sugillatio*, *effusio*, *nigror*, & *nigritia* affectio hæc dicitur; venas tamen exiguas, simul cum carne, rumpi, ac discindi in huiusmodi suggillationibus; est perspicuum, 3. de his quæ in medic. 30. lib. de tumore, cap. 105. de compos. med. per gen. cap. 3. Id quoque in osse aliquando videtur euenire; sed in pueris maximè. Oportet enim in se se cogi id os quod colliditur, atque ita molle euadere, vt perfecte durum non sit. Θλάσις etiam numeratur inter fracturæ cranij differentias, quamuis fractura cranij non sit, nec fractura quidem simpliciter, sed vltis caluariæ in anteriore etiam partem impulsio, & veluti inflexio, cauitatem tantum, non etiam vnitatis solutionem in caluaria efficiens, vt licet in plumbeis, & æneis vasis videre, si foris illidantur; vide *Collisio*, & *Unionis solutio*.

Connexa Hepatis, vide *Sima*.

Con

Conuulsio, σπασμός; Cùm omnes arbitrarij motus, musculis obeantur, quando ad sua ipsorum capita retracti, vnamque particulam, cui inseruntur simul attraxerint, affectus aliquis p. n. in tensionem musculos ducens, iidem acciderit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali, sed citra voluntatem, & vocatur affectus *Conuulsio*, lib. de Trem. palp, cap. 8. quam Celsus lib. 2 cap. primo vocat *neruorum distentionem*, quæ *Conuulsio*, vel vniuersalis est (vt cùm totum corpus curatur, aut in anteriora, & dicitur ἐμπροσθότονος, vt in posteriora, ὀπίσθότονος, aut in vtramq; partem æqualiter, τριτανός, quibus additur & ἐπιληψία) est .n. quædam totius corporis conuulsio, patiente nimirum neruorum principio, vel particularis, aut in musculis oculorum, & dicitur στραβισμός; aut *mandibula*, τρισμός; aut *oris* κημνικός σπασμός; aut *penis* σατυρίασις. Sunt autem plures earum caulæ, quas tamen omnes Hippocrates in duas contulit, inanitionem & repletionem. Ad inanitionem quidem reuocatur febris ardens, hellebori potio, immodica sanguinis profusio, vigiliæ, inedia, & quæcunque corpus vehementer exiccant; ad repletionem verò ebrietas, crapula, suppressa vacuatio consueta, exercitatio intermissa, phlegmone, & quæ eam consequuntur dolor morsusque, præterea & flatus qui in musculis conclusus, siue illic genitus, siue aliunde influens, eos distendit atque contrahit, ut docet Galen. lib. 2. de sympt. causis; Quo etiam loco ab utraque illa causa conuulsionem fieri chordarum eleganti similitudine docet: ut enim illæ vel nimio humore imbutæ, vel vehementiùs resiccatae tenduntur, contrahunturque, ut interdum etiam rumpantur, sic &

nerui afficiuntur, atque ita tensi musculos adducunt. Itaque in neruis quidem ipsis conuulsionis causa aliquando est, non etiam in ipso musculi corpore: musculi tamen non nerui morbus esse, *Conuulsio* dicitur, quod ipse non autem neruus proprium sit motus, qui in conuulsione læsus est, instrumentum. Itaque si nerui ex chordarum comparatione conuelli aliquando dicantur, id non propriè dicitur, sed quod ita affectis, necessariò quoque musculus contrahatur. Ergo quæcunque neruorum principio, vel copia, vel acrimonia, vel maligna venenataq; qualitate molesta sunt, conuulsionem possunt excitare; siquidem ab iis grauati nerui irritatique contrahuntur, & musculos secum adducunt. Ex his patet, conuulsionis causam vel in musculo, & præsertim eius capite esse, vel secundum nerui ipsius ductum, vel in ipso neruorum principio, quod geminum à Medicis statuitur; vnum in spinali medulla, alterum, in cerebro; vide *Rhegma*, & *unionis solutio*.

Conuulsio Canina, σπασμός κυνικός, est affectio musculorum maxillarium, per quã os, nasus, oculus, labrũ, atque aded dimidia faciei pars in obliquum torquetur; quæ affectio nonnunquam dicitur *Conuulsio*, interdum *Paralysis*, quæ ad musculum latũ pertinens affectio est, quam quidã vocant *oris torturam*, 4. loc. aff. c. 2. vers. fin.

Conuulsio comitialis, quæ laboranti Epileptico affectu accidit, 5. loc. aff. 5. & 3. loc. aff. 7.

Conuulsuum affectum vocat Galen. qui ante mortem necessariò conuulsionis habet symptom. 1. de prælag. ex puls. c. 14. & com. 3. in 1. prorrh. 69.

Conuulsuus & vibratus pulsus sunt, qui naturali sede relicta, vnum locum non tenent, sed sursum atque deorsum agitantur. In *Vibratis*, arteriæ quædam partes quasi iacula superiora petere, quædam demitti, vno

eodemque

eodemque tempore conspiciuntur, quæ dissentio parua est in *Convulsivis*, 1. de diff. puls. c. 28.

Convulsivus pulsus est, in quo ad utrumque terminum tenditur arteria, quem convulsio sequi solet 2. de caus. puls. cap. 12.

Coopertoria cartilago, vide *Circoeides*.

Cophosis Κώφωσις, id est, *Surditas*, est abolita auditus actio inducta ab us, quæ vel ipsam audiendi facultatem, eiusque primarium instrumentum (quod est animalis spiritus in aures affluens,) aut ipsius organa, quæ natura ad audiendum comparavit, læsum. Ad primum genus pertinent causæ omnes quæ ipsum sensum, nervorumque principium, hoc est, Cerebrum, male habent, præsertim qua parte ex eo nervus auditorius producitur; cuiusmodi sunt intemperies aut vitiosus aliquis humor, vel sensum in Cerebro cumulus, qui habitualement aliquando & incurabilem surditatem facit: vel confertim & subito in ipsum irruens, sicuti per febres acutas accidit, de quo celebris apud Hippoc. habetur Aphorismus: *Quibus biliosa deiectiones, superveniente surditate cessant, & quibus surditas superveniente biliosis deiectionibus cessat*: Item, qui non multo postea scriptus est; *Quibus in febribus aures obsurdueunt, sanguis e naribus fluens, aut alius turbata solvit morbum*. Pleno enim eiusmodi humoribus cerebro, illique ad aures maxime vergentibus, fieri non potest, quin & audiendi potentia vel hebetetur, vel etiam in totum auditu priuetur, & ipse animalis spiritus impior, crassior & faculentior redditus, ad audiendum prorsus ineptus evadat. Possunt tamen & hæ ipsæ causæ organis auditus esse communes, & in ipso auditorio cruo, præsertimque meatu eius interno talem intemperiem, tantamque obstructionem excitare, ut nec so-

nis in aures aditus pateat, nec interno spiritui in ipsum neruum via. Id quod etiam a sorde, callo aut alio tumore præter naturam meatu nerui auditorij occupante accidere potest. Hæ quidem causæ si magnæ sint, furentem inducunt; Sin autem exiguæ, auditum vel obtusiores reddunt, vel deprauant, vel in eo dolorem etiam mouent. Sunt enim harum omnium affectionum communes causæ sola magnitudine ab inuicem differentes. Præter quas tamen aliud quoddam discrimen adferri potest, quod læsis aliis instrumentis auditioni vltimæque præsentibus, iis scilicet quæ aurem foris circumstant, intemperie, aut tumore præter naturam aut continui solutione, aboleri quidem in totum auditus, surditasque fieri non potest, sed tantum hebetari, vel etiam depruari. Quod autem ad dolorem attinet, qui in auditu sensu aliquando mouetur, non est dubium quin a proprio sensibili fiat, vt voce aspera, grauitima, maxima, celerrima, qualis sonus est tonitruus, a quo sæpenumero inductam esse surditatem, animaculis est diuulso audiendi instrumento, sicut è contra vox lenissima tardissimaque sano auditui solet esse grata: fatigato autem gratior, si præterea sit per exigua ægro verò longè gratissima, eaque etiam magis ipsum silentium.

Copos, id est, *Lassitudines*, Græci vocant *Affectus*, ex multo vehementiue motu corporibus, vel totis, vel particulis, quæ iusto plus laborarunt, obortos; vnde *Antepa medicamenta*, quæ talem lassitudinem tollunt, ut comp med. per gen c 11. Triplex in vniuersum omnis lassitudo est. ἰλαρότης, τοῦ δός, φλυμωρότης. 1. vlcerosa lassitudine vlcus lenius, cum mouentur, se exhibet, in inflammatoria, inflammationis: in tensiva incendi tendiq, sibi videntur qui laborant. Vlcerosa quidem

lem oritur ab excrementorum tenuium copia & acrimonis, quos ipsa exercitatio nimia, & celeres ac multi notus pariunt, eo excremento, quod crassius erat, fuso & attenuato. nec tamen toto expulso, aut adipe molliue carne liquata. Nec uerò solus exercitationis excessus iam gignit, sed sponte etiam aliquando prouenit, & maxime in ea incidit corpora, quæ & mali succi sunt, & excrementis abundât. Succedit uerò & recentibus cruditatibus. Tenuia uerò a nullo quidê excremento gignitur, sed quo magnopere sit curandû, sed residet in musculis & nervis ex nimia tensione, quam exercitando admiscunt, ætatis quidam effectus causæ potestatem ostendens. Accidit namque in uehementi tensione omnes musculorum fibras contendi, non tamen similiter omnes lassari, sed eas maxime quæ per longitu sinem tensionis porriguntur. Quippe quæ obliquiores quodammodo iacent, minus in directum aguntur; quare his nullum insit periculum. In his uerò quæ immoderatus sunt extentæ, ita ut parum a rumpendo absint; relinquuntur effectio quæ iam similis ei, quæ inter agendum fiebat. Quippe tendi adhuc uidentur; cum tamen nulla iam tensione urgeantur. Tertia autê latitudinis differentia, quæ inflammatoria; seu inflammationi similis dicitur, in qua nimirum ceu contusas aut phlegmone obsessas partes sentimus, ubi maxime solet incidere, cum musculi nimium exaltati attraxere quippiam ex circumfusus sibi excrementis. Ex uehementissimi nascitur motus, solaque supra naturalem habitum in musculos attollit, ita ut phlegmone per similes sit affectio. Itaq; & leni tactu offenduntur, & calidior apparet. Dolent uerò etiam ipsi per se moueri conentur. Incidit hæc latitudo is plurimum, qui assueti exercitationibus non sunt: Nam exercitaria assuetis raro incidit, etiam ex uehe.

hementissimis, plurimisque motibus. Illud autem huius
 vni præter cæteras commemoratas egregie inest, nèpe
 maior quam pro naturali habitu tumor, nec doloris
 ipse sensus idem in hac atque in tenuia lassitudine ha-
 betur. Quippe in illa tendi, in hac contulos esse vsque
 ad ossa nervos putant, qui ipsa laborant. Quare in his
 saltem proprium à reliquis duabus discrimen habet, nec
 est composita tantum. Præter tres has proprias lassitu-
 dinis differentias alia est, quæ cœu lassitudo sit, nonnul-
 lis imponit. Hæc incidit, cum supra iustum musculi sic-
 cantur, ita ut squalens contractumque corpus appareat,
 atque ad motus quodammodo pigrum, non tamen ei vel
 ulceris, vel tensionis, vel phlegmones sensus inest: sed
 nec horrorem vllum dolore in ve, nec pigrum ad mo-
 tus ei similem infert, quam lassitudines invehunt, sed
 gracilitatem tantum ariditatemque facit. Hæ quidem
 sunt lassitudines simplices quatuor differentiae ab im-
 modicis motibus genitæ, quibus aliae totidem respon-
 dent sponte venientes, quas *αυτομάτους κινήσεις* Hip-
 pocr. appellavit, & dixit morborum esse prænuncias.
 Ut enim quæ immodicas exercitationes lassitudo exci-
 pit, sanorum symptoma est: ita quæ sine his consistit,
 morbosum. Ac lassitudo quidem ulcerosa spontanea
 eadem prorsus est cum ea quæ exercitationi superue-
 nit, siue ipsum affectum, siue eius symptomata specta-
 mus, causa tantum differt. Huius enim externa, illius
 interna causa est, acrimonia scilicet tenuis & calidi
 humoris corpus erodentis, stimulantis ac pungentis
 qui imprudentibus nobis in corpore succreuit. Tensu-
 ra verò, quoties sua sponte incidit, plethoris superue-
 nit. Tertia verò, quæ phlegmones sensum affert, ex
 ambobus oritur, tum nimia succi boni abundantia,
 tum acri illo & vitioso succo, non utique in venis cum

bono sanguine misto, sed ab his translato, atque in carnibus & ad cutem solo hærente

Copula, seu *Ligamentum*, *Σύνδεσμος*, terminus musculi est, sensu omni cærens, durior & crassior *Nervo* & *Tendone*, vsum eum, quem vel nomine ipso præsefert, exhibens: differt a *Nervo* & *Tendone*, quod Nervus a Cerebro, vel spinali medulla exorsus, sensum, aut motum membræ inducit: *Tendo* verò finis musculi nervosus est, ex *Copula* & *Nervo* procreatus, i. de plac. c. 9 quam quidam *Nervum* nuncupant, com. i. in 6. de morb. vulg. 2. vide *Nervus*.

Cor, *Καρδιά*, est vilcus, carne cōpacta, dura, fibrola, caua cōstans, principium vitalis facultatis: sunt qui Musculū esse definiunt, verum & minus rubet quam Musculus & longè durius spissius, solidiusq; est, multoq; aliter fibræ intertextū, fibræ namq; validis & rectis, caro eius circumfusa est, (unde *Parenchyma*, nomine quoque aliis visceribus communi appellatur) a basi ipsius in mucronem tendentibus. Habet præterea & transuersas, in eas ad angulum rectum incidentes, & obliquas earum medias. Ac rectis quidem per diastolas ē vena caua sanguinē per arteriam venosam attrahit: transuersis autē per systolas in uenam arteriosam, & arteriam magnam expellit; fuliginosumque pariter excrementū in arteriam venosam: obliquis verò per quietes inter Diastolen Systolenque medias sanguine ex vena caua in ventriculū dextrum, & spiritu ex arteria venosa in sinistrum attracto retentoq; perfruitur. Sunt namq; cordi duo ventriculi seu sinus, *κοιλίας* Græcis dicti, carnis ipsius portione media seu Diaphragmate quodam distincti. Dexter multo amplior est, carne & parciore & molliore circumseptus. Sinister verò multo angustior, ut qui carne

tum largiore, tum denfiore contineatur. Vtrique autem sua est auris nervosa, caua, ad ora vasorum materias in cor immittentium affixa, in quibus veluti in penu quodā sanguis & aer recondita sunt: has Græci *ἄρτα & ἰσχυρὰς ἀπορροαί* appellant. Habet .n. vterque sua vasa; dexter quidem venam, tum canam, tum arteriosam; sinister autem arteriam tam magnam quam venosam, in quorum vasorum orificiis certæ quædā sunt membranarum epiphytes, quarum aliæ foris ortæ, introrsum feruntur, (cuiusmodi tres habentur in venæ cauæ orificio, duæ autem in arteria venosa, omnes inæquales & ueluti laceræ) aeri atque sanguini in cor immittendo destinatæ: aliæ uerò ab internis sedibus foras uergunt, tres quidem in magnæ arteriæ osculo, & totidem in uena arteriosa sitæ inter se æquales, per quas sanguis tum crassior ex dextro sinu in pulmones per uenam arteriosam, tum spirituosus ex sinistro in magnam arteriam emittitur. Omnium autem orificiorum quæ in cor dehiscunt, maximum est arteriæ magnæ, quod ut inuenibus cartilaginolum est, ita natu grādiorebus, præsertimque senibus, osseum. Cordi porrò sua est tunica, neruulum a sexto pari aut recurrente sinistro sortita. Venam etiam a uena caua habet, antequam ea in dextrum ventriculum subeat, coronæ modo (*στεφανία*) ob id dicitur (circa cordis basim implexam, & ramum postea plurimis in cordis partem extimam distributam) duas item arteriolas inæquales ab aorta sub membranarum epiphytibus productas, &, ut uena coronaria variè per summum viscus disperitas. Interna namque eius caro a sanguine in ventriculis contento, abundè nutrita & temperatur. Est autem cordis figura pyramidata, lato in acutum tendens. Arteriarum, & caloris natum

quo animal regitur, ac vita continetur, quasi fons & domicilium, in medio omnino Thorace situm est, præsertim sua basi, quæm caput eius nominant. Ea vis cordi insita a Medicis facultas vitalis nuncupatur, 6. de usu part. & 7. de anat. adm. Vocant adhuc & *Cor*, Veteres omnes, *Os ventriculi*, propter affinitatem maximam, quæ illi est cum Corde, & mutuum consensum; ut ostendit Galen. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoeides, v. l. *Ancyroeides*, & *Acromion*.

Coryphe, Vide *Vertex*.

Cornea, siue *Corniformis*, (Κερατοειδὴς χιτὼν ἡ ὀφθαλμοῦ) oculi tunica est, tenuis, dura, & densa, quæ a dura cerebri meninge proficiscitur, & tenuem oculi tunicam choroeidem in orbem amplectitur, quæ & *Ceratoeides* dicitur, 10. de usu part. cap. 3. & *Carulea*: estque tunica secunda oculi, hoc est, proximè subiecta adnatæ tunicæ, quam ἐπιπεφυκῶτα appellant. Præstenditur humori chrySTALLINO veluti operimentum & propugnaculum aduersus ea quæ extrinsecus possunt accidere. Ideoque non modo densam, sed etiam prætenuem, albam & pellucidam fieri oportuit, ne vilo pacto visionem humori chrySTALLINO (quod primum est visus instrumentum) prætensa impediret. Itaque non aliter quam cornu prætenue, & quam accuratissimè deraalum condita, & humorem eum tuetur, & splendorem nihilominus transmittit. Græci Κερατοειδὴς appellant, siue propter firmitatem, siue quod per eam, qui illi adiacet internus humor, tanquam per cornu transluceat, siue quod cornus instar veluti in laminas dissoluatur, ut scribit Rufus Ephesius. Pluribus enim seu corticibus constare dicitur à Galeno, lib. de oculis. Ut autem ita sic composita aptissima est ad visionem, ita cum eius

pars

pars, quæ pupillæ antestat, crassior, aut spissior, aut humidior est facta, visionem impedit; similiter si colorem mutauit; nam crassior & spissior visus hebetudinem creat: humidior non eam tantum, sed etiam ut quasi per caliginem vel nebulam, vel halitum quempiam, vel fumum cernatur, efficit: Mutato autem eius colore, ut per regium morbum contingit, pro natura coloris error in visu respondet. Rugatur & ipsa iis, qui ad extremum senium peruenerunt; tum propter lenectæ imbecillitatem, tum propter spiritus supernè influentis penuriam. Eoque fit ut ij, seruata etiam pupillæ magnitudine, imbecillius, aut nullo etiam modo uideant. Vide *Cerulea*, & *Ceratoides*.

Cornicularis processus, uide *Ancyroides*.

Corniformis, uide *Cornea*, & *Ceratoides*.

Cornua, Κέρατα, numerantur inter affectus præter naturam; sunt autem duæ eminentiæ osseæ, quæ prope tempora nascuntur; Dicuntur & *Dionysisci*, Διονυσιοίχοι; sunt & cornua uulvæ, siue sinus, duo processus infignes, à lateribus uulvæ, ad utraque ilia, quos alij uocant *Cirros*, lib. de uulvæ diff. cap. 3. uide *Apices matricis*.

Corona oculi, uide *Iris*, & *Stephanos*, Ἰρις, Στεφανῶν

Coronale os, ut *Coronalis sutura*, Στεφανιαία ραφή, Στεφανιαῖον ὀστέον, sunt sutura anterior Cranij ab uno temporum osse ad alterū transversim perueniens; sic etiam *Os frontis*, *Coronale* dicitur, quoniam ea capitis parte, ubi id ipsum consistit, Coronæ gestari soleant, ut quod in orbem frontem cingant, 9. de usu part. 2. de ossibus, c. 1. & 6. de anat. adm. cap. 1. Inde & *Coronalis vena*, Στεφανιαία φλέψ, propago est, ueniens, à magno trunco uenæ cavae sursum ascendentis, cingens

cordis

cordis basim in modum Coronæ, eidemque alimentum aduehens. Ea quidem magna ex parte simplex est, interdū tamen gemina apparet. Distribuitur autem in partem cordis externam. Est & alia venæ caue propago, quæ *Coronalis stomachica*, *Στεφανιαία στομαχική* appellatur, quæ à ramo splenico venæ caue proficiscitur, & ad stomachum effertur, ibique bipartito ramo maiore, ceterū Corona, stomachum totum cingit; ramulis sursum ad Œsophagi finem, & deorsum in ventriculū demissis; minore ad pilorū descendit, ramulis obiter ante & post distributis. Quemadmodum autem à vena caua, Coronalis hæc vena proficiscitur; sic a magna arteria statim, ubi à corde orta est, arteriæ duæ coronariæ prodeunt, maior sub valuula dextra, minor sub sinistra, quæ in cordis superficiem, & eius partem crassiorem, perinde ac venæ, distribuuntur, 7. de anat. adm.

Corona, siue *Coronon*, *Κορώνη* ἢ *Κόρωνος*, est extremū ossis, quod in mucronem desinit, lib. de ossib. in proœm. unde omnes Apophyses rotundas appellant. *Coronas*: sic autem dicitur, quia τ *Κορώνης*, hoc est, cornicis rostro similis sit: quæ autem Apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non *Κορώνη*, sed *αὐχμή*, nominatur, 2. de usu part. cap. 14.

Corporalis vena, vide *Communis*.

Corrugatio pupilla, vide *Tabes oculi*.

Coryza grauedo, *Κόρυζα*, tenuis & incoctus humor aqueus est, qui per nares secernitur, quasi grauedinem lixeris; hic cerebri morbus est, præsertim verò priorum eius ventriculorum: sunt enim eo humore referti denique; talis defluxio, cum per palatum fit, dicitur

Catarrhus, 2. progn. 49. Est autem hic humor, non qui propriè *ωμερς*, siue *Crudus* dicitur, sed qui *απειρτος*, hoc est *Liquidus* & *Tenuis*. Cellus autem author est, & *destillationem*, & *gravedinem*, *κορυζας* Hippocr. appellasse. Verumtamen non locorum modo, qui ad nares habentur, obstructio fit, sed etiam tum spiritui ipsi, qui in ventriculis est, tum cerebro quod hos continet, intemperies quædam accedit, qualis ab obstructione solet contingere. Causa eius est Solis æstus, vini potus largior, balnea calidiora, perfusio capitis ex aqua calida, maxime si caput calidiùs existat, & cibus in ventre incoctus manens, neque per inferna descendens: his enim caput humorem superfluum colligit & repletur: Sed immodicè refrigeratum Cerebrum *Coryzam* creat. Sic enim caloris penuria male concoquit alimentum, patiturque idem quod ventriculus diarrhæa laborans. Quod enim in ventre diarrhæa est ex mala concoctione, talis in Cerebro est *Catarrhus* & *Coryza*. *Catarrhum* appellamus, cum quod superuacuum est in Cerebro, in os diffluit; *Coryzam*, cum in nares; *Branchos* autem, siue raucitas *Catarrhis* superuenit, faucibus scilicet humere imbutis; quod si in Gurgulionem fluxio procumbit, quam ex similitudine Græci *Staphilen*, idest, *Acinum*, vocant, in ea gignit, aut alias eam in tumorem attollit; at si Glandulas, *Antiadæ*; si in eas, quæ iis proxima sunt, *Paristhmia*. 3. de symptom. caus. cap. 4.

Costa extrema est, non parua illa reuera spuria, quæ ab aliis dilcedit, & carnolæ parti septi transuersi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta iam membrana tenuis intus subtenetur, ei continua, quæ omnes costas subcingit, 5. de anat. adm. cap. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ à collo toto ad illa usque ex anteriore parte, ad utrumque latus protenduntur, libr. Introd. cap. 19. & 3. de articul. 37. duodecim ut plurimum numero sunt; ex quibus superiores septem simpliciter *πλοδραι* dicuntur; quinque vero reliquæ costæ inferiores *νόθαι* dicuntur, hoc est, *spuriæ*, & *illegitimæ* quia impertectæ sunt.

Cotyle, *Κοτύλη*, vide *Articulus*, & *Acetabulum*.

Coryledones *Κοτυληδόνες*, vide *Acetabulum*.

Coxa, quæ & *Ischion*, magnum femoris ossis caput est, Græcè *ἰσχίον*, idest, *Coxa*, appellatur, veluti cauitas eius, *Acetabulum* dicitur, 2. de fract. 70. unde affectus fit, qui *Ischias* & *Coxendix* appellatur; inde *Ischiadici*, & *Coxarij*, idest, Coxæ morbo laborantes, 7. de compos. medtc. per gener. cap. 16. *Ischion* aliquando significat ligamentum ipsum, quo Femur Coxendicis Acetabulo colligatur; interdum verò ipsum articulum, sed & *Ischia*, *ἰσχία*, dicuntur a quibusdam, partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, (quæ & *σχαφία* Græcis, a Latinis *Clunes* appellantur.) Os autem Coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad Coxendicis acetabulum undique pertinens. Os enim *sacrum*, qua parte femoris caput ei inseritur, *Ischion* vocatum est.

Cranium, *Κάψα*, *Caluaria*, *κρανίον*, est os capitis crassum, rarum, rotundum, ossibus septem compactum, futurisque veris tribus, coronali, lambdoeidea, & sagittali, distinctum, Cerebrum continens, atque utramque meningem ambiens, quod quasi *κρίνον*, idest, *Galea*, cerebro adiaceat, sic dictum, 8. de viu part. cap. nouo. Crassitudo quidem illi magna est, ut validum sit, nec obnoxium externis iniuriis; solidum verò esse non ex-

pediebat, tum ne iusto grauiùs euadere, tum ne ineptum esset transmittendis cerebri excrementis: itaque rarum & cauernolum esse oportuit. Idem verò, si rectè a natura conformatum est, rotundum quidem est, ac sphaeræ simile, ita tamen vt sphaeram non omnibus numeris æquet. Siquidem oblongum est, & à lateribus quidem vtrimque parùm depressum: anteriore autem ac posteriore parte parumper extuberans, & gibbosum, inferiore autem planum.

Crassus, Græcè *Κρασις*, & *Κρησις*, temperiem significat, 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana, vide *Membrana dura*.

Crassa vena, idest, *humeralis*, 1. de artic. 53.

Crassus pulsus, vide *Gracilis*.

Crea, vide *Tibia*.

Creber pulsus est, cuius intermediæ quietis est breue tempus; rarus, cum longum; 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremasteres, *Κρέμαστροί*, sunt musculi duo vtrinque scilicet vnus, a quibus testes sursum trahuntur. Eorum vterque gracilis est & longus, & cum vasis spermaticis à musculis hypogastrii descendit ad ipsos testes, eos releuans: Contrariis carent musculis, qui contrarium motum efficiant, nullus enim est, qui testes ad inferiora reuellat, quod satis sua grauitate ima petant, ægris præsertim & senibus.

Cremor, idem est ac *Crymus*, *χυμός*, 3. de natur. fac. cap. 4.

Cremor ptisanæ est, vbi à decoctione quis Ptisanam colauerit, deinde cremorem à decocti parte aquosa separauerit, 1. acut. 26.

Cricoides cartilago, est *Laryngis cartilago*, basim annuli figuram præsentantem efficiens, Tribus enim

cartilaginibus constat Larynx, quarum prima maxima ex internis partibus collocatur, cuius conuexum extra prominens, *Pomum Adami* vocatur, concavum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, à quo Anatomici *Thyreoidem*, idest, *scutiformem*; alii, *Peltadem*, quod *Pelta* formam agat, nominant: posterior, quæ basim *Cricoeidem* idest, Annulli figuram imitantem efficit, postremæ ipsius asperæ arteriæ cartilagini, signæ literæ imitanti, incumbit; Scutiformi verò in priori sui ipsius parte subjacet, (quæ & *Cricoeides*, *Cymbalaris*, & *Coopertoria* dicitur.) Reliqua ab his Cartilago, quæ tum positione, tum magnitudine tertia est in suprema Cricoeidis (quæ & *innominata* dicitur) Cartilaginis parte sita est, gutturnis, infundibulisque, quas *Aritanes* vocant, similis; vnde & *Arycanoeides* dicitur. Quæ autem à radice linguæ exoritur, quam *Epiglottida*, quasi *Superlingulam* dixeris, non est *Bronchij* propria, lib. de vocal. inst. diss. cap. 4. & 7. de usu part. c. 11. & lib. de anat. viu. $\kappa\rho\iota\chi\omicron\varsigma$ annulum & circulum significat. Vnde & $\kappa\rho\iota\chi\omicron\omega$ & $\epsilon\nu\kappa\rho\iota\chi\omicron\omega$, quod est, annulis traicio, in fibulo, aut fibulæ modo illigo & pernecto. Hippocr.

Crimnoeides urina, $\kappa\rho\iota\mu\nu\omega\delta\eta\varsigma$, cuius sedimēta *crimnoeidea* sunt, idest, quæ speciem fusi furis, vel spumæ referunt; significantque sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationem, si alba, lib. de urinis, cap. 29. itaque omnis huiusmodi hypostasis mala est, ut scribitur in progn. Nam si per exitiales morbos inciderit, breui futuram mortem significat: si verò in morbis non mortiferis appuerit, morbi longitudinem portendit. aphor. 31. lib. 7.

Sed plurimi quidem per eiusmodi morbos citò pereunt, aut si euadant, diutissimè ægrotant. vide *Hypostasis*

Crisis, Iudicium, siue Iudicatio. Κρίσις apud aliquos est subita in morbo in melius peiusue, ad vitam, aut mortem, mutatio; apud alios, est ea, quæ antecedit iudicium; humorum agitatio; apud alios, integra totius morbi solutio; apud alios, illa tantùm morbi solutio, quæ ad bonum sit, 1. de cris. cap. 1. Sed, ea, quæ repente sit, per excellentiam *Crisis* dicitur, & à natura, ea, quæ præter naturam sunt, superante, exquisitè perficitur, 3. de cris. cap. 1. Iudicatio per morbos, de forò translatitia appellatione dicta est, significans, præcipientem in morbo mutationem, cum quadam euulsi euacuatione, vel abscessu, quæ quadrifariam existit; aut enim statim vindicantur a morbis, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multò deteriores euadunt. Itaque duas primas iudicationes bonas appellant, proximas duas magna ex parte cum adiectione, malam, aut prauam iudicationem, quandoque verò sine adiectione simpliciter sic uocant, 3. prognost. 1. Vtitur item Hippocrat. *Crisi* pro λύσις, id est, solutione morbi, ut in prognost. optimam eam dicit esse vrinam, in qua per totum morbi curriculum, donec ipse iudicatus sit, subsistet album, læue, & æquale. Neque enim aliter κρινεσθαι illic interpretatur Galenus, quam λύεσθαι, hoc est, solui: ut nec aliis plerisque locis cum κρινεσθαι in luxationibus usurpat. Vnde Cor. Celsus pleraque ex Hippocrate in Latinum conuertens, κρινεσθαι nunquam aliter vertit, quàm *solui & finire morbum*. Eodem etiam modo Ephemeræ & Hæcticæ febres dicuntur iudicari per abusionem, ut

scribit

scribit Galen. lib. 2. de cris. quod & sine magna perturbatione & minime subita permutatione finiantur. Tertia adhuc est eiusdem Κρίσεως significatio, denotans motum vehementem naturæ ad cuiuslibet rei molestiæ depulsionem; & hæc quidem generalis est, secundū quā non modò morbi, sed & cōceptiones, & abortiones, & partus, & omninò quæcunq; magno conatu naturæ indigent, dicuntur iudicari, & per Crisin solui, li. de symp. p.

Crisis, κρίσις, quæ à nullo dierum indicantium, aut signo in illis apparere solito, prædemonstrata fuerit indicata, 3. de cris. 10. *Ασήμως* citra vllam iudicationis significationē, citra rationē, significat Hipp. *ἀπ' ἰτῶς, ἀλόγως*, aut *παράλογως*, & in iudicationis ratione iis quæ temerè aut præter rationem contingunt, attribuitur: *Periculosa*, quæ cum grauib; symptomatis accidit; *Infida*, seu *incerta*, cum morbi recidiva contingit; *Obscura*, quæ citrà excretionem, vel abscessum euidentem euenit; *Absoluta* crisis autem est, quæ in morbo nihil facit reliqui, 1. die. de cr. cap. 2.

Crisis imperfecta, quò non omninò à morbo liberat. 3. de cris. 7. sed ex morbo quippiam reliquit, 1. die. de cr. cap. 2. *Κρίσις* etiam sumitur aliquando apud Hippocr. pro ipsa accessione, vt aph. 1. lib. 1. sicut Galen. & Philotheus in explicatione eius loci scripserūt. A quibusdam vocatur etiam *medium spinæ foramen*, quo omnes spinæ articuli sibi iunguntur, & spinæ medulla à cerebro descendit: magis usitato nomine *σώλην* dicta. Iulius Polux id spatium inter scapulas cauum, quod secundum longitudinem ad lumbos porrigitur, *κρίον* nuncupari scribit, fortè quod dextram partē à sinistra διακρίν, hoc est, discernit, & determinat.

Crisma signa, id est, *decernentia*, & *iudicantia*, i. aphr. 12. Κρίσιμον, duobus modis accipitur apud Hippocratem, ut lignum, & ut causa per se τ' κρίσεως. Signum quidem id dicitur, quod futuram crisin prænunciat. Eorum duplex est differentia: alia signa tantum sunt; alia, non modo signorum, sed causarum etiam rationem habent. Signa tantum sunt; colli dolor, temporum grauitas, tenebræ oculis obseruantes, vertigines, capitis dolores, lacrymæ inuito obortæ, facies & oculi rubentes, labiorum motus, vigilia, somnus grauis, asthma, dyspnæa, præcordiorum retractio, stomachi fastidium, nausea, æstus, sitis ingens, rigor, cardialgia, molestus decubitus, lethargus, delirium, vociferatio. Signa verò & causæ sunt vomitus, excrementa alui, copia vrinæ, sudores, sanguinis eruptiones, parotides, & abscessus, quos ἀποσκήματα vocant. Nā si quædam ex iis die θωρητικῶ apparuerint, eademque proximo die critico grauiora magisque euidencia sint, non est dubium eodem die futuram esse crisin. Qualis verò futura sit ex alijs notis petendum, tum iis quæ concoctionem cruditatemque significant, tum alijs quibusdam incertis & ambiguis quidem, sed magnam tamen vim habentibus, qualia sunt mentis constare, bene se habere ad ea quæ offeruntur, faciliè respirare, faciliè ferre morbum, pulsus bonus, facies sanis simillima, decens accubitus, totius corporis æqualitas, & alia, de quibus Hippocr. in progn. Nam pro horum signorum viribus illa superiora bonam malamve crisin, & perfectam vel imperfectam fore ostendent. Κρίσιμον autem ut causa dicitur omnis vacuatio, & abscessus, per quem crisis ipsa perficitur, ut vacuatio per alium, per hæmorrhoidas, per vomitiones, per spura,

per

per αἰμορροαγίαν , per sudores . Omnes præterea ab-
 scellum differentię post aures, in alas, in inguina, in ar-
 ticulos, in cutem (est enim quidem icterus criticus) & in
 alias omnes corporis partes . Hæc quamvis κρίσιμα
 vt causæ propriæ dicantur, signorum tamen etiam ra-
 tionem quandam habent, vt paulò ante dictum .

Crithe, κρίθῃ, idest, *Hordeum*, siue *Hordeolum*, siue
Posthia, hoc est, *Præputiolum*, est tuberculum par-
 uum, oblongum, palpebræ cilio, quâ pili sunt, adna-
 scens . Externum est, & foris prominet, atque in
 eo, sicut Celsus ait, tunica quiddam quod difficulter
 maturascit, comprehensum est . Ex quo patet pluri-
 mum pituitæ in eo contineri, vel simplices vltæque,
 vel cum alio humore mistæ . Sic dicitur a similitudine
Hordei, quod vulgò notum est, culmo tritici fragiliore
 minorique, sed octonis geniculato articulis, simplici
 in stipula folio, & eo quidem scabro latoque, grana fe-
 rè nuda, longiore capillamento, mordaci arista stri-
 tim spicantur, radice frequenti, coma nibrata refrige-
 rat, siccatur, extergit. Ex eo saluberrima illa ptisana, &
 tot laudibus ab Hippocrate celebrata conficitur, refri-
 gerandi detergendique facultate insignis, vnde &
 κρίθειον ὕδωρ, aqua hordei, quam in vehementi siti
 propinat Hippocrat. libr. de rat. vict. in morb. acut. de
 remed. part. facult. cap. 10. vide *Hordeolum*, *Posthia*,
Chalazia .

Crotaphite, Κροταφίται, idest, *temporales muscoli*, qui
 maxillam inferiorem mouent, & sursum trahunt, lib. de
 musc. diff. c. 6. Κρόταφοι, tempora sunt ossa duo cranij,
 vtrinque singula ad aures sita, trilatera, parte superiore
 futuris λεπιδουδέσι, poster. latera λαμβδουδέσι
 addi.

additamentis, anteriore sutura quæ cranio, & ossi σφηνοειδῆ communis est, terminata. Sunt autem omnium cranij ossium infirmissima, tum quod tenuissima sint, tum quod pertusa, meatu auditorio, & cauata, partim ad genæ supernæ diarthrosin, partim ad venæ iugularis ramos intus & foris excipiendos. Non sunt verò simplicia, sed multiformia. Et omnia hæc ossa musculus à tota temporum cavitate exorians, contingit, innixus ossi iugali, quo solo à cerebro ipsiusque membranis dirimitur. Est autem ille valde sensibilis, ut qui oblæsus contusiones & stuporem indicat. Motus autem duos habet: homini namque firmanti dentes, & os claudenti atque contrahenti tenditur, hiansi vero laxatur. A partis nomine cui incumbit, προσηπίτις dicitur; vide *Manducatorij*.

Cruda urina, vide *Aquosa*.

Gruditas, ὀμότης est, cum Ventriculus, vel proprio morbo, vel vitiosis humoribus in ipso accumulatis, vel prava alimentorum qualitate, ut nidorosa acida, scætori aut putredini, aut corruptioni obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, cibos non amplectitur, sed in ipso corrumpi eosdem sinit. Differt ab *incoctione*, quæ est rerum, quæ non possunt concoqui, ut acinorum, & omnium, quæ omninò integra & immutata dejiciuntur, 1. de loc. aff. cap. 3. Prouenit ob defectum caloris natui, aut huius quod in fructu requirit debet immensam copiam. Sed ut Arist. ait, veluti πᾶσι, maturatio, sic etiam ὀμότης multipliciter dicitur. Nam & alui excrementa, & urinæ & catarchi, ὀμῶι dicuntur, quod à proprio calore non vicantur, neque consistant. Sed & res,

la, & fictile etiam dicuntur cruda, quod ab externo calore non sint euicta.

Crudus humor ὠμός χυμός est dum alimentum suam naturam, in ventriculo, hepate, & intestinis, quam diutissime seruat, nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum est destinata, suscepta: uel, cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem, 8. de compos. med. loc. cap. 6. *Humor Crudus*, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet; iis præsertim, quæ ex edacitate sedimentum multum fabaceæ pultricis simile obtinent: quin & corporibus iis, quæ ab exercitatione abstinere, cibis verò quam plurimis, ac balneis post sumptos cibos utebantur: sæpè eiusmodi humor confertim per aluum descendit, sed & una cum hoc humore, perinde ac cum pituita, decolor quædam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetentes homines efficit, lib. de mul. cap. 11. ὠμόν dicitur propriè in fructibus: per metaphoram tamen non modo fructus, sed cibi, humores & morbi a Medicis ὠμοί appellantur. Cibus ὠμός, idest, *Crudus* dicitur, si licet in suo genere perfectus sit, nullam tamen ab externo calore mutationem alterationemue perpeffus sit, ut cum carnem uel Perdici, vel Galli, vel aliam etiam optimam crudam vocamus, quæ nondum assata vel elixa. Aliter uerò crudum cibum dicimus, qui quamvis optimè ab externo calore alteratus coctusque sit, a nostro tamen calore difficillimè concoqui potest, sed humores omnino crudos generat. Morbus autem ipse *Crudus* nominatur, quamdiu videlicet prius humor resistit naturæ conanti ipsum mitigare, in meliorem statum reducere.

Crura, a *currendo*, (quod crurum ministerio curramus

mus) κνήμῃ καὶ σκέλος, dicuntur extremæ corporis partes, quæ thoracem medium, & inum ventrem prætergrediuntur; vt, quicquid prominet vltra os sacrum, & carnosos musculos ibi subiectos infernè, vique ad pedes, id Crura dicatur. Diuidit hæc Galenus in partes tres, εἰς μῆρόν τε, καὶ κνήμην, καὶ πόδα. Κνήμα etiam dicuntur Tibiæ in rota, a similitudine Tibiæ in animalibus, libr. Introd. cap. 10.

Crysochis, Κρυσοφ χιτῆς, est testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recensio, lib. finit.

Cristallinus humor, κρυσταλλοειδὲς ὕγρον, & *crystallines*, (qui *glacialis* adhuc dicitur, quod concretam glaciem seu crystallum imitetur, 7. de placit. c. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus non omninò rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, (estque eius veluti centrum, propter dignitatem & præcipuum vsum) in quo fit visio, primumque videndi instrumentum, qui per Diadosin alimenti, id est, transumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adhæret vitreus oculi humor, qui & *Hylœides* dicitur quique quantò crassior & albior est sanguine, tantò à crystallino humore, humiditate atque albedine superatur; subest huic *Albugineus*, albo oui similis, quem *Hydatœidem*, quod aqua sit similis, vocant, 10. de vtu part. c. 1. lib. de ocul. c. 1. & Introd. c. 11. Crystallino humori eiusmodi est durities, vt per sectionem à cæteris oculi partibus solutus non defluat, sed instar molliusculæ ceræ per se consistat, suamque asseruet figuram. Nec verò eò durior humor vllus in oculis continetur. Solus à coloribus alteratur, & in eiusmodi corpore omnes colores facile ciuntur que suscipiuntur & relucet, neque propter puritatem &

colorisynceritatem vitiantur, adulteranturque.
Cteis, κτεῖς, *Cunus*, *Amuliebris pudendi sinus*,
ilis decoratus, appellatur: quæ Sinum amoiunt,
 τε υγώμοτα, id est, *labra*, & *ala* vocantur, 15. de vsu
 art. c. 3. Κτενές dicuntur à quibusdam dentes quatuor
 imores acuti, qui & διαστίρις, τομῆις, & ηελαστί-
 ς dicti. Sūt ēt qui κτένας vocēt partē manus externā,
 ὁ θέναντι oppositam, quam propterea alii ὁ πιδέναντι
 ἢ, πιδὸν ἀπὸ πιδόν, alii, ὁ πιδόν appellant. Sunt & κτένεις
 ἀλάσσιοι, *Pectines marini*, *Pila*. *Pectunculos* vocat.

Cubitus, (πῆχος ἀγών, ἀγος, ἀλέκων, ἀλένη)
 os, quod inter *Humerū*, & *Carpum*, quod *brachiale*
 dicitur situm est; eiusdemque partis os grandius, *Cu-*
bitus item dicitur, qui alteri subest ossi, quod *Radium*
 nominant, lib. de ossib. cap. 17. quem *Cubitus Pechyn*,
 est, *Vlnam* dicunt, 2. de vsu part. 2. Clarius; *Cubitus*
Pechys, πῆχος, seu *Vlna*, Arabibus, *Focile manus*, est ea
 ars totius *Brachii*, quæ supernè terminatur, qua *Bra-*
chio quidem continua est, per articulum, qui incur-
 atura cubiti est, cui inhitimur: infernè autem, qua
Carpo manus extrema coniungitur, quo spatio, duo
 illa recipiuntur, alterum magnum & rotundum, no-
 minatum eodem nomine, quo pars, id est, *Cubitus*;
 alterum, quod *Cercis*, Arabibus, *Focile minus*, id est,
radius, appellatur, 2. de motu muscul. 1. & 1. de fract.
 sicut *κνήμη*, *Tibia*, & totam partem, & partis totius
 portionem significat. Est & πῆχος mensuræ nomen,
 na rerum intervalla dimetitur. Est autem extensio à
 habitu vsque ad summum medium digitorum pedis vnus
 dimidii. Est igitur mensura digitorum quatuor &
 viginti.

viginti: Latini, *Cubitus* etiā vocant. Ab eo derivantur, *πηχυαίος*, *ἡμιπηχυαῖος*, *δι'πηχυς*, *τρι'πηχυς*, *ἑξάπηχυς*, quæ læpè apud Auctores occurrunt.

Cubiforme os, quod *Κυβοειδὲς ὀστέον*, siue *Os cubi-*
cum dicitur, est os quod ab externi^s pedis partibus fir-
mum in terra statuitur, externisque Tarfi partibus est
locatum, & articulatur cavitati calcanei, ad finem ad-
iacenti. 3. de usu part. 7. Est enim os vnum, ex quatuor
Tarfi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua
tria careant nominibus, est autem os, vt reliqua Tarfi
ossa, intus cauum, foris gibbum, cubo simile, quod la-
tera sex habeat cubo communia, admodum inæqualia,
& ferè aspera.

Cuculus, Coccyx, est os in imo sacri ossis positum, tri-
bus propriis partibus constans. Sunt autem partes illæ
ossicula, etiamsi Gal. ita non audeat appellare, propte-
rea quod pueris adhuc sint cartilagines, quæ quamvis
annorum spatiis ossæ euadant, in ambitu tamen &
commisuris & sine adhuc cartilaginossæ permanent,
vt & Epiphyse omnes solent. Vniuntur autem inter se
Symphyse, quamquam Coccygis tertium os, (quod
proprio nomine & *σπονδυλίον* & *ὀρρος* & *ὀσποπύγιον*
appellatur) vt ossis sacri primum per læpè Synarthron
iungatur, & in iis foramina intus ampliora, foris an-
gustiora, vt in osse sacro, nisi quod ad Coccygis ossis se-
cundi cum tertio commissuram, pro foraminibus futu-
ra tantum sit. E Coccyge tria nervorum paria prodeunt
per eius foramina, non lateralia, sed antica & postica.
Quorum prima coniugatio ex ea oritur parte, qua Coc-
cyx sacrum os attingit: secunda, vbi prima huius ossis
pars cum secunda committitur: tertia, medio inter se-
cundam & tertiam spatio.

Cucurbitula lenes, quæ citra scarificationem a sap.
tantur, 3. de loc. affect. c. 4.

Cunei os, quod & ὀστέον οὐνοειδές *Os cunei forme*,
Os basilare, & *Os palati* appellant, medium inter supe-
riora, & inferiora totius capitis ossa; de ossib. c. 1. Gal.
scribat fuisse apud Veteres controuersum ad quam per-
tineat partem, quod a nonnullis inter cranii, ab aliis in-
ter genæ superioris ossa numeretur, quia inter utrumq;
est medium; vicit tamen eorum opinio, qui id cranio
tribuunt. Est igitur vnum ex ossibus cranii, quod in
capitis basi collocatum inter capitis & genæ superioris
ossa, velut σφῆν, idest, *Cuneus*, adigitur, atque immitti-
tur. Sic dicitur a *Cunei* forma, vel potius vsu, quod om-
nibus suis partibus *Cunei* modo se insinuet inter ossa
capitis omnia, & propè omnia genæ supernæ. Nam os
occipitis λαμδοειδές tangit, atque ab eo distinguitur
futura comunum, deinde longo tractu attingit ossa tem-
poralia, & supra hæc angulum bregmatis, &c.

Cunnius, τὸ γυναικίον, *Pudendum muliebre*, inanitas
ea est, quæ inter ossa pubis penetrat, extrinsecus pelli-
culam quandam habens, virorum præputio correspon-
tem, lib. de vuluæ, diff. cep. 2.

Curatoria, θεραπευτική, medicinæ pars est, quæ tu-
factum morbum tollit, tūmienti occurrit, tūm eum
qui imminet, aut futurus timetur, amolitur, & præca-
uet, (quod est proprium προφυλακτικῆς, quæ hac ra-
tione sub Therapeuticam cadit) Tres autem sunt par-
tes ad curationē necessariæ, Therapeutices, διατητική
φαρμακευτική, χειρὸς γιγνή, quarum prima victus ra-
tione instituit; altera, medicamenta propinat; postre-
ma, manum adiutricē admouet; de part. art. medic. c. 1.

Curta, κολοβώματα, idest, *Mutila*, & *Curta*: id autem dicitur a Græcis *Coloboma*, quod in labiis, aut narium alis, aut aure deficit: huius generis sunt, & quas in maiore angulo *Rhæadas* vocant, eo utique, vel impenitus extenuato, minoreve facto, vel prorsus abolito. Vide *Colobomata*.

Cuticula, vide *Cutis suprema*.

Cuticularis membrana, vide *Membrana dura*.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti commixtus obtinet, ut vel cuticulosus musculus, vel carnosa cutis dici possit, lib. de musc. diff. cap. 30.

Cutis suprema, Δερμὶς, & δ' ἐρμῆ appellatur Græcis, quasi *Corium* dixeris, quia excoriari potest. Est autem membrana omnium amplissima, partium subjectarum tegumentum, munimentum, ornamentum. Quia membrana est, ex eo intelligitur simplicem esse, planam, tenuem, albam, nervosam, atque ob id sentientem. Si quidem per cutem dispersi nervi, dant illi sensum, verum tamen sentit tantum, non etiam motum habet voluntarium. Oritur ab extremitatibus vasorum per subjectam carnem dispersorum: hæ, namque dilatatæ, conunctæque in cutem degenerant: quo fit, ut à subjecta carne sine summo dolore separari non possit. Ac quantum ex carne, venulis, & alicubi arteriis composita sit, ex nervis tamen præcipue conflatur, nec tamen nervi prorsus naturam retinet, sed inter nervum, carnemque quodammodo media est. Nec verò solum omnium corporis partium, sed etiam univærse quæ generationi corruptionique subicitur, substantiæ media est: quod enim in duritia & mollietate, & in calore ac frigore similiter medium omnium particularum sortita sit, ex eius quàm dixi substantia, maxime intelligitur. Est

enim

enim veluti sanguine præditus nervus, qui sit inter carnem, & nervum quiddam planè medium, & iis ambobus secum mixtis, conflatum. Est enim nervus durus, exsanguis, & frigidus: caro mollis, multi sanguini, & calida: media inter vtrumque est cutis, nec dura, & planè exsanguis vt nervus, nec mollis & sanguine abundans, vt caro. Est igitur cutis extremorum media calidi, frigidi, humidi, & sicci; præsertim autem manus, in qua tanquam temperatissima, perfecta tangendi potestas sita est. Cuius exterior pars, ab illius excremento producta, *Epidermis*, siue *summa cutis corporis*, siue *Cuticula* dicitur, & toti superextensa, sensuque destituta, aut certè hoc perquam obtuso pollens, quippe quæ sæpè citra dolorem facillè ab ea separatur; 2. de vlu part. cap. 6. & 3. method. 4.

Cyboeides, vide *Cubiforme*.

Cyclisci, sunt caua excisoria scalpri, 6. meth. 6.

Cyrium, *κυλλόν* dicitur apud Hippocratem *Crus varum*, id est, in exteriorem partem luxatum; vel conuersum, adeò vt Suræ processus, qui talum exterius complectitur, sine villo stabilimento suspensus relinquatur, quamvis propriè mutilum, & imperfectum significet, vt scribit Galen. 3. de diebus criticis; vbi in ea significatione mensim *κυλλόν* appellari inquit, qui diebus viginti novem constet; alios autem perfectos, qui triginta. Vnde *Cyllosim κύλλωσιν*, distortionem cruris in exteriorem partem vocat Galen. 4. de artic. Idem tamen tom. 3. dicit, nonnullos de omni longorum membrorum distortionem *κύλλωσιν* intelligendam censere, generaleque ei tribuere significatum; alios verò eo nomine distortionem solum intelligere, in qua in interiorem partem membrum inclinatur.

Cyema, *κύμα*, fetus est, cum nondum menses duos in utero absoluerit, quo tempore *Embryon* dici nequit; sed *Cyema*, id est, *uteri gestatio*, & *conceptus*, & *genitura*, 1. de symptom. caus. capit 7. Quanquam autem *κύμα* animalium propriè sit, in iis tamen quæ florent, præsertimque in brassica, tum a Græcis, tum à Latinis etiam usurpatur. *Cymata* enim in iis, quasi *κύματα* vocarunt scaporum delicatiores tenerioresq; conuiuos, quos appetente verè in prima florù germinatione, & in summa stirpe hoc ulus profert, discretis, verù clausis adhuc, florum calicibus, quales quotianis videre licet, in quibus floris primum, mox seminis fetus clauditur. Theophr. à Græcis *κύμα* dici scribit, in quo flos ad lemen clauditur. Latini non tantum *Cymata* neutro genere dicunt, sed etiam fœminino *Cymas*.

Cymbalaris, vide *Critoeides*.

Cynanche, est inflammatio extra guttur existens, quæ & *Paracynanche* dicitur; si autem sit inflammatio adiacentium musculorù faucibus adiacens, dicitur *Synanche*, vel *Parasynanche*, 4. aphor. 34. Propriè loquendo; *Angina* Græcis est inflammatio, quæ in gutture, & faucibus aduenit; Hippocrates vero & alii Veteres, omnes passiones in iis locis aduenientes, quas spirandi difficultas comitatur, *Anginæ* nomine vocant, nullo existente in pectore, vel pulmone vitio; qua in re differt *Angina* à *Peripneumonia*, & *lateralis morbo*, ex eo, quod angustię sensus in gutture est, cunctis in *Angina* speciebus, suntque eiusdè (exquisitè loquendo) quatuor differentię: vna, ubi fauces inflammantur; altera, ubi neque reliquæ oris partès, neque etiam externarum partium vlla inflammata videtur, æger tamen suffocationis periculum in gutture perlenit; tertia, quando gutturis

Partes,

partes, tum externæ, tum internæ similiter inflammantur; quarta, vbi ad anteriorem regionem, cervicis vertebræ luxantur, & inde cavus apparet locus, doloremque quando tangitur, æger sentit. Recentiores Græci quidam, ut est Paulus, lib. 3. cap. 27. & nostræ ætatis Medici non pauci, inter *Cynanchen*, & *Synanchen*, inter *Paracynanchen*, & *Parasynanchen* discrimen faciunt, quod tamen Gal. 1. 4. de loc. aff. c. 5. & 3. progn. 20. reprehendit Inflammationem itaque, quæ in interioribus faucium musculis oritur. *κυνάγχην* nominant; eam verò, quæ in exterioribus eorumdem musculis sit, *Παρακυνάγχην*. Inflammationem item, quæ in interioribus musculis gutturis accidit, vocant *κυνάγχην*; eam autem, quæ in exterioribus eiusdem musculis oritur, *Παρακυνάγχην*. Est autem omnibus *Angina* differentijs communis deglutendi difficultas, adeo ut potus sæpè per nares reuelet: vide *Angina*.

Cynodontes, vide *Canini dentes*.

Cyphosis, *Κύφωσις*, *Gibbositas*, seu *Gibberositas*, vitium spinæ est, quod a calu, ictu, & tuberculis crudis & duris, anteriorem thoracis partem distendentibus, pulmonemque prementibus, aliquando contingit, vt docet Galen. eo aphor. quo scribit Hipp. *gibbos* ex asthma, aut tussi factos, ante pubertatem mori, vide *Gibberositas*; Dicitur eadem *Κύρτωσις*, nempe Spinæ dorsi distortio in posteriorem partem; hæc & *ὀπισθοκύρτωσις* dicitur, vt annotauit Galen. 8. de artic. Opposita huic Contortio, dicitur *Lordosis*, *λόρδωσις*, spinæ vertebrae in anteriorem partem conuersis: vide *Lordosis*.

Cyrtosis, vide *Cyphosis*.

Cyrtoma, *Κύρτωμα*, *Tuberculum in Iljjs*, appellauit

Hippocrates, & omnem tumorem præter naturam generali significatione, quòd & *Oedema* ab eodem appellari solet, 2. prognost. 25.

Cyffares, Κύσσαρος, est vltimum intestinum in ordine, quòd & *Rectum* dicitur, & Podex est, libr. quod animal sit, id. cap. 5. vide *Rectum*.

Cystis, κύστις, *vesica*, est pars membranosa, vrinam à renibus excipiens, & foràs excernens, exanguis, nervosa omnino, latissimè distendi, & arctissimè contrahi idonea, vt reliqua omnia alba, & exanguia, nervis insignibus instructam; partim a ramo sextæ coniugationis, qui per costarum radices ad partes vètris infimi tendit, partim ex infima spinali medulla deriuati: in quam renes, tanquam in lagenam, vrinā deponunt per meatus *οὐρητροί* dictos, qui à renibus prodeuntes, obliquo itinere delati, inter ipsius tunicas, paulò supra ipsius os, inseruntur; cuius vesicæ cervicem musculus ambit, transuersis constans fibris, quibus vndeque constriktis, vesicam claudit, ne vrina effluat. Duabus constat tunicis, vna propria & interna villis valdè intertexta, intus rectis, foris transuersis, mediis inter os obliquis; altera verò exterior, ex peritonæo pubis os intus vestiente orta. Præter nervos dictos, etiam venæ & arteriæ inter vesicæ tunicas à colli lateribus ad vsque fundum sparsæ sunt, à ramo per foramen ossis pubis in crus descendente. Illæ sanguinem & spiritum vesicæ subministrant, cùm ipsa alioqui ex sanguis sit. Vrinam autem ubi continuerit, donec vel quantitate vel qualitate molesta sit, excernit: in foetu quidem quamdiu utero continetur per *οὐράχην* in cavitatem tunicæ allantoidis, edito autem in lucem foras per *οὐρήθραν*.

Cystis choledochos, quæ & *vesica fellis*, *vesica bilis* suscep-

ſuſceptiua, Græcè autem *χυſτικὴ χοληδόχος* dicitur, eſt, in caua ipſius hepatis parte ſita, inter venæ portæ & cauæ radices, bilem ex iecinore attrahens, quam reſtis fibris trahit ex hepate, obliquis retinet, tranſuerſis verò expellit, quæ & ob id, *fellis folliculus* appellatur, 4. de uſu part. c. 12. & 2. de natur. fac. c. 9. & de anat. adm. cap. 2. A collo enim ſuo ſtomachos habet duos, vnum in hepar, inter venæ portæ & cauæ radices humerofiſ ſurculis diſtributum, quibus bilem in ſe allicit: alterum verò rarò geminum, ſæpiùs ſimplicem in Ecphyſim delapſum, quo in ipſum & inteſtina bilem flauam expellit, euerſa facilè gemina membrana eius oſculum in Ecphyſi claudente. Maximo illa hepatis lobo dimidia mergitur, reliquam ſimæ hepatis tunica tegit ad venæ portæ exortum, à qua venulas duas, quas *χυſτικὰς* quibuſdam appellare placuit, & à vicina hepatis ſimæ arteria arteriolas in imum vſque fundum admittit. Recipit verò etiam vna portionem quandam nerui, quī à ſexta coniugatione per coſtarum radices dextra parte ad partes ventres infimi peruenit.

D

DACTYLIOS, ὁ πρῶτος καὶ ἡΐδρα, i. *Fodex*, 1. de compoſ. medic. loc. capit. 15. ſunt quoque qui *rectum inteſtinum* eo nomine intelligāt. *Δακτύλιος* etiam ab Hippocrate aliquando dicitur, ὁ κυκλὸς καὶ τροχίσκος, hoc eſt, *Circulus*, *Pæſtillus*, ſiue *Orbiculus*, quo in medicina utimur: *Δακτύλιον* dicitur à quibuſdā τὸ σχαμμώνιον.

Darsis, idest, *excoriatio*, qua cutis, á subiectis partibus scalpello deciditur, & separatur, 3. de anatom. a 1m. cap. 2.

Dartos, vna est è quatuor membranis, quæ testes involuunt; earum prima & intima, *Epididymis*; post eam, *Erythraeides*, idest, *vaginalis*; tertia, *Dartos*, carnosâ, *Erythroeide* multò valentior & crassior; quarta & extrema, *Scrotum* est, Introd. cap. 11. Mulierum autem testes, penitiùs in vulua latentes, vnica tantum tunica contenti sunt, quæ *Darta* appellatur, proportionem respondentis tertiæ testium virilium tunicæ, cæteris autem recentius carent, de diss. vuluæ, cap. 9.

Dasympma, oculi vitium, vide *Trachoma*.

Dearticulatio, ea est ossium naturalis coniunctio, cuius ratione copulata ossa euidentem motum habent, & contra, *Synarthrosis*, *Coarticulatio* naturalis ossium, est commissio, quæ exiguum, & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præ se ferunt, & edunt, 2. de artic. 8 & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quæ statum ipsum subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium, 1. cris. 3. vide *Principium*.

Decrescens febris, vide *Continua*.

Decretorius, siue *Indicatorius dies* est, in quem ut plurimum morborum iudicij tempus incidit, 1. de diebus decretor. cap. 3. Est adhuc alius dies *Indicatorius incidens*, siue *intercalaris*, in quo imperfectæ solent fieri iudicationes, vt *dies tertia*, *quinta*, *sexta*, *nona*, 9. prognost. 1. *Decretoria* autem signa sunt, quæ salutem ægri, per crisin futuram ostendunt, 1. cris. cap. 7. *Incidentes* verò, siue *Intercidentes dies*; differunt à *Indicatorijs*, & *Decretorijs*, cum eorū natura, tum usu. Natura quidem, quod naturæ suæ ratione *Indicatorij* per-

facti sunt, (omnibus siquidem ritè factis, sola natura sponte agente, in iis crises fiunt,) ac numero quaternario, & septenario diuiduntur; *Intercidentes* autem minus perfecti sunt, & in eos, non nisi aliquo errore, interueniente, crises incidunt; vnde non vi naturæ, sed morbi malitia, aut aliquo extraneo impellente, in iis crisis accidit. Atque hinc est, ut a nonnullis *dies praenocatoriæ* nominentur, quod in his natura ad pugnam irritata, insurgat. Vbi adhuc differunt *dies iudicatoriæ* & *intercidentes*, quod ad futuri vigoris & iudicii cognitionem, quaternariorum circuitus sufficiunt; ad crism verò iam factam discernendam, non, scilicet fida, aut infida sit, intercidentium cognitio conducit.

Deficiens pulsus est, qui a mouenti digitos, videtur extolitus, & tenenti applicatos paulatim, prorsus desinit, 2. de caus. puls. cap. 3.

Deficiens decurtatus, *Μουρί ζον σπυγμός* pulsus, qui & *mutilus*, & *decrescens pulsus* dicitur, it, qui perpetuò diminuitur, nec minui desinit, a quo quidem deniq; omnimodam venit, prorsusque deficit; qui pulsus, si iterum redit, & de integro augetur, *decurtatus reciprocus* dicitur, 1. de diff. puls. c. 11. quòd si in eo nulla seruetur æqualitas, motuq; ipso frequenter deficiat, *deficiens inequalis* appellatur, 2. de caus. puls. c. 12. nomen autem Græci a figuris, quæ in acutum desinunt, & a *Caula* maris translulerunt: huiusmodi autem pulluum inæqualitas, *Systematica*, siue *Collectina* dicitur. Pulsus omnis *μούνος* provenit ab imbecillitate facultatis pulsificæ. Verùm ea imbecillitas in eo, qui *μούνος ἐκ λείπων* dicitur, maxima est, neque enim se recipit, & recolligit; postea in eo, qui in qua desit paruitate, hanc, seruat, minor verò, ubi magnitudinem recuperat.

Deglutitio, κατάρπσις, est cibi & potus ab ore in ventriculum per œsophagum descensus. Actio est facultatis attractricis, quam vi fibrarum rectarum agit, quas multas interna ventriculi tunica possidet, ad id munus naturam comparatas. Id quod liquidum cernitur, deglutientibus nobis, larynge simul sublata, sursumque in tantum currete, quantum gula deorsum trahitur. Cum autem completa iam deglutiendi functione laxauerit se gula, tunc luculenter descendere cernitur summa arteria: siquidem interna ventriculi tunica quæ rectas habet fibras, quæque tum gulam intrinsecus vestit, tum os ipsum, ea super internis summæ arteriæ partibus extenditur, quo fit, ut cum ipsa a ventriculo deorsum trahitur, simul etiâ summa arteria, necessariò attrahatur.

Deiectiones, & *Subductiones*, solet Hippocrat. vocare, *excrementa per aluum exeuntia*, 7. aph. 64. *Syncera* autem deiectio est, quæ vnum tantum humorem, cæteris impermixtum habet, 2. prorrh. 5. ut deiectio biliosa, sola bilem flauam egerit.

Deleterium, quod & *Phtharticum*, & *Phthoropœum* dicitur, lethale venenum est, quod ubi in animalis corpus ingressum fuerit, totum id momento temporis immutat, sibi que simili affectione alterat, penitusque enecat, 1. de semin. capit. 16. Id genere duplex est. Vnum quod omnino corpori contrarium est, & nulla qualitate à corpore alterari potest, eiusmodi est papaveris succus, siquidem nulla substantiæ sua mutata parte, sed tota seruata integra corpus nostrum afficit: neque enim in eum quicquam agere, ne vna quidem qualitate potest, multò minus tota sua substantia possit. Alterum genus est eorum; quæ ex nostro calore momentum aliquod mutationis accipiunt, ac deinde in multifarias alterationes vertuntur, quibus naturam nostram

stram corrumpi accidit. Sunt autem hæc genere duplicia: alia, potestate calida, ut quæ corporis naturam rodunt, putrefaciunt & liquant: alia verò frigida sunt, ut cicuta, hyosciamus, mandragora. Hæc enim omnia calido corpori applicata, & mutationis momentū aliquod hinc adepta, partim eorum ad luminem caliditatem, partim perueniunt ad putredinem, partim in scor delata calorem natium suo frigore extinguunt. Tametsi verò etiam Alexipharmacum medicamentum ultra modum exhibitū nos interficiat, moderataq; in dosi assumptum sanet, non ob id deleterium censendum est; propriissime enim deleterium est, quod quocumque tempore, loco, & quantitate quantumvis minima, sumptum aptum est interficere: com. 6. in 6. de morb. vulg. 5.

Delirium, desipientia, παρασπον, mentis alienatio duobus modis dicitur, generaliter, & speciatim; generaliter, est motus errans, & deprauatus facultatis imaginatricis, aut ratiocinatricis; plerumque in vtraque facultate consistit delirium, tum parū, probè imaginando, tum parū aptè ratiocinando; aliquando verò in altera tantum facultate, ut exemplo illustrat Galenus, lib. de symptom. diff. cap. 3. Theophilo, nempe Medico, contigisse, ut sola ei imaginatio deprauata fuerit, similiter & phrenetico cuidam, qui omnia vasa discernens, & sui nominibus appellans per fregit: huic enim sola vis ratiocinandi deprauata fuit, atque tum maxime sine febre est, i. prorrh. i. & 4. Insanire omnes dicunt eos, qui cita febrem desipiunt; & subdit omnes, qui mente læsi, continuè febricitant. *Phrenetici* vocantur, sola febre ab iis, qui *deliri* appellantur, discrepantes. Speciatim vero significat mentis alienationem cum febre, à phrenitide differens, quod hæc fiat, Cerebro primario affectu laborante

rante, cum symptomatum magnitudine & vehementia : Delirium autem eiusdem febris symptoma est, atque ex subiectis Cerebri partibus affectis, in primis verò ex inflammato Diaphragmate originem ducit, sublato in caput acri, & feruenti bilioso sanguine va-
pore, neque impetus tantos habet, quantos Phrenitis, 5. de loc. affect. 4. Accidit autem potissimum in februm ardentissimarum vigore, quanquam & aliquando in principiis, pro qualitate scilicet humoris moti, & cerebri robore aut imbecillitate. Ea autem qui detinentur, nemo *φρενιτικὸς* appellauerit, ut ait Galen. libr. 3. de libr. aff. Sed vel *παρὰ φρονιτικὰς*, vel *παρὰ παλαιοτάτας*, vide *Phrenitis*, & *Paraphrosyne*.

Deltoides, quasi deltæ literæ figuram imitans, musculus est multum carnosus, & in longum exprorectus, qui superiorem humeri partem, qua brachij caput est, tegit, (vnde & *ἐπ' ὤμου* dicitur, quasi humero instratus, & superpositus) qui etiam totius manus initium est, 3. de anatom. adm. cap. 3. Græcè *Δελτοειδής* sic dicitur, quòd triangularis videatur, ut ad literæ Δ similitudinem efformatus: cuius basis intelligi potest a media clavicula, ad extremam usque scapulam secundum humeri longitudinem, a quibus scilicet partibus ducit originem: latera verò hinc quidem internū a clavicula, inde verò externum ab infra scapula ad medium usque brachium, quo loco huius musculi veluti vertex est.

Denervationes (*ἀπονεύσεις* Græci vocant) sunt neruæ musculorum tenuitates, in quas musculi delinunt, & *Tendones* dicuntur, 1. de motu muscul. cap. 1. & 1. de anatom. adm. cap. 3. Nervus quidem non est, sed corpus inter ligamentum atque neruum natura medium,

latum

latum semper & aliquando tam tenue, ut membranæ videri posset, nisi fibris quibusdam intercurrentibus ab ea distingueretur; vide *Tendones*.

Dentem, sæpè Hipp. secundum colli vertebrae vocat, propterea hunc processum à dentis hominis similitudine, *Odontoeidem*, idest, *Dentiformem*, appellat, li. de ossib. cap. 8. Est autem ea apophysis secundo spondylo propria, perque eam cum primo spondylo & cum occipitis cavitate inter suas apophyses *αὐτοειδῆς* per diarthrosim iungitur, & valido quodam rotulo quoque ligamento occipiti alligatur, eique locum cui aptè & tuto assermetur, & stabiliatur, præbet spondylii primus, ipse quoque ligamentum quoddam transversum producens, quod illi apophysi intus iniicitur; subit enim dens in cavitatem primi spondyli. Ab hac apophysi totam etiam ipsam secundam vertebrae Hippocr. ut Galenus ait, *ὀδόντα* appellavit. Alii *Pyronoeidem* productionem, à nuclei similitudine nominant: Alii, à nuce Pineæ *κωνοειδῆς*. Ab eo caput inflecti, & extendi, quod *ἰσθμῶν καὶ ἀναρῶν* Græci dicunt, Gal. existimavit 12. de vii part. cap. 7.

Dentes in osium numero reponuntur, mollium Cerebri nervorum particeps, ob idque soli sentiendi vim habent evidentem, lib. de ossib. c. 5. A reliquis ideo ossibus differunt primum, cum reliqua sensu careant: dentium enim radicibus mollis quidam nervus a tertia coniugatione utraque gena inferitur. Superiore quidem per foramen eius quod sub oculo est, inferiore verò ad musculum in ore latentem. Hic autem nervus secum venam ad dentium nutritionem, & arteriam ad caloris nativi custodiam, cum meninge tenui in dentes adducit. Inde fit, ut dolor in dentibus pulsatorius per inflammationes sentiatur: verum

verum tamen foris, & in superficie integros dentes non sentire verum est, quod in eam dentis partem densissimam nervi fibræ non permeant, eamque ob rem cum ea parte limantur, secantur, vruntur, punguntur, non dolent. Tota verò parte interiore quam sint dolori obnoxij dentes, apertè docent, qui eos, canos; asperius tractant, aut frigidi calidiue cōtactu irritant. Deinde verò differunt ab aliis ossibus, quod toto vitæ tempore dētes augeantur: Id enim nisi fieret, prorsus deficerent, tibus comminuēdis attriti. Differunt & ab aliis ossibus, quod nudi sint, sine membrana, sine carne, quodque sint reliquis ossibus, vt ait Celsus, duriores, videlicet ne occurſu mutuo, mandendo, frangendoque attenuarentur magis quam reliqua ossa, propterea quòd nec cartilagine, nec adipe, vt reliqui articuli, superlinuntur, quibus atteri vetētur. Sunt autē dentes in perfectis hominibus vtraque gena sexdecim. In aliis enim plures sunt, vel pauciores, & tam multo fieri potius, quàm unum expediebat, ne uno aut dolente, aut ui, uel uitio pereunte affectio aliis communis existeret. Quatuor autem incisores unam modo radicem habent. *Κυνόδοντες* singulares sunt radices sortiti. Hi a basi rotunda in acutissimum mucronem fastigiati desinunt. Post hos sequuntur *γόμθιοι* ^{siue} *μύλαι*, hoc est, *clauales*, seu *molares*, quin ab utroque latere ut plurimum, aliquando autē pauciores aut plures, omnes asperi inæquales, ampli & lati. Hi pluribus radicibus genis infixi sunt, ternis quidē genæ superiori, binis uerò inferiori, nonnullis tamen exceptis qui supra sæpè cum quaternis, infra uerò cum ternis radicibus deprehenduntur. Sunt enim dentium genæ inferioris, quam superioris radices & pauciores & minores, quoniam genæ inferioris substantia durior den-

siorque

fiorque dentes sua etiam gravitate incubentes, firmitus continere potest, quam gena superior rara molliorque pendulos, & aelut in calum ob suam gravitatem proclives. Habent autem dentes omnes in pueris epiphy-
sim, quæ ipsis sæpè excidit sponte, sed relicta dentis radice, alia promptè in eius locum succrescit. Omnes præterea dentes infiguntur, ut ait Galen. ἐν τῷ ἑρ-
πατρίῳ βοθρίῳ. Sunt aut̃ πατρία, ossa ipsos cōtinētia:
βοθρία uerò, alveoli & cavitates, quas subeunt: prio-
res quaterni, quia secant, *Tomii*, τομῆς uel τομῖνοι,
idest, *incisorij*, ad cultri similitudinem, ad eos cibos inci-
dendos, qui molliem in se habent; hisce utrinque Ca-
mini adjacent, quòd Canum dentibus sint quam simili-
ni, ad dura cibaria non secanda, sed admodum con-
ringenda. Ultra hos, maxillares, & molles ab utro-
que latere; quod iis cibi (ueluti molis cereales fruges)
cuiantur, & atteruntur: ibidem.

Dentes genuini, qui omnium nouissimi nascuntur,
σωφρονιστῆρες, uel plurimum ab anno duode vigesimo,
sque ad annum vigesimum sextum; nisi aliquando sunt
etiam anno octogesimo nasci, aliquando indolenter,
etiam cum magno cruciatu utrobique singulares, in pe-
tissima oris parte oriuntur; ideòque ita nominantur,
quod nascentur, cum homo σωφρονίζῃ, id est sapere
incipit; sunt autem è genere dentium molarium.

Dentifricium, medicamentum est, quo utimur ad den-
tes confricandos, à lordibus abluendos, quin & gingi-
varum circumstarum, quando humore fuerint præ-
nantes ad deperationē, & absterisionem. 5. de loc. aff.

Dentitio, ὀδὺν ἰασις, est dentis iam concreti, extra
linguam eruptio, seu dentium ortus, 8. de placit.

cap. 6. Dicitur & ἰδοντοφυία. Primum quidem dentes intra suos alueolos concipiuntur & concreſcunt; deinde erumpunt, quorum vtrumq; magno cum dolore fit. Illud ἰδοντοφυία, hoc ἰδοντοφυία Græci vocant. ἰδοντοφυία. Inſtrumentum eſt Chirurgicum ſeu Voſſella, ad euellendos dentes, cuius uſum ſimplicem nulliſque negotij eſſe, dicit Hippocrates.

Depaſcens vlcus, idem eſt ac *Phagedana*, vide *Herpes* & *Phagedana*.

Deperditio, vide *Abortus*.

Deprehenſiones, vide *Catalepsiſ*.

Depreſſum, & oblongum offis caput voco, ad ceruicem vtrumque cui adnalcitur, referens, lib. de offib. in procem.

Deriuationem appellare conſuevit Hippocr. quando ſuccus aliquis euacuatione indigens, neque per conuenientem regionem ferri incipiens, artis auxilio vacuatur per loca proxima: E. G. ſi per lotij vias exire cœperit, vitiata veſica, aut renibus, tunc per aluum deriuare ſatiùs fuerit; veluti, ſi per ventrem vitiatis inteſtinis ferri tentauerit, ſuccum euacuandum ad vrinarios meatus dirigemus: In mulieribus verò nonnunquam ad vterum, aut è contrario, interdum vteri profluuium, ad vrinæ vias, ac ventrem deriuabimus. At ſi in aliqua id genus euacuatione vomitum concitauerimus, *reuulſionem* hanc nominant; vt ſi vomitus etiam retraxerimus, ad vterũ, aut veſicam, aut ſedẽ, com. 2. in 6. de morb. vulg. 7. *Deriuatio*, Græcis παροχέτευσις eiùſdem eſt generis cum euacuatione, facta per partem culam, quæ fluxionem ſuſcipit; fit autem per aliquam vicinarum partium *Rinare* igitur eſt, per riuos ducere. *Derinare* autem eſt, à riuis ad latera diuertere. Oribas.

Oribas. lib. de Cucurbitulis, vide *Purgatio*.

Derma, vide *Cutis suprema*.

Desipientia est, cum ægri nihil rationi consentaneum dicunt, aut agunt, 7. aphor. 14.

Desipientia ferina, est, in qua ægri calcitrant, pedibus feriunt, mordicus impetunt, & exandescunt, eos, qui ingrediuntur, tanquam hostes suos reputantes, com. 1. in 1. prorrh. 25.

Desiccatio oculi, est idem ac spasmus oculi, lib. de ocul. cap. 13.

Desperata ulcera, sunt, quarum curationem plerique aggressi non absoluerunt, sed tanquam ab insanabilibus desistere, 4. de comp. med. per gen. cap. 5.

Destillatio, i. est, fluxio quælibet, quæ per venas accipit ad partes inferiores fertur, 3. aph. 11.

Desudatio, ab Hippocrate sumitur, vel pro sudore circa Thoracem, & Caput apparente, vel pro eo, qui ex toto manat corpore, ubi tum paucus, tum nihil confrens, fuerit, com. 3. in 1. prorrh. 33. quæ & *Sudamina* dicuntur; vide *Sudamen*.

Detritio, vide *Rhacosis*.

Deurens febris, vice *Continua*, & *Synocha*.

Diabetes, est *Urine profusum*, *Hydrops ad matulam*, *Hydrops matelia*, *Dipsacos*, *Hydrops in vas urinale*, *Diarrhea in urina*, *Διαβήτης*; *ὕστερος εἰς ἀμύδα*, *εἰς ὕδα διαρροία*, *δυσάκεις*; Synonyma sunt, quæ significant cum continuo & exuberanter per urinam redditur id, quod bibitur, nihil planè immutatum, 6. de loc. aff. 3. de sympt. diff. c. 6. Patho hæc talis est, qualis circa alium læuitas intestinorum, & bulimos, extinctio, ut diceret quispiam, utriusque virtutis, & retentricis, & aliteratricis, 1. de cris. 12. Consentit quidem quodammodo

vesica,

vesica, & copia urinae premitur, at nec ipse morbus, nec morbi causa est in vesica, sed in solis renibus. Est autem attrahendae urinae inexplibilis cupiditas, & eius retentionis impotentia. Attractionem tantam excitat vel calida & sicca renum intemperies, vel humor biliosus, acris, salsus, & renes assidue irritans, inque ipso renum corpore impactus, vel, ut ait Aretaeus, morbis aliquis acutus in renes firmatus, & per crism malignitatem suam in eos deponens, vel venenum aliquod delaterium ex eorum genere quae vesicam & renes infestant, quale id est quod à Diplade funditur. Haec enim omnia sitim ingentem mouent, ob quam assidue aeger bibit. Potum autem hunc auide renes attrahunt, antequam etiam in ventriculo concoquatur, sed cum propter imbecillitatem non retinent, sed talem effundunt, qualis sumptus est. Qua in re Diabetes appetentiae caninae persimilis est, quam ὀρεξιν κινῶσιν vocant. Nec verò id solum quod bibitur, protinus crudi mingitur, se humor etiam copiosus à renibus colliquato corpore trahitur, in eoq; Diabetem propriè consistere, Aretaeus arbitratur, definiens esse σαρκῶν καὶ μελέων ἐς οὐρὸν σνύτηξιν, hoc est, carniū & membrorum in urinam colliquationem, ob quam & summa totius corporis macies est, & copiosior multò urina redditur, quam potus est. Quod si vel modico tempore à meiēdo abstinerint, tument lumbi, testes, & ilia. Rarum id prorsus malignus, & Galbis tantum visum. Eo autem nomine appellatur, quod humor corporis nullo in loco consistat, sed subinde de loco in locum διαβαίνει, hoc est, pertransit, non aliter quàm aqua per siphonem, quem διαβήσιν vocant Mechanici, ut scribit Colum. lib. 3. cap. 10. Latini

nullum

nullum illi peculiare nomen dederunt.

Diabotanium, Emplastrum ex herbis factum, 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Diabrosis, siue *Anabrosis*, Διαβρωσις, καὶ Ανάβρωσις erosio, est oris alicuius vasis apertio, 5. de loc. aff. 5. a re acri, & mordaci facta, siue intrinsecus à vitioso succo, siue extrinsecus à valentioribus medicamentis, aut igne. Hæc ab effectu Διαβρωσις καὶ appellantur, media quodammodo inter *εξουχτις*, καὶ *καυστις*, hoc est, *extergentia*, & *adurentia*. Sunt enim extergentibus valentiora, vrentibus autem debiliora, & periculosa minus, vt scribit Gal. Huius generis sunt, *Auripigmentum*, *Sandaracha*, *Asia petra flos*, & *Misij*.

Diachylon, Διαχυλῶν, Emplastrum, quod ex succis est compositum, emolliens, concoquens, 9. de comp. medic. per gen. cap. 9.

Diacodion, confectio est, ex capitibus papaueris, 7. de comp. med. loc. 2.

Diadosis, Διαδοσις, digestio, seu distributio alimenti est, cum sanguis alimentarius ex iecinore, per venas maiores, in minimas, ipsumque in corporis habitum, transit, vide *Anadosis*.

Diaeta, victus ratio, est certa victus institutio, & norma, non in solo cibo, & portione consistens, verum in omnibus aliis sex rebus externis, non naturalibus, ut Otio, Exercitatione, Venere, Somno, vigiliis, Repletionem, Inanitionem, Animi affectibus; ad Thrasis. cap. 35. In *Diaeta* duo hæc potissimum sunt præcepta, in quibus tota ferè vertitur, integram sanitatem similibus esse cōseruandam, inclinatam autem & in vitium propè ruentem, modico contrariorum usu retinendam esse. Inde

disciplina, quæ hanc instituit, *Dietetica*, διαιτητική, dicta, est pars artis medicæ curatiuæ, θεραπευτικῆς, tum quæ sanis ad imminentes arcendos morbos, tum quæ egros ad præsentis profligandos debetur, l. 1. met. c. 15. Præter dietā θεραπευτικὴν, illa est αἰαληπτική, quæ conualescentibus a morbo convenit, in quibus quia nullam præter naturam causa superest, neque affectio morbosa, sed infirma tantum sanitas, aut parva admodum vitia, quæ per imbecillitatem vitari vix possunt, ea diætā vtendum, quæ robur quod deest, supplicat, quodque vacuatum est atque dissipatum, refarciat, simulque concoquat, euacuet, purgetque excrementa, & ab his abstineat, quæ sanitatem sæpe labefactant, cuiusmodi sunt algor, æstus, lassitudo, cruditas, ebrietas, vigilia, iracundia, & reliqui animi affectus. Hæc enim omnia τῇ διαίτῃ nomine comprehenduntur.

Diagnosticæ signa sunt præsentium rerum, causarum morbidarum, & morborum declarativa, lib. de opt. sec. temp. cap. 5. vide *Prognosticæ*.

Dialeimma, est illud intervallum, quo febris ad intermissionem venit, antequam sequens annotatio adueniat, lib. de morb. temp. c. 3. Dicitur quidem in febribus ἀπουξία, in aliis verò morbis, vt *Cephalea*, *Epilepsia*, *Podagra*, simplici. et διάλειμμα ἀπὸ τοῦ διαλείπειν, hoc est, ab intermittendo, significat autem apud Hippocratem, ἐλκεῖν ἢ αἶσιν, hoc est, remissionem puram & synceram, vt apud 43. lib. 4. Febres quæcumque non intermittentes, tertia die fortiores sunt, magis periculose: si verò quovis modo intermiserint, periculum abesse significatur. Sic enim in comm. Gal. explicat: Idem verò scribit intermissionem bifariam dici

primum

primum quidem de iis febribus, quæ accessionem perpetuam non habent. Deinde verò de iis, quarum accessio non soluitur integrè, et si insignes subeat mutationes & post principium, argumentum, atque vigorem manifestam habeat remissionem.

Diapedesis, *Διαπιδνσις*, est exiguorum vasorum apertio, vel potius eorundem tunicæ extenuatio, adeoque excretio feri sanguinis, 3. de caus. sympt. c. 2. Fit ergo ex tunica rarefacta, sanguine verò tenuato, & ex graciliù vasorum ore adaperto; vnde transcolatur sanguis, & sudoris aut roris more transmittitur, 5. meth. c. 2. Eumq; in modum ex iccinoris renumq; debilitate meitur, ac sæpè per aluum delicitur sanguis olentum serum. Itaq; *ἡ διαπιδνσις* præcipua causa est sanguis serosus, tenuis, & calidus effluens per vasorum tunicas rarefactas. Quo si contigerit aliquando *διαπιδνσις* apertis vasorum osculis, vasa quidem omnino exigua sunt, & ex quibus sanguis impetu, & copiolus emanare non potest. Differt ab *Anastomosi*, in qua tum maiorum venarum, arteriarumque ora aperiuntur, tum sanguis impetu, & copia erumpit ex iisdem aertis.

Diaphanes, Græcè, *Διαφανής λίθος*, Latine dicitur, *Lapis specularis*, ex iis est, qui nemter, ac sine morbo exsiccant, qui vltus vlceribus ægrè cicatricem admittentibus non item malignis, ac rebellibus, conducit, 4. de comp. med. per gen. c. 1. Significat etiam *Perspicuum*; item *Candens* apud Hippocr. vt interpretatur Galen. commentar. 1. *ἵς τὸ περ' ἀφ' ωρ*. Quo loco consulit Hipp. feramenta quæ ad alam admoventur, candentia esse oportere.

Diaphoresis, *Διαφώρησις*, Latine *Digestionem*, seu *Eua-*

porationem dixeris, est, quæ tumorem, qui in phlegmone oblesla inflammataque parte continetur, per meatus insensibiles educit, sub specie halitus, 13. method. cap. 16. & medicamenta quæ id præstant, Διαφορητικά, hoc est, *Discussoria*, & per alitum digerentia, appellantur. Omnia, in vniuersum desiccant, idque duplici ratione, aut humores ebibentia, velut & per cutis meatus exigentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam aliterantia partem, 5 de simpl. med. fac. cap. 5. Ea proxima sunt attrahentibus; siquidem vicinæ sibi virtutes sunt, eorum quæ in alto latent attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt, etiam nonnihil omnino discutiunt; & quæ discutiunt, pariter trahunt.

Diaphragmantes membrana, διαφραγμοντες ὑμνεις dicuntur membranæ illæ, quæ totum thoracis spatium, à iugulo ad septum vsque, in duos sinus, dextrum, sinistrumque diuisiunt, vulgè *Mediastinum* vocatur; vide *Hypozocotes*, *Cingentes*.

Diaphragma, septum transversum est, quod & *Phrenas*, id est, *Mentem*, appellarunt Antiqui; quia (vt aliqui putant,) eo inflammatione affecto, mens lædatur: nam multi quidem, varios ob morbos, delirare solent; sed quæ eo affecto incidunt deliria, non multum distant à Phrenitide; nulla enim pars, Cerebro subdita, præter septum transversum, perpetuum delirium excitat; itaque maximus illi videtur esse cum mente & huius sede (Cerebro) consensus. A Platone *Diaphragma* vocari cœpit, id est, Septum transversum: est enim musculus rotundus, obliquos, membranofus, & carnosus, medius inter partes nutritioni seruientes (quas Peritonæum continet,) & inter spiritus organa, (quæ tunica succingente concluduntur:) eamque ob rem *Diaphragma* no-

minatur,

minatur, quod eas partes *διαφραττει*, idest, diuidat
 quasi Septum quoddam medium: qua ratione Aristot.
 illud *Succincturam* appellat, de loc. affe. 4. Maiores no-
 stri *Præcordia* nominarunt, quia cordi prætenduntur,
 com. 1. in 1. progn. 14. Hic musculus liberæ respiratio-
 nis instrumentū, nec situ, nec forma, vlli alteri musculo
 respondet: siquidem in medio caput principiumve ha-
 bet, ex quo fibræ, instar linearū, a centro ad circūferen-
 tiam excurrentiū, in eas partes proficiscuntur, in quas ip-
 se inferitur. Est autem suo capite membraneus, indeque
 paulatim carnosior efficitur. Totus admodū obliquus
 est, si quidem ante pectoris ossi, iuxta mucronatæ carti-
 laginis radicem adhæcēs, per spuria rūt costarū extrema
 in lumbos duabus aponeurosis longius protenditur;
 itaque a prioribus partibus deorsum ad posteriora ver-
 git. Duabus membranis tegitur, vna inferiore a perito-
 næo; altera superiore, a tunica costas succingente. Di-
 citur & in naribus *διαφραγμα*, quod narium meatus
 diuidit: *Κίων & στυλὶς* quibus iam dicitur.

Diaphthora, est corruptio ciborum in ventriculo, 2.
 de loc. affect. 1.

Diapyemata, vide *Empyemata*.

Diaria febris, *ἡμερῶς πυρετός*, Ephemera febris
 est, quæ vnica accessione, vnoque plurimum die natu-
 rali, a sola ferè natura curatur, a causa manifesta (vt ex
 ira, insolatione, luctu, pugna) orta, 9 method. 1. In-
 spiritibus accensam, excitant causæ, aliis f. b.ribus com-
 munes (præter spirationem, & putredinem) Ira, Dolor,
 Vigilia, Cura, Æstiuus Sol, Fatigatio, Bubo, Pertinax
 studium, Cruditas.

Diarrhæa, *διαρροια*, idest, *Profluuium*, copiosior est
 alui fluor, sine phlegmone, & vlceratione intestinorū,

lib. finit. Per *Diarrhœam*, vel pituita, vel bilis altera, syncera, aut inuicem in ista vacatur, ab humoris copia, vel cruditate, quæ aut in toto corpore, aut in certa quadam parte sedem habet, exorta: Venter enim, multitudine grauatus, quam vel ipse colligit, vel ex aliis sese in eum exonerantibus suscipit, aut praua aliqua qualitate irritatus, quæ cruditas (quæ proprie *διωσπελία* dicitur, inuexit, τῇ διαρροίᾳ infestatur, præterquam si eius oriñcium, supernæque partes valentes sint; inf. r. næ autem & *πυλωρός* anguidæ: nam si contra acciderit, vomitiones pro *Diarrhœa* succedent, vt docet Galenus, 3. de natural. facultat. Vti autem ex ventriculo in intestina materia *Diarrhœa* fuit, sic etiam per Venas metataticas in eadem portio ipsius defertur. Cæterum humorum cruditatem cum vitiosi cibi potusque, aeris intemperies, inuictum otium, cuius adstrictio, tum etiam febres longæ aut acutæ molliuntur, quæ & humores & ipsum corporis habitum vitiant, vt inde facile *Diarrhœa* excitetur. Verum sicut ea febribus quandoque succedit; sic illas utique non minime prouocat; ex acturgendi frequentia. Quod si etiam rosio, aut dolor, aut calor immodicus (quæ pro qualitate humoris fluentis sentiuntur) in ventre atque intestinis sit, huic certe vel longè magis affectio febrilis increfcit: sed nec totæ febres *Diarrhœam* mouent, sed etiam venenatissima, & purgantia medicamenta, quæ intemperiem in cinore ventriculo, aut intestinis renquerint: Quæ quamdiu manebit, aliud descendet, perque eam corrupti & putres vires, non vnus quidem generis, sed varij pro ciborum differentis, & æg. citius intemperatura vacuabuntur.

Diarrhœa in vrina, vide *Diabetes*, & *Camina cupiditas*.

Diar-

Diartrosis dicitur aliquâdo generatim omnis ossium compositio ad motum voluntarium comparatas, apud Gal. sed nonnunquam speciatim sumitur; estque altera τοῦ ἀρθρου, id est, *articulationis differentia*, quam definit Gal. esse σύνθεσιν, seu. σύνταξιν, hoc est, commissuram naturalem ossium, inter se motum evidentem habentium. Eam alio nomine Hip. περισάρθωσιν appellat. Est autem ea ossium connexio omnino laxior, sicut evidens, facilis, magnusque motus sit, cuiusmodi in cruribus, brachiis; manibus. & pedibus habetur. Huius tres different. Gal. statuit ἐνάρθρωσιν, ἀρθρωδίαν, γίγνλυμον.

Diaspermason, medicamentum est, quod ex lennibus contra. 7. de comp. med. per gen. 7.

Diaspoleticum, medicamentum est, cuius compositionem, Cuminum, Piper, Ruta, ingrediuntur, 2. de sanitat. tuend. cap 5.

Diastole, est motus dilatationis, & elevationis arteriæ, ad substantiam quandam exterius attrahendam, quo nativus totius animalis calor, cum primis aeream, per immissum spiritum refrigeretur; quemadmodum *Systole* est arteriæ submissio, & contradictio, ut id, quod ex humorum deustione in toto animali contractum, veluti fumida superfluitas est, expellatur, 1. de usu puls. cap 3. Ut eundem usum præstet *Diastole*, & *Systole*, totius animalis calori, quem inspiratio & exspiratio, particulatim calori Cordis, ibid.

* *Diatefferon*, Emplastrum, quod ex quatuor rebus constat, *Chalcitide*, *Misy*, *Diphyrge*, *Chalcanto*, 5. de compos. medic. per gen. cap. 14. Διατίσσαρον Græcè Διατίσσαρων nomen quoque est potionis, quam Antiqui ad coxendicis. dolorem instituerunt continuandam

toto anno . Sic dicta est , quòd quatuor medicamento-
rum generibus constet, hunc in modum: Chamædryos
pondo, gentianæ vnciæ nouem; Aristolochiæ rotundæ
vnciæ nouem; Rutæ seminis sicci sextarius: Hæc cula,
dantur quotidie ad annum ieiuno ex duobus aquæ fri-
gidæ cyathis. Author Paul. lib. 3. cap. 77.

Diatrion pipereon, i. lest, medicamentum, triplici pi-
peris genere constans, 4. de sanit. tuend. cap. 5.

Diatritos; idest, tridui inedia, vt *Diatritarii*, qui tri-
duanam inediam præcipiunt, 4. meth. c. 4. cuius primus
autor Thessalus; *Διατριτος* Græcis. Inuentum est Em-
piricorum, totum autem erat in victus ratione, quam
ita instituebant in omnibus ægris, vt primum in quar-
to die ipsos cibarent, post in sexto, mox in octauo,
deinde in decimo. Prima quidem cibatio post primam
Diatriton, reliquæ alternis diebus: Sed nugas eas & de-
liramenta Galenus multis in locis ridet.

Dichophya, pilorum defectus est, quando bifurcan-
tur, lib. finit.

Dichroma (*διχρῶμον* Græcè) Emplastrum sunt, quæ
& *Gitua* dicuntur, coloris ambigui, 2. de compos. me-
dic. per gener. cap. 1. Neque enim particularis alicuius
medicamenti nomen est, sed multorum quæ du-
plici colore prædita sunt. Horum autem colorum ra-
tionem Galenus explicat, lib. 2. ad Glauconem, de sinu
differens. Ex Lithargyro, inquit, & Æruginè, plurimū
decoctis emplastra fiunt *χιρρὰ ἡ φαία*, id est, fulua di-
cta; quibus, vbi statim reponuntur, quædam extrinse-
cūs supereminetia fusca concrefcit, sub qua pars me-
dicamētī profundior, plusquam ab initio fulua videtur,
propterea *dichroma* vocant, idest, *bicolora*: quidam vero

eadem vocant, *Diprosopa*. *διπρόσωπα* id est *bifacia*, 2. ad Glauco. 8.

Dicrotus pulsus, *δικροτος σφυγμός*, seu bis feriens, est, cum in diastole, quæ sit quau recessio arteriæ, non perfecta obitur, sed cunctatur; idque pro subductionis, aut inhibiti spiritus quantitate, deinde repetitio perfecta, debitæ sit contractionis, lib. finit. Estque vnus pulsus, non duo (contra Archigenem) qui simulatque omnem distentionem effecit, se paulisper subducit, ac mox pulsat iterum vt intermittenti quies media, locus intercipiat, cuius dicroti contractio, congressus, vel reditus dicitur. 1. de differ. puls. c. 17. qui post absolutam diastolen, antequam perfecte contrahatur, secundo tactum ferit, vt ex malleis incudem percutientibus, & postea resiliens, apparet. Talis sit nonnunquam, propter inaequalem cordis intemperiem, propter quam inter se contendunt calidæ partes cum frigidis, vt subsistere interim necesse habeant calidæ retentæ à frigidis, interim celerius frigida moueri a calidis attractæ. Fit etiam, & cum collectus est in multis eius partibus ingens fuliginosorum excrementorum acervus: si namque vna contingat, vt cordis partes quædam sint præcalidæ, aliæ fumosa fuligine præfocentur, ad contrarios profiliunt motus, vt alteræ distentionem moliantur, alteræ verò ad superfluitatum expulsionem confluant, ex qua lucta tres numero pulsus huius differentia existunt, vt docet Galen. lib. 2. de prælag. ex puls.

Didymi, *διδυμοι*, 14. de vsu part. cap. 14. dicuntur proprie fratres vno partu editi; dicuntur & *Testes*, honestiore vocabulo, vt ait Galenus; dicuntur & *διδυμοι* in Cerebro, de quibus vide *Glutia*,
Dies, apud Medicos non solum lucem, sed etiam no-

Item completitur, non id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur, appellant *Diem*; sed etiam illi tempora noctis adjacentia, 2. de cris. cap. 2.

Difficultas intestinorum, quæ & *Δυσεντερία* dicitur, 2. de facult. nat. c. 9. propriè *ulcus intestinorum* est, ex mordacibile flaua, atra, & pituita salsa, quam sequitur interancorum abrasio, cum quibus paulum cruoris discernitur, immitissimis cum torminibus, 6. de loc. affect. c. 2. in quibus difficultatibus intestinorum, cum adhuc constituuntur, quædam corpora pingua excernuntur; post hæc autem nisi finiri anticipauerint, quædam ramenta intestinorum, (ablata ipsorum superficie interiore, quæ membranosa existit, & densa, illi, quæ cutem exterius contegit, Epidermidi, idest, Cuticulæ appellatæ, proportionalis (post hæc autem) *Dysenteria* videlicet iam completa aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum: excernuntur enim partes magnæ intestinorum, quas & *Carne*, & *Carniculas* vocamus, 4 aphorif. 26. Consistit autem illa interdum in crassis, aliquando in tenuibus intestinis, id quod ex cruore, & ex ipsius ramentis dijudicatur. Nā si & cruor & ramenta ita mista sunt reliquis excrementis, ut vniuersa misceantur vniuersis. in superioribus: si verò supernatant, in inferioribus intestinis *ulcus* esse ostenditur. Talis quippe propriè dicta, *Dysenteria* est, nomen habens a læa particula, quam solam plerique *Dysenteriam* nominandam cenient; et si Hippo. atque alii non ipsam modo intestinorum exulcerationem, verum omnē cruoris per intestina vacuationem, *Dysenteriam cruentam* nominent; nomen morbi, symptomati tribuentes, 4. de art. 40. Sunt autem excretionis sanguinis per intestina sine ulcere tres modi: vnus propter boni sanguinis copiam in toto corpore aucti, quæ

ex venarum orificiis in intestina apertis effunditur, eo tantum differens ab hæmorrhoidum profluvio, quod in hoc venæ aut duntaxat, in illo autem secundum totam intestinorum longitudinem, perque omnes eorum anfractus, longèque ab ano venæ aperiantur. Talis *δυσεντερία αἱματηρά* appellatur, acciditque potissimum his, quibus a quodam membrum excisum est, aut intermissa exercitatio. Secundus est, cum propter iecinoris imbecillitatem aqua fus sanguis deflucit, loturæ cardiacum persimilis: quod enim imbecilla sit vis eius retentrix atque alie atrix, sanguis eodem modo excernitur, vocatur autem ea *δυσεντερία ἡνωατηρά*. Tertius est, cum sanguis, propter visum trauē vel aut per missionē acrior, venarum orificia aperit, & per intestina fertur. Hæc proprio nomine caret, & a Paulo comprehenditur sub ea d'enterie specie, quam *αἱματηράν* vocant: distinguitur verò a Galeno, libro tertio, de causis symptomatum, illam propter sanguinis copiam, hanc propter acrimoniā effici asserenti. Itaque quatuor sunt in uniuersum cyles: ræ: vna verè & propriè dicta, tres verò improprie a symptomate, quod omnium commune symptomata sit sanguinis per alium excretio.

Difficultas urinae, vide Ischuria.

Difflatio, Perflatus, & Diffatus. Quicumque in Hippocrate placuit legitime versatus fuerit, is demum difficillatationem esse, quam Medici omnes vltato vocabulo, solum latetem transpirationem appellant, qua diffantur corpora vaporosa, aliam quidem talem esse, qualis vapor est, aliam autem, qualis aer fixus, atque aliam, cum, quæ videri possunt, exeunt humitates. Aduersus Lycum, cap. 2. quæ Græcis, *ω θρω ἰτης διαπνοή, & ἀδηλος ἀθήσρ διαπνοή,* hoc

est perspiratio, & diffilatus, qui ratione cōprehēditur, & trāspiratio sensu, imperceptibilis appellatur. Hæc corporibus omnibus toto vitæ curriculo inest, eiusque author est calor natiuus, etiamsi varia sit pro discrimine ætatum, anni temporum, studiorum, & totius vt breuiter dicam, diætæ. In quibus tamen differentiis commune hoc inest, quod calidioribus temporibus, regionibus, ætatibus, naturis, diætis non parua substantiæ nostræ portio per διαπνοήν exhalet, vt contra in frigidioribus parua propter cutis attrictionem. Est autem necessaria diffilatio ad corrigendam qualitatem, & intemperiem, quæ retentis fuliginosis & acris excrementis necessarii excitatur: eoque fit, vt quibus suppressa est, eos febres faciliè corripiant; vide *Inspiratio*.

Digiti, Δάκτυλοι, quinque sunt in omni manu. Primus, *Pollex*, quod oppositus cæteris quatuor digitis, hisce æquipolleat; ἀντί' χειρᾶ, hoc est, *Promanum*, tantumquam pro tota manu enet, vocarunt. Hippocrates μέγαν, hoc est, *magnum*, nominat, quamuis parvus sit, quia cæteri sine eo ferè inutiles sunt; apud Aristot. 4 de part. animal. cap. 10. *Magnus* à Galeno dicitur, non solum *viribus*, sed & *magnitudine*; nam principium Pollicis, vt ait, propè radium est, adeò vt eum ferè attingat. Celso, & Aristoteli, *viribus tantum magnus* dicitur. Secundus, δίκωνός, *Index*: Tertius, μέσος, *Medius*: Quartus, περιμεσός, *Annularis*: *Medius*, a Medicis appellatur: Quintus, μικρός, *Minimus*; *Annularis*, omnibus aliis corpore, & viribus inferior; Sin- guli terna ossa continent, (præter Pollicem qui duos) mutuò sibi colligata, & ordine sibi succedentia; veluti in acie, vnde & φάλαγγες a Græcis appellantur; ab aliis

aliis autem **Σκυτάλιδες**, a turma equitū, quān Græci
Σκυτάλην, vocant: Latini communi vocabulo, *digito-*
rum internodia dicere solent. Græci verò etiam eorum
singula suis nominibus distinxerunt, a quibus primi
articuli metacarpio proxim **πρὸκόνδυλος**, medij;
λόκδυλοι; postremi, **μετακόνδυλοι** appellatur, &
ab his unguium principia, seu radices **ῥαξωνυχία**
extremi deinde digitorum fines, **ῥάγες καὶ κορυφαί** ve
scriptū est à Rufo, in partium hominis nomenclatura.
Porro ima digitorum ossa metacarpio per diarthrosim
alligantur, excepto pollice cuius os intimum non me-
tacarpio, sed carpo per diarthrosim copulatur: Ex quo
quidam censent os illud non ad pollicē, sed ad metacar-
pium pertinere, ipsumq; pollicē, vti & eos qui sunt in
pedibus, duobus tantum ossibus constare. **Δάκτυλος**,
digitus, minima etiam mensura est earum, quibus rerum
interualla dimittitur. Hæc autem non secundum digiti
longitudinem, sed secundum eius latitudinem siue
crassitudinem accipi debet. **Δάκτυλοι** dicuntur quoque
Palmæ fructus, quos Græci alio nomine **φοινικοβαλαους**
Latini *Palmulas*, Franci *Dattas* vocant.
Dignotio, est præsentis morbi, huius sedis item &
causæ effectricis coniunctæ cognitio, Græcis, **τεκμαρσις**
dicta. *Præcognitio* verò, est futuri morbi cognitio, 3 de
Med. cap. 1. Dignotionem autem proprio nomine deno-
tationem appellamus, 1. progn. 5.
Dimotio, vide *Prolapsiones*.
Dionysisci, seu ossæ eminentiæ, quæ propè tempo-
rascuntur dicuntur autē **Κορνήα Κέρατα**, detorto à
nigeris animalibus nomine. Sic dicuntur à *Βας-*
χο,

cho, quem Poetæ *Cornutum* fingunt.

Diplasiasmus, id est, *Duplicatio*, quæ est duorum musculorum, qui ab ipsa scapula excipiuntur, ad exteriora, posterioraque membrum circumagunt, quatenus ambo simul agentes, brachij circumductione efficiunt, lib. de muscul. diff. et. cap. 18.

Diploe, secunda lamina Caluariæ, 6. method. 6. & *Medullium* vocatur a Recentioribus. Sic autem vocatur os Caluariæ, *duplicata lamina*, & interior eius pars rara & laxa cavernosa, & mellifera, qua ossa inter se connectuntur.

Dipsacos, vide *Diabetes*.

Diprosopa, vide *Dichroma*.

Discissiones, magna vulnera solet Hippocrates appellare, quæ lethalia sunt; ut vulnus in cerebro, cum ad aliquem eius ventriculum pervenerit, 6. aphor. 18.

Discretiva, Medicinæ pars est ea, quam *Significativa* nam recentiores vocant, Græci *σημειωτική*, 1. de his quæ in medic. fiunt, 1.

Dispersus morbus, vide *Communis*.

Dissimilare membrum, *heterogeneum*, seu *compositum*, est, cuius quamcumque partem assu:mpseris animalis, toti communicans non erit nomine, nec definitione, sicut manus, & facies, libr. anatom. viv. vide *Infractum mentale*.

Dissidentias vocat Hippocrates, cum ossa, quæ natura coherent, ac sese mutuò contingunt absque articulo, ob aliquam læsionem diuidunt a se, ac distant; ut Cubitus & Radius in brachio ad gibbum, & ad manum. In Crure, Tibia, & Sura, qua & Genu, & Calci committuntur, com. 3. in medic. 31.

Dissolutiones, vocant animi defectus, Græci *λυσις*

διψιας

Συμιας, & λυποψας iuocant, 1. ad Glauco. 14.

Distentio, idem est, ac neruorum conuulsio, quæ est triplex; *Opiſthotonos*, id est, tensio ad posteriora; *Emprosthotonos*, id est, tensio ad anteriora; & *Tetanos*, id est, æqualis tensio, 4. aph. 37. Qui *Tetanus* est per vniuersum corpus neruorum conuulsio, 3. loc. aff. 10.

Distorsiones sunt, cum vel a sua sede dilabatur aliquid in exteriorem corporis partem, vel introrsum in unitatem aliquam prolabitur, ut in naribus, si in exteriorem partem, aut os, aut pinnula earum abiit: & contrâ memoratæ partes si in foramen descendant, introrsum distorsio fit, 2. de iis quæ in medic. 33.

Diuretica pharmaca, *διουρητικά φάρμακα*, medicamenta sunt, quæ ad ciendas urinas accommodantur, quæ & *Vretica* dicuntur, 11. meth. 16. & 5. simpl. c. 20. quæ duum sunt generum; aliqua enim in hocriter id præstant, ut *Eccathartica*, id est, Poros expurgantia, quia calida & tenuium partium; alia uehementius, ut quæ plurimum mouent urinam, quæ acriora sunt, multoque magis siccant, & excalefaciunt, prioribus: cuius generis sunt semen Apij, Petroleini, Feniculi, Dauici, Smyrni, & quæcumque lac augent, & menses mouent, quod ab his sanguis non modò extenuetur, sed fundatur etiam atque secernatur. Siquidem quò facile ad se attrahant renes, quod in sanguine aqueum, tenue & serosum est, hæc duo moliri oportet; primum, totius sanguinis fusionem, deinde segregationem, quorum neutrum absq; valido calore fieri potest. Calori autem adiunctam esse oportet siccitatem, quod humiditas acrimoniæ retundat in ciendis vrinis necessariam.

Diurnus morbus est, quicumque acutorum ex decientia, terminum prætergreditur, quem nunc quadra-

gesimum,

gesimum, nunc sexagesimum diem Hippocrat. facit, 2.
de diebus dec. cap. 12.

Dodecadaetylon, siue *Duodenum intestinum*, δώδεκα δ' ατυλον, primum est intestinorum fundo stomachi alligatum, a longitudine duodecim digitorum sic appellatum, 6. de anato. adm. cap. 7. Quod quidam non dignantur vocare intestinum, priusquam in anfractus, orbèsque conuoluatur, sed ipsum εκφυσιν, id est productionem simpliciter, vel cum appendice productionem duodecim digitorum, εκφυσιν δ' ὡδ' εκαδ' ατυλον nominant, primumque intestinum in ordine dicunt esse ieiunum, ibidem, capit. 12. Hoc idem *Duodenum*, vocant, *Portinarium*, siue *Ianitorem*, libr. de anatom. vii. In id meatus inseritur, à vesica bilem continente; per quem ea in ipsum expurgatur.

Dolor, ὀδύνη, tristis sensus est, ut voluptas blādus, 2. de loc. aff. 2. Proprie dictus, Dolor non morbus est, sed symptoma. In sensu omnis consistit: est enim fons & radix sensus, neque potest contingere, nisi in partibus sentientibus: Contingit autem omnibus sensibus. Est autem doloris, qui per sensus omnes fit causa duplex; vna, communis, altera cuiusq; propria. Communis, est violenta & celeriter facta alteratio & corruptio: quod enim sensim & paulatim fit, sensum latet. Propria verò, in vnoquoq; sensu est, in tactu quidem magnæ mutationes à frigidi calidique violento contactu: namque humidum & siccum, si absint calefactio & refrigeratio, citra violentiam corpus contingunt: præterea ab iis, quæ quassandi, secandi, distendendi vel exedendi vim habent: hæc enim omnia vel substantiam diuellendo, vel distrumpendi corporis periculum adferendo, dolorum causæ sunt, qui si per inflammationes fiat effectus

ctus, atque in corporibus sensibilibus, vel per se, proprio & primario affectu, in arteriis, vel reliquis partibus sensibilibus omnibus per consensum, eo quod à vicinarum contactu premantur, *Puls torius*, siue *Pulsatilis*, *σφυγμαίων* ἢ *σφυγματοίων*, dicitur, 2. de loc. aff. 3. Si verò in aliquo viscero, circumabjens membrana, per quam nervus dispergitur, à tumore præter naturam extendatur, ita ut graucas quædam sentiat, dicitur *sensus*, siue *dolor gravis*, *βαρύς*, aut *granitatis*, ibid. cap. 4. qualis sit calculo maiore in parte renam carnosa, impacto, aut ea phlegmonem patiente; similiter & iccinoris parte carnosa inflammata. Accidit & capiti, humorumque copiam simpliciter significat. *Οξύς* acutus est, & pungens, finitimus punctorio, cum in cœu acu aut cerebro perforante, aut palo impacto, pars diuelli videtur, ut crassum intestinum in colico dolore Gal. à pituita vitrea facto, & in quibusdam cephalæis, & à calculo præcipue inæquali, acuto. Si autem partes inflammatae sunt vnico doloris modo vexantur, sensu, *σπασμωδῆς*, siue extensionis. Qui vel. ò. l. membranæ sit, ipsius effectus veluti radice, eo loco fixa, vbi membrana pungitur, qualis est in morbo laterali, *dolor punctorius* *σφυγματοίων* dicitur, ibid. cap. 5. Si nervis ipsius primo accidat dicitur *dolor νευρωδῆς*, *stupidus*, 2. de loc. affect. cap. 2. Quod si in lateribus spiritus quidam flatuosus procreatur, qui tum extenuatus, tum discussus, dolorem sedat, deinde rursus procreatus alter, dolorem augeat, *dolor ἀπάλος*, *rarus* dicitur, com. 1. in 1. prorrh. 22. Dolores autem *ulcerosos*, tum Medici, tum Gymnastæ, vocant eos, per quos, inter mouendum, vel tangendum lassatas partes, sensus veluti ulceratarum partium

tum ἐλαώδης, percipi solet, 2. de loc. aff. 7.

Dorsum, quod Græci Νῶτον καὶ Ἀντιστήθον, & Μετάσθρον appellant; est omnium vertebrarum, quos *Spondylos* vocant, compactarum basis velut & fundamentum. Nonnulli tamen ex recentioribus Medicis, non totam vertebrarum structionem, *Spinam* appellandam censent, sed circa thoracem tantum, & lumbos, non circa collum, 3. de art. 1. Arist. verò, de hist. animal. *Dorsum* dicit esse totam posteriorem corporis partem, ab occipite usque ad extremum Coccygem, triginta quatuor vertebris (si modo ossis sacri partes vertebris annumerentur) compactam: quod *Dorsum* conficiunt, Collum, Thorax, Lumbi, Os sacrum, & Coccyx, in quo costæ, velut in carina trabes, connectuntur, totumque corpus stabiliunt. Sed aliter Gal. lib. de ossib. cap. 7. his verbis: *Spina* est tota connexio, viginti & quatuor vertebrarum, a Capite usque ad Os sacrum, ita ut septem primæ a Capite vertebræ Collum, siue Cervicem constituent; decem quæ sequuntur, *Dorsum*, cui a parte anteriori respondet pectus, quinque reliqui lumbos; Os, in quod omnes vertebræ finiuntur, *sacrum*, vel *laturum* dicitur, siue etiam *Os magnum*, 12. de usu part. c. 12. vide *Spina*.

Dothein, Δοθῖν, id est, *Furunculus*, 2. meth. 2. Id nomen, ait Gal. nec locum aff. ctum repræsentat, nec causam, quæ ipsum efficit. Significat autem tumorem ἀποστήματῳ δὴ, ex crassishumoribus in carnis pierumq. parvis consistentem; mitem quidem, cum solam cutem occupat, sed pernicacem ac malignum, ubi subter actis radicibus erumpit. vide *Furunculus*.

Dracunculus. Δρακὼν, est vlcus partis propinquæ,

ipsius

ipſius nervi dilatationis, ſic dictum, quod nervus mouēdo corpori deſtinatus, in id vlcus recedat, in eoq; quali occultetur, lib. ſinit. Aerius ex Leonida, *Dracunculum* Lumbrico ſimilem eſſe dicit, interdum magnum, alias parvum reperiri, & frequētius quidem in cruribus: aliquando verò & in brachiorū muſculis oriri, & conſiſtere: naſci autem in *Æthiopia* atque *India*, maxime pueris, lumbricis latis non abſimilem, moveriq; ſub cute ſine moleſtia, ſed temporis progreſſu circa *Dracunculi* extremitatem ſuppurationem fieri, cuteque aperta, *Dracunculum* caput exerere. Quem ſi quis tentet attrahere, dolorem ingentem moveri, præſertim ſi eum abrupti contigerit: quod enim intus relinquitur, acerbiffimos dolores excitare: proinde vt ne intrò animal reurrat, valido filo brachium conſtringi oportere, ſi que quotidie agendum eſſe, ut *Dracunculus* paulatim progrediens, integer excludatur. Verùm *Soranus*, vt refert ex eo *Paulus Ægineta*, non exiſtimat animal eſſe, ſed nervioſam quandam ſubitantiam, quæ opinionem moruſ ſolū præbeat: Sed quid reuera ſit, nemo Medicorum explicare poteſt, qui *Europam* incolunt: poſſe tamen animal eſſe, ratio nobis dictat, cū non modò in ventriculo atque inteſtinis creari, verū etiam ex cute erumpere, tum pediculos, tum maiora quandoque animalia, compertiſſimum habeamus ex hiſtoriis.

Drimea medicamenta, ideſt, *Acria*, quæ cacoethiam humorum extinguunt, libr. de dynam. in proœmio, *Apium*, acre, id dicitur, quòd linguam morder, & cum multa caliditate erodit: Sunt enim omnia acria valde calida, & tenuium partium: proinde vehementer calefaciunt, incidunt, digerunt, aperiunt, purgant, irritant, atque ad excretionem impellant. *Apium*, acrimonia,

qualitas est gustatilis, in eadem facultatibus prædita.

Dropax, Δρῶπαξ, si medicamenti forma quædam; interdum liquida oris, in modum malagmatis, interdum siccoris, in plastris modo, prout usus exigit; cuius materia eadem est, quæ Acopis, & Emplastris debetur. Est autem *Dropax* duplex, simplex alius, qui & *ἑπιδρωσικὴ* hoc est, *Picatio*, appellatur, sola pice arida, oleo liquata constans: quæ dum calet, cuti illinitur, & præteritis locis agglutinatur, & antequam omnino refrigeret, auellitur; deinde rursus ad ignem calfacta reponitur, & similiter priusquam frigescat, auellitur, & tertio quartoque vel sæpius etiam id repetitur. Conuenit frequentibus vomitionibus, & cruditatibus, & cæliacis affectionibus, & reliquis partibus alimentum non sentientibus. Maxime verò ante synapismum adhibetur ad corporis præparationem, & post synapismum etiam, ut reliquæ morbi euellantur. *Dropax* verò compositus est, cui præterea adiiciuntur alia ad diuersus usus; ut ad excitandum calorem, Piper, Pyrethrum, Semen rosmarini, Bitumen: ad desiccandum verò, Sulphur viuum, Sal, Cinis sarmentorum; ad lancinandum verò, Limbeckis, quæ & Adarce vocatur, aut Euphorbium. Hæc enim trita, liquefactæ pici insperguntur, aut alia etiam eiusdem facultatis. Si vires ægri imbecillæ sint, liquidior fieri debet in formam malagmatis, & præradi pili in loco cui adhibebitur, & paulatim postea auelli. Sint valentes sint emplastri, modò præparandus est, & non derasis pilis admouendus, confertimque auellendus, nisi forte capiti aut mento, aut pubi applicandus esset. Sic enim plus habet efficacis, spiritumque remissum magis firmare potest, & ad superficiem magis reuocare, humo-

relque

resque attrahere, ac discutere. Sed & medicamenta depilatoria. $\psi\iota\lambda\omega\delta\rho\alpha$ propriè dicta, *Dropaces* appellantur, ut constat ex versibus Martialis, lib. 10.

Lævis Dropice, tu quotidiano,

Hirsutis ego cruribus genuque.

Fortè quod sola pice constarent in oleo liquata, ut & *Dropaces*.

Duodenum, vide *Dodecadactylon*.

Dura mater, vide *Membrana dura*.

Dura ulcera, quæ Græci $\delta\chi\theta\acute{\alpha}\delta\eta$, id est, *Verruca ulceræ*, vocant, sunt, quæ callum contraxerunt, & præturtidas ac duras oras habent, 4. de compos. medic. per gener. cap. 12.

Durum, $\sigma\chi\lambda\epsilon\rho\upsilon$, Medicis est, quod repletionè largo, & superfluo humore, aut vapore, in partem aliquam affluente, tactui renititur, nec cedit spontè (aliter ac Philosophis) & propterea quod ita durum est, propriè, $\alpha\nu\tau\iota\tau\omicron\pi\omicron\nu$, hos est, *renitens*, appellatur.

Durus pulsus, vide *Mollis*.

Dysæsthesia, id est, sensus difficultas, est vitium actionis sensitivæ, diminutæ, lib. de symptom. diff. c. 2. $\delta\upsilon\sigma\alpha\iota\sigma\eta\varsigma$, sed $\delta\upsilon\sigma\kappa\iota\nu\eta\varsigma$, non modo difficultatem motionis, sed etiam immobilitatem significat, ibid.

Dyscrasia, *Intemperies*, est mixtio inæqualis quatuor primarum qualitatum; ubi enim illæ ita coierint, ut earum pares sint vires & portiones, temperamentum emergit exquisitissimum, quod cæterorum omnium norma est; ab eo quodcumque desciscit, *Intemperies* dicitur; tunc enim aliqua qualitas exsuperet, necesse est; vel duæ. itaque cum quatuor sint ex quibus temperamentum illud exquisitissimum, & ut ita dicam,

temperatissimum absoluitur, singulorum excessu simplices quatuor intemperaturæ sunt, calida, frigida, humida, sicca: & totidem compositæ, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca. Nec verò singularum modus vnus est, & vna ratio, sed immensa omnino latitudo, adeo vt intemperaturarum infinitæ prope modum habeantur differentiæ. Nec tamen omnes eiusmodi intemperies morbosæ sunt, sed plurimæ contrasalubres, quæ videlicet intra limites sanitatis cōsistunt. Quin enim omnis actio a partis temperamento proficiscatur, & varij prorsus generis actiones esse oporteat, multiplices quoque temperaturas esse oportuit, quæ non simplici. et sed ad iustitiam temperamenta appelliantur. Non aliud autem ad iustitiam significat, quàm prout cuique parti expedit. Itaque in singulis partibus primarum qualitatum etiam inæqualis initio, quoniam secundum naturam est, non dicitur intemperies, etiam si reuera intemperies sit, sed temperamentum quamdiu scilicet naturæ modum non excedit: cùm vero excedit planè absoluteque, intemperies est, & iam morbus aut morbi causa euadit. Est & præter istas alia intemperiei differentia, per quam æqualis aut inæqualis dicitur. Æqualis quidem est, quæ in omnibus intemperanter affecti corporis partibus æqualiter solaque inest. Ea enim ita inducitur, & occupat corpus, vt depulsa naturali temperie sola in corpore dominetur: neque enim ea in fieri est, vt aiunt, sed in facto esse. Itaque in habitum transit, & euadit, veluti altera natura acquisita, & priori contraria, neque villo dolore molesta est. Eiusmodi intemperies in febre hæctica esse perhibetur. Sicut autem in toto corpore, sic & in vna certa parte corporis contrahi potest Intemperies verò inæqualis dicitur, cùm idem corpus simul & calidius, & frigidius, aut

humidius, simulque siccius quam pro naturali habitu redditur. Ea in fieri est, eamque ob rem dolore non vacat, & alias in toto animalis corpore fit, alias in vna, qualibet parte, idque vel cum fluxione, vel absque materie affluxu, Galen. dicitur etiam inaequalis intemperies, quando singulae corporis partes non sunt similiter intemperatae, sed varias sortitae sunt intemperaturas. Cumque corpus totum intemperatum sit, non tamen vnica intemperies dominatur in toto corpore, sed plures in singulis partibus.

Dysenteria, vide *Difficultas intestinorum*.

Dyspeplata, vide *Cacoethe*.

Dyspathia, hoc est, ad patiendum difficultas, i. de usu part. cap. 15.

Dyspepsia, est deprauata alimenti concoctio, siue alimenti corruptela. Symptoma est actionis naturalis coctricis deprauatae: quam libuit eo nomine appellare, sicut debilem *βραδυψυχία*, prorsusque abolitam *ἀψυχία*; deprauatur autem cum alimenta in qualitate a natura alienam alterantur. Ea gemina statuitur, *πικρὰ καὶ ὀξυὰ*, hoc est, nitrosa & acida: haec turgidis, illa calidis de causis prouenit, vide *Concoctio*.

Dysphonia, id est, vocis difficultas, vt *Aphonia*, cuiusdem abolitio; de sympt. differ. cap. 3.

Dyspnoea, difficultas spirandi, vel inordinata spiratio, 2. meth. 2 & 1. de diff. respir. c. 1. *Δύσπνοια*, symptoma est laesae respirationis, commune orthopnoicis, pleuriticis, peripneumonicis, synanchicis, & aliis plerisque malè affectis, à quo agri *δυσπνοῖοι* appellantur.

Dystherapenta ulcera, id est, curandi difficilia, 6. de comp. med. per gen. cap. 1.

Dystichia, est alterius pilorum ordinis in genere mar-

ginæ exortus, præter naturam, libr. finit.

Dysbemia, id est, *maestitia melancholica*, siue animi maror, 6. de loc. aff. cap. 1.

Dysuria, *δυσουρία*, est urinae vel difficilis saltem & debilis, vel cum dolore solo, siue dolorosa simul & languida excretio. 7. aphor. 48. Huius quæ cum dolore fit, causas recenset Gal. inflammationem, abscessum, exulcerationem, inæqualem intemperiem, & spiritum flatulentum. Illius verò quæ cum difficultate, aut facultatis imbecillitatem, aut tumorem præter naturam. Ab his enim causis fit, ut cum mejere æger cupiat, non statim urinae excretio sequatur, sed magno cum conatu, atque etiam aliquando dolore. His autem duobus exceptis symptomatis urina naturalem excretionis modum servat, neque intercisè fluens, neque guttatim, neque maturius, quàm naturæ conveniat; vide *Ischuria*.

Dytrichiſis oculi morbus est, cum pilis naturalibus alijs subnascentes, ipsum pungunt, fluoremq; concitant, libr. Introd. cap. 15.

E

ECBOLIA, *Εκβολικά*, *Pharmaca*, id est, abortiva medicamenta, quæ abortum faciunt, quæ & *φθίρτα* appellantur; eadem & fœtus demortuos extrahunt, vide *Abortus*.

Eccathartica, quæ & *Eiphraſtica*, vide *Rhyptica*.

Ecclymoma; Græcè *Εκχύμωμα* ἢ *Εκχύμωσις*, id est, sugillatio, est affectio circa cutem, cum, tenuibus in ipsa venis contusis, sanguis per fissuras affunditur, nondum in grumos coactus, sed postquam per persul-

tationem,

rationem, i. e. Diapedesin, effusio ipsa facta est; contingit sanè aliquando, vbi ita coierit temporis progressu eundem liuescere, & denigrari, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine, coactis, de comp. med. loc. c. 1. & 4. meth. 1. Eandè vocat *Ecchymosin* solutionem continuitatis cum contusione, & ruptione coniunctam. Generatim verò Hip. solutus est vocare *Ecchymeses*, ex vasculis sanguinis effusiones & inanitiones, & alio nomine *γανσίωσιν*, com. 2. in 9. de morb. vulg. 9. quæ effusio, in phlegmone quoque sit à causa interna, vbi sanguis è vasis effunditur, & tumor excitatur, tactu mollis & cedens; distinguit tamen Gal. 6. apho. 20. *Phlegmonem* ab *Ecchymosi*, quòd in Phlegmone sanguis per musculorum cavitates, sola ratione contemplabiles secundum minimas sui partes effunditur; In *Ecchymosi* verò in spatia effluit, quæ venis adjacent. Species Ecchymomatosis sunt, *Hypopion*, & *Hyposphagma*, ὑπόπιον καὶ ὑπόσφαγμα, & sanguinis ad ungues concursus ex plaga. Atque id quidem propriè significat *ἐκχόμωσις*, vide *Vnionis solutio*.

Eccope, ἐκκοπή: *Excisio*, diuisio est Caluariæ, qua os offensum re tractum est, libr. finit. Inde *ἑκκοπηρωτικά* medicamenta imbecillia sunt, quæ mouendi tantum stercoreis, & ea, quæ in spatiis intestinorum primæque regionis viis continentur; dejiciendi vim habent, non etiam ex alto attrahendi, & humores euacuandi. In eo genere Galenus Aloen collocavit. Dicuntur ἀπὸ τοῦ χρόου.

Eclegma (Græcis ἐκλειγμά, ἡ ὀκλείκτορ φάρμακον) medicamentum est per se putum euacuans, quæ in fau-

cium partibus, Phlegimone obsessis, vti etiam in aliis partibus spiritalibus, continentur, 4. de rat. vict. 20. ori enim inditum, sensim liquefeit, & deglutitur ad pectoris. & pulmonis vitia; quod & alio nomine vocatur *Arteriacum*, ἀρτηριακόν, diciturque ἀπό τοῦ λή-
 χης, id est, a *lingendo*, Arab. s. vocant *Looch*, Paulus vero, lib. 4. c. 57. nomen hoc tribuit medicamentis, quæ deuorantur ad lumbricos necandos, vide. *Arteriace*.

Ecphraxis, id est, *pororum apertio, & reclusio*, 1. method. cap. 13. Inde ἐκφρακτικά medicamenta vocantur quæcunque obturatione & obstructione ægrantes liberant; facultate nitrosa, & amara; opposita emplasticis medicamentis, quorum est meatus obducere, & obturare, 4. de compos. med. loc. cap. 1. quæ dicuntur alio nomine *Eccathartica*, ἐκκαθαρτικά.

Ecphysis, id est, *exortus*, seu *processus* alicuius ossis, vel intestini, vel visceris, 2. de anatom. adm. cap. 5. sed sine adiectione prolata. Ecphysis est illud spatium, quod est medium inter intestinum ieiunum, & fundum ventriculi, carens circumuolutione, lib. 1. de usu part. capit. 3. Sunt vero & qui non totum eum processum, ἐκφυσιν appellandum censent, sed ipsius tantum orticium, quo dependet à ventriculo. Cæterum ad hoc intestinum meatus deferitur, qui bilem ipsam ex hepate in ipsam dimittit. In osse autem dicitur idem quod ἀπὸ φυσεῖς vide *Dodecadaſtalyon*.

Ecphyseſis *Efflatio*, siue *Exsufflatio*, siue est expiratio copiosissima a ris confertim tacta, 2. de motu muscul. Græcis ἐκφυσεῖς ἢ ἀπὸ τοῦ πνέματος ἐξωφεῖς; Eius opifices sunt musculi omnes intus inter costas siti, adiuti etiam iis, qui ad thoracem perueniunt ex scapulis & dorſo,

dorso, atque aliis etiam magnis, qui in Epigastrio habentur: effractionis enim gratia coactos esse, Galenus docuit, lib. 4. de usu part. Propria est vocis materia, neque vox citra eam fieri potest: differt a simplici expiratione, tum voluntia, tum musculis, a quibus efficitur, 2. de usu part. nam & paulatim exspiratio fit a solo septo transverso, 4. de loc. aff.

Eplexio, est subitus & vehemens timor *ἐκπληξίς*, cuius oppositū *Pericharia* dicitur, *περιχάρειαν* Graeci vocant, quasi *excessum gaudij* dixeris: Scimus autem amorum occasione, plures sub eo periisse, 12. meth. cap. 5. Multi Syderationem & Tabem interpretantur, Galien. com. aph. 1. 4. lib. 7. *ἐκπληξίς* enim scripsit, cum quis ex morbo nec loquitur, nec quicquam agit, sed apertis oculis quietus manet, veluti præ timore attonitus, quo loco obitupescentia ab Interprete vertitur.

Ecpyema, *ἐκπίεσμα*, calvariæ in multas partes diffraction, simul ubi intrusæ ossis partes in imum decubuerint; ac meningem membranam innixu suo premant, lib. finit. Est, inquit, affectio, in quam profundiūs fracta ossicula descendunt, & membranam Cerebri comprimunt. Significat & *ἐκπίεσμα* apud Medicos rei cuiusque retrimentū, quod expresso ab ea succo superest, nec in tantum, sed etiam ædum numero succū ipsum; ut cum dicitur *μυροβλάνου ἐκπίεσμα*, siue quod in eo est *μυροβλάνου πίεσμα*, quod & *ἀποθλίμμα* & *μάτμα* appellatur. Sumitur in ea significatione apud Diosc. li. 4. de glande vnguentaria: Vnde *Ecpyemus*, *ἐκπίεσμός*, est totius oculi prolapsus extra suā cavitatē, ut prominens appareat. Differt a *Proptosi*, *ἀπὸ τῷ προπτώσεως*, hoc est, a proidentia, quod in hac vena tantum tunitur,

ca, in illà totus oculus foras erumpat, præsertim iis, qui strangulatur, Athleticis, & fœminis, quæ præ dolore partus uehementius distenduntur, aut fluxionibus à capite in oculos tentantur. Auicenna, oculi exitum & egressionem vocat. Id malum intellexit Celsus, cùm ait, nonnunquam ingentem inflammationem tanto impetu erumpere, ut oculos sua sede propellat:

Erysima ἐπύημα, dicitur ab Hippocr. copiosissimi puris collectio, tumore aliquo, p.n. phlegmono'o, pleuræ cum primis suppuratio, & hinc cœcoctio, *ἐκπύημα*, ad suppurationem producere significat.

Ecrhythmus pulsus, est Pulsus Arrhythmus, qui nullius ætatis, naturæ temporis aut reliquorum rhythmum retinet, vel, ut ait Paulus, qui omnem prorsus Euthythmiam euertit. Tertia species est pulsus Arrhæthmi, 1. de diff. puls. cap. 9.

Ecstasim melancholicam, mentis motionem, aberrationemque intelligimus uehementem, & ferinam, quæ irrigante Cerebrum affata flaua bile oritur, comm. 1. in prorrh. 14 Vigiliis habet coniunctas, atque ideocomati contrariam esse, Galenus scribit. Ea non est, quam plerique interpretantur, abstractionem mentis à corpore, ad contemplanda cœlestia, quam alio nomine *ἀναγαγὴν* appellant; hæc enim morbus non est. *ἰσστατικὴ δύναμις* dicitur facultas, quæ vim habet ab alienandi animum, qualis est in Hyoscyamo, Coryandro viridi, & Ephemero.

Ecthyma, est exulceratio, quæ in summa cute ex compressione violenta nascitur, 2. de fractur. Græcè item *ἐκθύμα* dicitur.

Ecthymata, ἐκθήματα, cutis velut efflorescentiæ,

pabulæ sunt per summā cutē erūpentes, ab humoribus superfluis, falsis, & tenuibus, idēd in cute leuiter exuberant quōd tenues humores exulcerationem potius, quam tumorem insignem procreent. Dicuntur & alio nomine Græcè *ἔκχυματα*, eius generis sūt, cūn quæ per febres ardentes exiunt in *Variola* vulgō dictæ, & *Morbilli*. Sic autem dicuntur ἀπὸ τοῦ ἐκχύναι, quōd significat ἐξομάν, hoc est, impetu ferri, & erumpere.

Ectrophia, ἑκτροφίς, *luxatio*, hoc est, ossium à proprii sede amotio, & auulsiō, citra fractiōnem, nec verō id modō significat, sed ἑκτροφισμός, siue ἑκτροφίς, apud Hippocratem, vt notat Galenus, vt initio libri de art. culis; cuius luxationis causa alia est externa, id est, vis omnis quæ articulum loco dimouere potest; alia interna, estque humoris defluxio articulum præcopia, vel molliue loco propellentis. Est autem duplex omnis luxationis differentia; vna sursum, cūn à musculorum contentione articulus ad supernum locum trahitur; altera extrorsum, cūn in partem anteriorem aut posteriorem, dextram aut sinistram emotus transit. Omnis autem eiusmodi luxatio, aut simplex est, aut composita. Simplex quidem est, cūn luxationi nihil insuper accessit, non vlcus, non ossis denudatio aut fractio. Composita verō est, cūn præter luxationem aliquid eorum accessit.

Ectropion, est suppullulatio carnis in gena, quæ genam ipsam sua grauitate foras conuertit. Causa est genæ evertendæ, vel caro adnascens, vel resolutio, vel cūn cicatrix inducitur, lib. finit. Sed alibi Ectropion, inquit, est inuersio, palpebrarum vitium, cum exulceratis oculis, plus extra feruntur, lib. Introd. cap. 15. Est etiam affectus solius inferioris palpebræ oculum con-

regentis,

tegentis, ita inuersæ, & retractæ deorsum, vt parum sursum attollatur, sed pendeat, & hiet, neque ex toto oculum integat. Quod vitium, si palpebræ superiori acciderit, *λαγώφθαλμον* dicitur, quod vitium naturaliter contingere potest, *Εκτροπion* verò non nisi à causa præter naturam, a cicatrice, carnis excresecientia, relaxatione, medicamento, sutura vel visione inartificiola, vel à senectute summa de pender.

Εκτροσμος, apud Aristot. 7. de hist. animal. sunt abortus, & imperfectiorum foetum corruptionis infra diem quadragesimum factæ; quæ verò intra septimum diem fiunt, non *οκτρωπιοῦς*, seu *abortiones*, sed *ἐκφύσεις*, idest, *effluxiones*, vocat idem Philosophus.

Εκχέματα, sunt pustulæ ardentes, & feruidæ, dolorem cientes, citra sanietem: ingens enim feruor, omnem materiam absument, Græcis *ἐκχέματα* & *ἐκχέσματα*, & Latinis *Carbones*.

Efflationes, sunt magnæ, & vehementes spiritus expulsiões, quæ per eadem instrumenta fiunt, per quæ iussis, & tuſſiendo efficiuntur, quæ & *efflatus* dicuntur ab expiratione, quæ sine strepitu fit, copia & velocitate motus differentes, 2. de motu muscul. cap. 8. & 1. de sympt. caus. cap. 4. vide *Ecphyseſis*.

Efflorationes, sunt ulcerationes factæ in superficie & corporis ambitu, lubrubræ, & asperæ, de medic. fac. part. cap. 5. quas, si noctu enascantur, *Epinyctidas* vocant, lib. de tumor. cap. 15. & 2. meth. 2. quas Celsus vocat pustulas pessimas, colore lubliuidas, & subnigras, aibas, suo humori similes, magnitudine fabam non superantes, cum vehementi inflammatione, & dolore, ex quibus ad apertis sanies effluit, & exulceratio mucosa, intus retenta. Paulus, & Aëtius, dicunt esse vicuscula

sponte

iponte nascentia, ptyctenis similia, subrubra, ex quibus
 cruenta sanies effluit, utrumque verum est, & pustulas,
 & vircuscula esse.

Effulgescentia, quas Græci *ἐπιλάμψιας* vocant
 Hippocr. præsertim, significant morbum puerorum,
 proprium, aut certe per quam familiarissimum, id est,
 Epilepsiam, committunt. In 6. de morb. vulg. 5. Nonnulli
 hoc nomen interpretantur mutationem temperamenti
 ad calidius & siccus, hoc enim ætatis progressu velut
 flamma effulget. Alii vero interpretantur corporum
 perfectionem, quod iuvenes per ætatem evadant car-
 nassiores, magis adulti, cō ore formæque gratiores, &
 viribus ingenioque præstantiores, ut quodammodo
 fulgere videantur. Verum lib 9 τ *ἐπίδημ*, alii non

ἐπιλάμψιας, sed *ἐπιλήψιας* scribunt, aut *ἐπιλάμ-
 ψιας ἀντὶ τ' ἐπιλήψεων* interpretantur, ut annotat
 alii eum librum.

Effusio, vide *Confusio*.

Effusa, & *Nigrores* sunt, sanguine à venis effuso sub
 æm, nunc per tunicas contusas, nunc verò in finibus
 feratas, lib. de tumor. cap. 10.

Elcos, Latini *Vlcus*, solutio cōtinnuitatis est in om-
 bus corporis partibus, (præterquam in solo osse) ab
 tera causa humore scilicet vitioso, acri, & eroden-
 , particulæ, cui incumbit, cōtinnuitatem (siue ea caro
 , siue cutis, siue cartilago, siue membrana) solvens
 autem vitii, vut in os incidit, *τερηδών*, siue *Caries* ap-
 ellatur. Aliquando verò Hippocr. vlceris nomen ad
 nntin morbum dolorificum extendit, cōtinnui solu-
 nem eo nomine significans. Neq; enim ut arbitror,
 dita adhuc fuerant nomina θ *αἵματος* *ρήγματος*,

θ *λά*.

Ἰλασεως, ῥωγμης, ῥιξεως, & reliqua quibus recentiores Medici solutæ continuitatis differentias distinxerunt.

Elementa, στοιχία Græcis, apud Medicos sunt calidum, frigidum, humidum, siccum, ex quibus homo primis velut & simplicibus, minimisque ex corporibus est constitutus; & in quæ ultima apparentia, & simplicissima, ac minima, resolutionem cap. lib. finit, Adhuc *elementum* appellatur minima pars eius rei, cuius est elementum; omnium autem corporum, quæ gignuntur, & corrumpuntur, quatuor sunt Elementa; Ignis, Aer, Aqua, Terra; ut minimum intelligatur id, quod minime diuisionem suscipere potest, 8. de placit. cap. 2.

Elephas, (qui & *Elephantiasis* dicitur) morbus est, in quo naturalis faciei figura mutatur, resinatur nasus, labra crassa fiunt, extenuantur aures ad Satyrorum effigiem, libr. de caus. morb. cap. 7. ex sanguine melancholico primam generationem habens, quam affectionem cum incipit, *σατυριατις* nominant, tum a genarum rubore, & facie Satyris persimilitum propter in explebilem & impudentem coeundi libidinem. Aliqui verò ossæas eminentias, quæ in temporibus fiunt, sic vocant. In aliis autem partibus quoque fiunt tales ossium eminentiæ, quas *exostoses* vocant, libr. de tumor. cap. 14. *ἑλεφας καὶ ἑλεφαντίασις*, vniuersi corporis cancer est, qui nullam omnino admittat curationem. Id nominis nactum est hoc malum, quod in eo cutis corio Elephantis persimilis videatur; nam maculis quibusdam ad atrium colorem vergentibus inficitur, atque inæqualiter aspera crassa, ac veluti squamis scæda, luens, farinaque redditur; Nec Elaphas quidquam (apud aliquos) à Lepra Arabum differt. Vocarunt & Veteres morbum hunc

hunc *ἥρακλειον*, hoc est, *Herculeum*, quod nullus eo maior sit, & violentior. Nam morbo ingrauescente, primum quidem stupet cutis, deinde sensum prorsus amittit, ut ne acu quidem compuncti dolorem sentiant, aut fervente aqua affusa vrantur.

Elminthes, *ἐλμινθες*, *lumbrici*, animalia sunt in humano corpore genita, cum primis in intestinis, siue in auribus, siue in vesica, siue in ventriculo, interdum etiam in sordibus ulceribus, quos Græci *σκώληκες* vocant; sunt autem trium generum; primi generis sunt *teretes*, seu *rotundi*, a figura, quæ est secundum crassitudinem, longitudine aliquando palmares, sæpè longiores, quos vocant *ἐλμινθας στρογγύλας*, in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & ventriculum subeunt, ideòque sæpè per os ejiciuntur, quibusdam è naribus redduntur, ut plurimum consistunt cum febricula, atque hoc genus pueris infantibus, & puberibus peculiare est. Alterius generis sunt, qui *lati* vocantur, *ἐλμινθα πλατείαν*, aliquando *χειρίας*, hoc est, *Insticis*, a similitudine, quam cum *Insticis* obtinent; instar enim harum lati sunt, & longi, aliquando *ταυνίας*, idest, *fascias*, vocant, quod fasciarum effigiem sua latitudine, & longitudine, referant. Plinius lib. i i. cap. 33. tradit tricenum pedum tænias ventris aliquando visas, interdum plurium. Tertiij generis lumbrici sunt, qui *Ascarides* nuncupantur, breves ac tenues, parvis vermibus similes, qui in extremo intestino reperiuntur, & musculi sphincteris initio, qui glomeratim in multas phalanges compacti, per sedem dejiciuntur. Omnes lumbrici in intestinis nascuntur ex crassa lentaque pituita frequentibus cruditatibus collecta. Animantur

autem à plurimo calore natiuo : Itaque pueri quam-
adulti lumbricis sunt, magis obnoxij.

Elythroides membrana, quæ & *Erythroides*;
ἐρυθροειδής dicitur, testium est tunica; & vasorum sper-
maticorum, vbi extra ventrem processere : quamdiu
enim intra ventrem sunt, eorum tunica, quod illic nihil
habeat eximium, nullo proprio donatur nomine : po-
steaquam verò extra ventrem processit, quia rubet,
ἐρυθροειδής incipit appellari. Rubet autem tum à calo-
re rubro muscoli testium gracilis, tum à vasis multis
quibus implexa est, Vaginalis etiam dicta, 2. de semin.
cap. 5. qua tunica, (vt & scroto) foeminarum testes ca-
rent. vel tam exigua est & obscura, vt oculis videri non
possit, lib. de vuluæ, diss. cap. 9.

Embroche, Græcis *ἐμβροχή* ἢ *ἐμβρισμα*, medicā-
menti genus est; cum locis affectis, liquore aliquo hu-
mectatis, perfusisque, lanam deinceps aut linteum, eo-
dem liquore imbutum imponimus, imbecillius cata-
plasmate. Sed tamen vbi commodè aptari id non potest,
vt in capite, ibi ἢ *ἐμβροχή* aptè adhibetur, & illis simi-
liter qui propter imbecillitatem ferre non possunt ca-
taplasmatum grauitatem : item præcordiis inflamma-
tis, per initia morborum, quo tempore intempestiuus
eui cataplasmatum vsus: præterea fracturis & contusio-
nibus, cum Emplasticeis vti non licet.

Embryon, est animal vtero gestatum, 6. de vsu part.
cap. 13. licet non antea *Embryon* dici debeat, quam duos
menses in vtero absoluerit. vide *Cyema*.

Emmota, *ἐμμοτα*, medicamenta, id est, linamenta.
sunt humidæ consistentiæ, similia iis, quæ linamentis,
vel linteolis excipiuntur, cerati specie, 13. method. 5.
Emmotes verò vocat Hippocrates eos, qui vlcus ca-

num & exesum contraxerunt ex suppuratione, quod curationem per linamenta desideraret, 3. artic. 55. sic dicuntur, quod ἐν τοῖς μοτοῖς adhibeantur. Ipsa enim linimenta μοτοὶ καὶ μοτα appellantur.

Emollientia, vide *Chalastica*.

Emphraxis, ἐμφραξις, *Obstructio*, est meatuum, aut cavitationum naturalium stipatio, est copia, vel vitiosa qualitate (ut lentore, & crassitie) succorum proveniens, cuius species Gal. 12. method. ponit στρίγνωσιν, & πύκνωσιν. Vnde medicamentum quod suo lentore obstruit ἐμωλαστικόν: huic contrarium est medicamentum ἐμφρακτικόν, quod obstructione libetat, 5. sim. pl. 12. Est autem Obstructio, morbus organicus, pertinetque ad formam organicæ partis corruptam, amissis videlicet meatibus aut cavitationibus parti alicui debitis, vel propter succorum abundantiam, vel propter vitiosam qualitatem, quod ij nimium lenti vel crassi sint. Hæ enim duæ esse possunt obstructionis causæ, quæ morbus est instrumentalis eorum quæ obstructa sunt corporum. Hanc symptomata multa consequuntur, & maximè quidem ipsa transpirationis retentio, atq; rursus putredo, aliorum morborum antecedens quædam causa. vide *Rhyrcita*.

Empirici sunt, (Græcè ἐμπειρικοί) qui à sola experientiarum notitia procedunt, nomine ab ἐμπειρία, hoc est, experientia sola deducto, lib. de sect. cap. 1. unde *Empirica medicorum secta*, accidentium concursus, qui ægris accidunt, respicit, illorumque curationem ab experientia sola deducit, idque nec morbo, nec causa cognita, in Introd. cap. 3. Illius Sectæ primus author Heracleion extitit, qui naturæ cognitionem rationa-

lemque disciplinam nihil ad medicinam pertinere professus, in usu & experimentis eam posuit. Quem Apollodorus & Glaucias, & aliquantò post Heraclides Tarrentinus & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione τὸ ἐμπειρικοῦς appellarunt. Erant autem τὸ ἐμπειρικῆς generatim, περὶ πτωτικῶν, αὐτοχέιδων, & μιμητικῶν. Primum quidem dicebatur cùm aliquis experiretur, in quod fortè fortuna nihil tale cogitantes incidissent. Secundum, cùm ad alicuius rei experientiam dedita opera venirent, siue per somnia, siue aliter admoniti. Tertium verò, cùm ea quæ profunt vel nocent, siue natura, siue fortuna, siue aliquo consilio, in morbis iisdem experirentur, alios qui eadem prius experti essent, imitantes. Quicquid autem iuuat aut nocet, hoc est, caularum omne genus, dicebant, vel naturale vel fortuitum esse, vocantes naturale quod casu fieret, neque haberet manifestam causam; fortuitum verò, quòd sine electione quidem nostra fieret, sed euidenter causam haberet. Tribus autem his theorematibus utebantur, τὴν ῥῆσιν, ἱστορίαν, τὴν τοῦ ὁμοίου μεταβασιν. Appellabant τὴν ῥῆσιν, quicquid aliquando obseruarent, quorum cùm magnam habebant copiam, eam omnem ἀπορίσκει nuncupabant, atque id rursus αὐτοψία, quæ est eorum memoria, quæ frequenter & eodem modo visa sunt, quæ cùm didicissent, ἱστορίαν appellabant. Qua iam re diligenter considerabant quæcunque simul acciderent symptomata, eorumque omnium obseruationem συνδρομὴν appellabant, hoc est, concursam & congeriem symptomatum omnium, quæ in affecto essent loco. Quod si in morbos nondum visos incidissent, aut eo loci essent, ubi inuentorum remedium

facultas

facultas non suppeteret, transibant ad consimile, quòd
 μιτάβασιν τοῦ ὁμοίου vocabant; eamque triplicem fa-
 ciebant, de affectu in affectum, de loco ad locum, de re-
 medio ad remedium. Eam autem observationem quam
 per illam τοῦ ὁμοίου μιτάβασιν habebent, πείραν
 πριβικὴν appellabant.

Emphysema, Inflatio, quæ Græcis ἐμφύσιμα, ἐμπνευ-
 μάτωσις, καὶ πνευμάτωσις, est spiritus flatuosi colle-
 ctio, in inanibus corporis partibus. Eius principium,
 inquit Gal. male concoctus cibus est, a calore videlicet
 debili, & à quo flatus excitati, resolui nequeunt. Vide-
 fusè infra, *Physis*.

Emplastron, siue *Emplasticum*, ἐμπλαστικόν, Pharma-
 cum est, quòd meatus obducit, vt picatio, quæ imponi-
 tur pilis in totum abrasis, i. de comp. med. loc. c. i. Atq;
 hoc pharmacorum emplasticorum genus, substantia
 terrestre est, citra refrigerationem, aut caliditatem ma-
 nifestam, aut in primo ordine refrigerantium, vel cale-
 facientium, 4. de comp. medic. loc. c. i. suntque sine mor-
 dicatione siccantia, 5. simp. c. 5. & li. 5. cap. 11. Duplex est
 Emplasticorum natura; altera exquisitè terrea, & sicca;
 altera tenax omnino: mista verò ex aqua, & terra, &
 plerumque etiam aere vt oleum dulce salis expers. Qui
 quoque album ex iisdem quodammodo mistum est, ma-
 gis tamen terreum est quàm oleum. Quin etiam ca-
 teosa lactis pars emplastica est, tenerque ac recens ca-
 teus, & suilla pinguedo, & cæteri quoque adipēs, qui
 nondum acrimoniam contraxerunt, roque magis quo
 sicciores magisque terrei fuerint. Eadem medicamen-
 ta etiam ἐμφρακτικά appellantur. His contraria sunt
 ἐμακαρτικά, quæ & ἐμφρακτικά vocant.

Emplattomena medicamenta vocant, quæ exiguis totius corporis meatibus hæretia, prohibent, ne quid per urinas, vel vniuersâ cu. im. isfletur, & effluat. 8. met. c. 2.

Empyæthotonos, vide *Distentio*.

Empyemata, quæ & *Dyapicmata*, ἐμπίματα, suppurantia omnia sunt; aliqui, cum in ulcere phlegmone in pus conuersa est, ταχυμα, id solum *Empyema* nominât, qui & sic affecti, *Empyos*; alij, eos solos *Empyos* dicunt, quibus inter Thoracem, & Pulmonem, Pus aggregatum est, lib. de tumor. c. 3. ἐμπύους, ἢ ἐμπύκτους Græci vocant, suppuratos, & purulentos, qui multum puris in capedine inter Thoracem, & Pulmonem collectum habent, 4. de caus. pull. c. 9. Tandem omnes quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est. Suppuratos vocant, vbi Pus vniuersum consisterit, concocto tumore quopiam præter naturam, com. 1. in 1. progn. 40. & 2. progn. 59. & 69 Symptoma est peripneumoniæ vel pleuritidis, si digeri vel per sputa vacuari nō potuit, succedit etiam interdum anginae, Hipp. aph. 10. lib. 5. Rupto namque internè abcessu, Pus in vacuum Thoracis locum effunditur, ibique fluctuationis cuiusdam sensum mouet, cum æger e latere in latus conuertitur, inde verò per occultos meatus in alium, intestina, vesicamq. subit, vel aliquando ad cutem erumpit, sibi que foras via vno aut pluribus vlcerebus aperit. Cæterum non semper inflammationi succedit empyema, quandoque nulla febre præcedente serosus aut pituitosus humor e reliquo corpore eo loci delapsus putrescit, & *Empyema* mouet, vt Aetius testatur.

Empyreuma, reliquæ sunt caloris febrilis post solutam accessionem. Dispositio quædam est neutra, mediæque inter febrem, & febris intermissionem, inter-

mittentium

mittentium & putridarum febrium propria, vt soluta
accesione supersit nonnihil caloris, vel in ipsis humori-
bus relictæ, vel adhuc solidis etiam partibus impressi-
quem aliqui *febris fomicem* appellât, huic contraria est
antipyretica, siue *infebricitatio*.

Emulgentes vena & arteria, quæ sint, hinc patet : Vena caua ubi ex hepate primum emergit, vicinis partibus prætenues impertit furculos; deinde ramum maximum in vtrumque renem subiectum mittit. Similiter, alia duo vasa æquæ magna à maxima arteria, quæ spinæ incumbit profecta, non aliter quam venæ in renes inferuntur, quæ *vena & arteria* vulgo *emulgentes* appellantur, per quas renes urinam à sanguine secernunt, & trahunt, simul etiam multum bilis, ac propemodum omnino, quod ipsæ continuerint, attrahunt, lib. de venar. diff. c. 5.

Enarthrosis, species est *Diarthroseos*, cum cavum recipientis ossis altum admodum est, caputque quod in id inferitur, oblongum, lib. de ossib. in procem. Eius pauca sunt exempla, ut cruris cum ilchio, & forte tali cum osse navis specie referente; vide *Arthroïda*.

Enamon, *ἐναιμον*, est medicamentum quod glutinat, 6. meth. 2. imponiturque maxime cruentis vulneribus sistendo sanguini, 1. de compos. medic. per gen. cap. 14. cum cruor, qui *αἷμα* dicitur, ex cute ipsa vulnerata, vel etiam ex carne in roris speciem distillat; atque ideo *& sanguinarium, & cruentis opitulans, & glutinatorium* dicitur, 3. de comp. med. per gen. cap. 2. His emplastris, inquit Celsus, nulla maiorem usum præstant; nam reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogat, atque illius impetum minuant: tum glutinant ulcera, & cicatricem iisdem iuducunt. Constant autem, inquit,

ex medicamentis non pinguibus, ideoque ἀλίπανα nominantur. Quæ enim huius generis sunt, siccare debent, & citra absterfionem leniter adstringere. Hæc maximè ex bitumine componuntur, cumq; varii sint generis; duo tamen habentur præstantissima, vnum βαρβαρον, alterum, κυζικηνόν appellatum. Hoc tamen paulò plus, quàm eruenta exsiccat, ideoq; nisi diluatur, nocet magis quam profit, contrahens membra, atque dolorem inducens. vide *Glutinatoriũ*, & *Sanguinarium*.

Enæorema, ἐναϊώρημα, quod & *Appendiculum* quidam vocant, est portio vrinæ crassa, candidaque in eius medio sublimis. Partem quidem vrinæ esse, patet ex eo, quòd omnes vias emensa sit, & mutationes sortita quas & vrina, attracta primum per emulgentes venas à renibus, deinde demissa in vesicam, & concoctionem iis in locis sortita, non aliter quàm vrina. Sed nulla etiam vrina est, quæ eam non habeat vel secretam, vel in se confusam, vt & *Hypostasis*. Differt autem ab ea, sola crassitie & gravitate; vnde fit, vt *Hypostasis* matulæ fundum petat; *Enæorema* autem in media vrina pendulum sit, aut si sortè exquisitè medium non est, paulò magis deorsum quàm sursum vergat. Est enim corpus vrina paulò crassius & gravius, multo tamen leuius, quàm *Hypostasis*. Ac quamquam quòd optimum est, eo loco situm esse oporteat, & in imum magis inclinare, (quantò enim magis deorsum subsidet, tantò melius haberi, Galenus auctor est) sæpè tamen in aduersa valetudine supra medium fertur, atque ipsi etiam vrinæ supernatat, pendetque in ea, veluti nubes in aere, propter flatuum copiam, atque ab ea similitudine ab Hippocr. etiam νεφε'λη nominatur. Sic enim putavit Galen. ἐναϊώρημα & νεφε'λη apud Hippocr. idem signi-

significare; quanquam ipse comment. 2. in progn. dubitare videatur, num Hipp. τὸ ἐναιώρημα genus faciat τὸ νεφέλης καὶ τοῦ χοροειδούς ἐναιώρηματος. Ita ut duæ Enæorematit species sint, una nubeculæ similis, altera genituræ. Cæterum quod pertinet ad colorem quem candidum esse decet, eius ratio posita est in perfecta concoctione, uti albus color lactis, lemnis, atque ipsius etiam sedimenti, vide *Sublimamentum*.

Encanthis, ἐγκανθίς, idest, *inangularis*, immoderatum est augmentum angulorum oculi, ut *Rhoeas*, *poliaca* immoderata diminutio, de differ. morb. cap. 9. est etiam quidam præter naturam tumor, in magnis hircus oculorum, quod tuberculum non est omnino præter naturam, lib. de tum. c. 17. estque ut plurimum in maiori angulo; quam carunculam quidam Chirurgici rescindentes, effluxum excrementis ea parte aperuerunt, quem affectum *Rhoea* quidam appellarunt, 10. de vlu part. Alias, *Encanthis* propriè *angulum oculi* significat; *maior* autem *angulus*, qui naso est proximus, proprio nomine *παντήρ* dicitur, *minor*, qui est ad tempora, *παραωτιας*; inde verò eius nomen, morbo inditum est. Malum hoc in canibus frequens est, & homines minus corripit, sed eos magis qui in mari versantur; cuius duæ differentiæ observantur: siquidem aliquando hoc carnis incrementum benignum est tenerum, laxum, & sine dolore, quod medicamentis siccis consumendum est: aliquando verò malignum durum, inæquale, & cum dolore punctorio, quod manu curare & scalpro euellere oportet.

Encathisma, ἐγκάθισμα, est lesio in aqua medicata, ab imis pedibus, vel feminibus, usque ad umbilicum, ita

vt supernæ partes non madescant, 5. de compos. medic. per gen. c. 13. Quod quidem auxilii genus cum plerisque in morbis conveniat, iis tamen solis adhibetur, qui partes intra peritonæum conclusas, infestant: itaque inflammationis renibus sedere convenit in decocto fænugræci, malyæ hortensis ac sylvestris, & seminis lini. In calculosis affectibus convenit *ἰγχαθισμα* in iisdem propter inflammationem, & præterea artemisiæ decocto, & rosmarini, & petroselinii, & spicenardi, quibus etiam in vesicæ morbo utendum est adiecta ruta: ad uterum verò, Artemisiæ decocto, Salviæ, Lauri, & similium: Ad sedem, Meliloti, Papaveris, & Rosarum: ad hæmorrhoidas & fluxiones uteri, Plautaginis, Polygoni, Malicorii, Rosarum, Ruborum, & eorum quæ similes vires habent: Ad vulnera verò, ex quibus nervorum distentio timeri potest, Aqua, & Oleo. Quod si ad alios præterea affectus convenire potest, id accidit vel ob balnei penuriam, vel ob imbecilitatem ægroti, qui totius balnei usum non possit admittere, vel ob supernæ alicuius partis debilitatem, vel affectionem cui aquæ perfusio inutilis sit, aut aliquod aliud impedimentum. Cæterum, qui in talibus decoctis sessuri sunt, omnes sunt illinendi & immergendi in aquam usque ad infimum umbilicum. Oportet autem partes quæ non madescant, prius inungere, sed præsertim caput quod tegi debet, ne repleatur. Qui Medicinam nunc faciunt, id genus remedii *Semichupium* appellant.

Encephalos, *ἰγχεφαλος*, *Cerebrum*, vide *Cerebrum*.

Encharaxis, *ἰγχαράξις*, scarificatio, est cutis & subiectæ eius carnis, per scalpellum sectio, non punctum, sed cæsim facta; multis foraminibus differt à Phlebotomia, quod hæc vno vulnere vnam adaperiat, illa multis

multis sectionibus cutem, carnemque diuidat. Diuifio autem ipfa cum multas habere poffit differentias, in tres tamen referri potest fecundum Galen. lib. 2. ad Glauc. aut enim tenuis & superficiata est, aut è contrario magna & profundior: aut longitudine & profunditate inter eas media: quibus omnibus Galenus se vsum fuisse, prodidit in abscessuum curatione. Quæ in superficie fiunt, non attrahunt è longinquo, non reuellunt, non deriuant, sed in summa modo cute hærentem humorẽ, qua vlcuscula facta sunt, educunt, nec magnis morbis opitulantur. Quæ longæ sunt & profundæ, plurimum sanguinis exhauriunt (cuius rei Oribasius testis locuples est, qui scarificato sibi crure, cum pestilentia laboraret, duas ferme sanguinis libras inde detraxit) adeò vt animi deliquium aliquando inducant; & è partibus etiam remotissimis, & a capite in crura, à crure in manum, reuellant: & quia in carnem altius adactæ sunt, propriam curationem in modum vulnerum efflagitant. Quæ ambarum mediæ sunt, earum pariter incommoda declinant; ideoque aliis præferri debent, si quando scarificationis vsus inciderit. Ea autem tribus de causis suscipitur, ad reuulsionem, ad deriuationem, ad vacationem, humoris tum corpore toto redundantis, tum ea in parte quæ scarificari debet, impacti: Quæ omnia quamuis per phlebotomiam consequamur, quia tamen (vt ex Apollonio refert Oribasius) multum nocere solet corporibus, venæ sectio sæpius repetita, ideo ea omiffa, totius est scarificationes moliri, quod eæ citra validam totius molis corporeæ commotionem, eadem quæ & venæ sectio commodo præstare valeat; Itaque si crura fluxione vexentur, si phlegmone laborent, manus scarificare conueniet, vt è contrario crura, si manus malè affectæ fuerint: similiter si dextrum crus doleat,

aut dextra manus sinistrum crus aut sinistram manum scarificare poterimus, quod reuulsio non tantum à summo deorsum, aut ab initio sursum, sed etiam à dextris ad sinistra, & contra fieri rectè possit, vti & secundum alias situs differētiās.

Encherida, grumi sunt ceræ modo facti in emplastris, dum liquida illis infunditur, 4. de comp. medic. per gen. cap. 5.

Enchymoma, est sanguinis, & humorum in partem aliquam naturalis effusio, per quam, & partis eius venulæ replentur sanguine, & color viuus rubens ac naturalis parti inditur, vt in ira, verecundia, gaudio, somno, fit, diciturque Græcè ἐγχύωμα ἢ ἐγχύωσις; quæ effusio si fiat præter naturam, vt in vulnere contingit, abscessu, aut phlegmone, dicitur *Ecchymosis*; vel *Ecchymoma*; vide *Ecchymoma*, 2. de morb. vulg.

Enchyta, medicamenta sunt, quæ oculis instillantur, vt fœnugræci decoctum, candidum & tenue oui, lac muliebre, & quæ in hunc vsum præparantur coilyria; de remed. par. fac. cap. 10.

Encepe, ἐγχοπή & διακοπή, incisio dicitur propriè in capitis ossibus, inquit Gal. soluta continuitas ab aliquo acuto accurlante & abscindente, uide *Hedra*.

Encranion, uide *Cerebellum*, & *Pariencephalis*.

Enema, idest, infusum, quod per inferna in aluum infunditur; dicitur quoque ἐκλυσμα, κλυστήρ, li. de ren. aff. cogn. cap. 4 ἀπὸ τοῦ ἐνίημι, quod infundere significat, *Enema* appellatur.

Endemus, & *Endemius morbus*, ἐνδημος, ἡνδνμιος, appellatur, quasi Patrium dixeris, & Vernaculum, qui morbus cōmunis est multis, eādē regionem incolentibus: ut *Epidemus*, & *Epidemius morbus* est, qui cūm

pernitiosus non sit, tēpore tamen statō in regione aliqua sæuit, & inlolescit; si enim perniciosus sit, *Pestis* dicitur, i. de viēt rat. 9. Morborum itaque alii *Spirades*, hoc est dispersi, (*Σπώραδες*, qui singulos separatim corripunt, non ab aere, sed potius a victus ratione cuique propria exorſi.) Alii *communes* sunt, quos Græci *κοινούς*, *παγκόινους*, ἢ *πανδύμους* vocant, qui sunt certi morbi & singulares, qui alicubi vagātur, & multos æquē simul corripunt, causamque habent communem, vt aerem, quem omnes inspiramus, vel deprauatæ aquæ potum, aut grauem, & vitiosum cibū, quem omnes pariter absorbuerint, vel terrā exhalationē, vel quid simile, quod vitari nequeat. Qui morbi communes *Paceni* & *Pandemi*, si patrii sunt, *Pernaculi*, & alicuius regionis familiares, *Endemi*, & *Endemij* vocantur, causamq; communem agnoscunt, & communem insultum, de quibus Hipp. lib. de aqua, aere, & locis; si verò a communi causa nati, communes quidem sunt, non tamen patrii & familiares sed potius externi, & aduentitii; sin autem perniciosi, & contagiosi, *Pestilentes* dicuntur, Græcè *Λοιμώδεις*; si verò non pestilentes, sed pestilentibus mitiores sunt, μὴ *Λοιμώδεις*, carent proprio nomine, quanquam Galen. quasi oblitus eorum, quæ in proœmio, lib. i. epidem. scriplerat, asserat, eos, qui pestilentes non sunt, vocari *Epidemtos*, mutato scilicet generis nomine.

Endeixes, ἐνδειΐξεις Indicationes sunt, id est, communitates, scopi, & auxiliorum fontes, velut & loci, *κρίσις* ἐΐξαις verò his opposita sunt, 9. meth. cap. 7. Indicatio est eius, quod fieri in singulis rebus debet, significatione sumpta a propria cuiusque rei natura. Cum enim in singulis rerum generibus quæri possit quid se-

quendum

quendum quidve fugiendum sit, eius cognitio ab ipsa rei, de qua quæritur, natura peruestiganda est, quodque illa faciendum insinuauerit, id eius indicatio dicitur. Ut si quæratur de sanitate quid sentiendum sit, primum perpendere oportet sanitatis naturam, quæ quia bona omnibus mortalibus videtur, facit ut iudicemus eam a nobis seruandam esse, quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem verò in morbo agendum, quoniam totus præter naturam est, & toto genere malus, indicat & ostendit se tollendum esse. Itaque ut duo sunt summa rerum omnium genera, bonum & malum, ita duæ sunt primæ & generales indicationes, Custodia & Ablatio, illa quidem boni, hæc verò mali: Singula enim de seipsis alterum eorum necessariò indicant.

Engisomata, instrumenta sunt, quibus in caluariæ fracturis vtimur, vel ut alij, est ossis pertusio, cum pars affecta in profundum descendit, ac super illæsum os corruit, lib. finit. vide *Camarosis*.

Engonios, id est, angulosa brachij figura, quæ illi membro naturalis est; omnis enim cuiusque partis figura rectissima, maximè est à dolore aliena, 6. meth. 5.

Enrhythmus pulsus, commune quoddam genus est, ad *Enrhythum pulsam*, & *Arrhythum*, i. de diff. puls. c. 9. qui enim naturalem, & optimum seruat *Rhythum*, *ῥυθμος* dicitur, vnusque est, & indiuisus; qui verò non seruat, *ἄρρυθμος*, in tres diuisus differentias; omnis autem pulsus, qualiscunq; ille sit, modò seruat *Rhythum*, *ῥυθμος* appellatur.

Ensiformis cartilago, vide *Cartilago ensiformis*.

Vntera, *ἔντερα*, *Intestina*, sunt corpora caua, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad iecur chyli, & continendi, expellendiq;

ster-

stercoris instrumenta, in orbem inuoluta, fibriis circularibus, & transuersis contorta, ad chyli, & stercoris expulsionem; quorum tria superiora tenuia sunt, *εχθυσίς*, *ἢ ὁδοῦ καὶ ἀκτυλόν*, *ὑπόστις*, *εἰλεόν*, *ἢ λεωτόν*, hoc est, *Eophysis*, *Ieiunum*, *Ileon*, *ἢue Tenue*, tria inferiora, crassa, *τυφρόν*, *καλόν*, *ἀποουθυσμεύον*, *Cacum*, *Colon*, & *Rectum*; atque inde patet, etli vnum, & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine, numero orbium, & anfractuum euariare, senariumque celsitare numerum, & 5. de vsu part. & 6. de anat. adm. Vbi verò *εὐτερόν*, in singulari numero, idest, *Intestinum*, ab Hippocrate profertur, docente Galeno, *comin. 4. in 6. de morb. vulg.* ipsum significatur *Colon*, per excellenciam, ratione suæ magnitudinis; quod solum ex Intestinis in Scrotum descendit, & *Enterocelen* efficit, idest, *Herniam intestinale*, apud alios verò *Cecum*, 4. de vsu part. cap. 17.

Enterocèle, *Epiplocèle*, & *Hydrocèle* sunt Species herniarum; in quibus ruinpitur is meatus, qui a Peritonæo ad testiculos pertingit; lib. de caus. morb. cap. 10. cum articuli suis sedibus excidunt, aut loco tantum mouentur; aut cum omentum, vel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas deuoluuntur; alterum morbu Græci *Epiplocelen*, alterum *Enterocelen* appellant; de differ. morb. cap. 10. Præter hæc ex ambobus etiam morbis compositum affectum, *Enteropiplocelen* iuniores Medici appellant, lib. de tumor. c. 15. vide *Cele*.

Enthusiasmus, idest, *fanatica percussio*, seu *numinis inflatio*, est, velut, cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibias, vel signa audiuerint, lib. finit.

Ergasmatica, 9. meth. 4. vide *Coniuncta* :

Epa.

Eparphareſis, ἐπαρφαρίσις, idest, *repetita sanguinis*, missio, de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores, secundum aures, in ægrotantibus exortos, vocat Hippocr. comm. 4. in 6. de morb. vulgar. 1. Ea etiam οἰδήματα communī significatione appellat. Sed Galen. 3. de compos. medic. loc. cap. 2. dicit *Eparmata* (quæ & *Paroïdes* sunt,) è genere esse inflammationum, quæ fiunt glandulis, circa aures p. n. affectis. Paulus verò ait: Tumor omnis, siue œdematosus, siue scirrhusus, etiam citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, παρωτίς dici potest.

Ephēbaon, Πύβς, & Ράβην, *Agnaticulus* Latinè, Græcè ἐφίβριον, ἐπίσειον, ἦβη, id totum est, quod est ab Hypogastrio, seu imo ventre (quem & *Sumen* vocant) usque ad pudenda; Introd.

Ephelcis, idest, ramentum, seu cruoris exigua guttula, quæ interdum tussī in hæmoptoica passione, rejicitur, 4. de loc. affect. 5. aliquando generalius, ἐφέλξις crustula est, quæ ulceri obducitur, diciturque de internis; quandoque enim crustulæ & per tussēs è pulmonibus, & per deiectiones ex intestinis, deiciuntur.

Ephelis, ἐφελίς, est aspreudo, & nigrities, in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ τοῦ ἡλίου, idest, Sole, nomen inditum, non quòd à Sole tantum vitia illa in cute contrahantur, sed quòd à reliquis inducta causis, similem asperitatem & colorem habeant. Quæcunque enim causa ea excitarit, cutis ceu multo Sole exusta, candorem & læuorem amittit, contrahitque nigritiem & aspredinem. Plinius aliquando discolorē a Sole cutē, aliquando à Sole vsta, vel a Sole adusta interpretatur,

coque

eoque vitio deformes, Solatos appellat. Alij, Vitia cutis simpliciter Latine reddunt.

Ephemera febris est, quo a causa procathartica, siue præincipiente, fit cum urinae coctione, prima die apparente suavi caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effatu dignam ascendente, systole pulsus parum a naturali tenore mutata, æquali atque incōpresso ascensu in caliditate, etiam consistente febre, sudore adhæc aut rore, aut omninò cum aliquo optimo vapore integre iudicari solita, 1. de diff. febr. cap. 7. *Ephemera febris*, ait, in spiritibus citra humorum putredinem accensa est, ibid. cap. 5. vide *Diaria*.

Ephialtes, Affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & quædam quasi suffocatio, cum quis somni ab initio, supinus iacens, grandise mole opprimi, atque ab alio inuadi imaginatur, cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpedita, Propè suffocari, eger videatur; Græcis quoque dicitur ἐπιβολή & πνιγᾶλίων, Latine verò *Incubus* vel *Incubonus* dicitur; fortè quia ex Veteribus quidam *Demonem*, alij, *Cupidinem*, alij; *incubantem Vetulam*, aut *externam quandam vim*, quæ *quiescentes innaderet*, & *pondere oppressos, granaret*, esse voluerunt, quamvis tota mali causa, intra corpus esset, in libello de utilitate respirationis, Galeno ascripto. Ea autem causa non est humor, sed crassus & frigidus vapor, ut scripsit Posidonius, ventriculos cerebri implens, & prohibens, spiritus animales per nervos ferri. Pen somnum tantum fit, eoque laborantes per ipsam accessionem eadem patiuntur, quæ & apoplexia correpti, sed tamen mitiora. Quia enim vapor in causa est, non in totum opplentur ventriculi cerebri, nec tam difficulter excitantur, qui eo laborant. Manent tamen aliquandiu immobiles; deinde verò multo laborare, & conatu

tenuato, & discusso spiritu, & meatibus obstructione solutis, derepentè è somno excitantur. Læditur illis potissimum imaginatio, ex quo verissimile est, in priori potissimum ventriculo morbum consistere. Ex his intelligi potest incubi differentia ab *Apoplexia* & *Epilepsia*. Prælium tamen procemiumque eorum morborum est, atque etiam insanæ. Diuturnior enim, & frequenter repetens, crudo humore in ventriculis cerebri paulatim cumulo, in eos facile degenerat. Præcedunt incubum suffocatio, vocis amissio, grauitas, & immobilitas, & hæc rursus crapulæ & cruditates, ex quibus crassus ille frigidusque vapor suscitatur. Proinde quidam morbum hunc rectè quidem, sed imperfectè definierunt, vaporum in caput discursum ex nimio cibo, & cruditate.

Ephidrosis, ἐφιδρωσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in vniuerso corpore sudoris prouentum, tum paucum, tum inutilem.

Epialus, vide *Febris Hepiala*.

Epicauma, est velut ex igne facta crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro aduenit, nec permanet, lib. finit. id morbi ἐπίκαυμα, & ἑγκαυμα vocant Græci, Latini *Ustionem* siue *Inustionem*. Sed auertendum est duo ulcerum genera hoc vno nomine apud Paulum & Aetium designari. Scribit enim Paul. ἐπίκαυμα vlcus esse oculi sordidum, impurum, crustosum, quod dum repurgatur, sæpè humores oculi effluunt: Id verò ab Actio, non ἐπίκαυμα, sed ἑγκαυμα appellatur. Vocat enim ἐπίκαυμα, vlcus superficialium, cum videlicet nigrum oculi in superficie exasperatum, inustum fuerit, & coloris cinerei euaserit, cuius ulceris non meminit Paulus.

Epicraſtica, *Ἐπίκραστικά*, medicamenta ſunt, quæ & *temperata* dicuntur; quæ ſi valentiora euaserint, humoribus mordicantibus morſum eorum retundunt, 2. ſimplic. 12. veluti vua paſſa mordentes mediocriter ſtomachum humores obtundit, apud Galenum, libr. 2. de aliment. Idem medicamentorum genus etiam *ἀντακράστικόν* appellatur.

Epicraſis, *ἑπίκρασις*, eſt vitioſi ſucci ſeu cacochoymiae curatio, cum indicationes ſibi aduerſantur, in qua paulatim, quod vitioſum eſt, vacuatur, & paulatim quod ſalubre eſt, pro eo reponitur, 9. method. 10. Eſt enim in vniuerſum duplex omnis curationis ratio: aut enim in totum ſummonetur vitium, ſi & vires valent, & humor concoctus & faciliè educi patitur: aut ſi vires imbecillæ ſunt, vt conſertim factam vacuationem admittere nequeunt, vel humor propter cruditate non ſit futurus obediens medicamento, tunc vbi eum attemperaueris, tenuaueris, mitificaueris, paulatim educere oportebit, inque locum eius benigniores ſufficere; quatiſquam non ſit necèſſe *ἑπίκρασιν* vacuatione perfici. Nam quæ etiam in corpore inmanent, alterari, mitigarique poſſunt, permiſſa ſoli naturæ vacuatione, quæ eorum partem vel conuertat in corporis alimentum, vel per alium, vrinas ſudorem, aut aliter expurget.

Epicriſis, ideſt, *Adindicatio*, ad Thraſybo. cap. 6. Quæ mutuò inter ſe dependentia colligantur, per appellatam *Epicrima* Græcis, a noſtris *Adindicatio* dici poteſt, iudicanda ſunt.

Epicryſis, certa quædam eſt percuffio, qua mangones puerorum, hoc ipſo præſidio ſuccurrunt iis, quibus a natali die, gracilia ſunt membra, 14. meth. c. 16.

Epicryma, *ἐπικρύμμα*, eſt ſecundus foetus, conceptus

grauida iam existente muliere, id quod fit, vt scripsit Hippocr. cum foetu am concepto, non clauditur exacte vterus, sed semen aliud etiam postea intro admittit; Arabibus, *Superimpragnatio* dicitur, & *Superfatatio*.

Epidemus, vide *Endomus*, & *Communis*.

Epidermis, summa cutis corporis, seu Cuticula, 3. meth 4. sola sensatione à vera cute differt. hæc enim à neruorum extremitatibus dilatata fit: Epidermis verò à cutis excremento vaporoso, ambientis aeris à frigidityte prouenit: Itaque vel sensu caret, vel exigui sensu est, proinde citra dolorem facile à subiecta cute separatur: Sic dicitur, quod supra cutem nascitur, quodque eius veluti quædam efflorescentia sit; sicut τὸ ἐπιθυμὸν τοῦ θυμῶν, καὶ τὸ ἐπιθυμῶν βροτὶ θυμῶν.

Epidismus, siue *Hypodismus*, id est, *Fascias*, *Subfasciationes*, & *Subligamina*, sine vlla distinctione, Veteres vocauerunt; Ac Hippocrates *Fascias*, quæ ipsi corpori circumdantur, *Subligamina*, seu *Subfasciationes* appellat, quæ Plagulis extrinsecus superlingantur, 3. de his, quæ in med. 6. vide *Plagula*.

Epidesis, genus ligationis est, ad sanguinis profluium fluentibus vasis injecta; quamquam ipsum vas circulo non complectatur, sicut vinculum; verum cum ex parte suo complexu committat quodammodo vulnerati membri labra dissidentia, & quæ superimposita sunt, contineat, merito inter claudentia remedia numeratur; 5. meth. 3.

Epididymis, Ἐπιδιδυμῖς, id est, supergeminale tunica, & parvus quidam quali testis, testium intio. uerum simul est, & appendix; est enim pars quædam animalis gemini, hoc est, testis capiti superimposita; id quod nomen ipsum præ se fert, ex qua multæ fistulæ, seroso

quodam

quodam humore plenæ, ad testem permeant, i. de sem. cap. 15. Est autem propria & intima testium tunica, & illis omni ex parte contigua, dura, crassa, & a modum valida. Huic alia tunica superposita est ἐρυθροειδής dicta, non eam modò, verùm totum etiam testem comprehendens. Male quidam eo nomine testiculi quoddam caput, & veluti efflorescentiam significari putant, nominibus manifesto abutentes, [id enim παραστάτις vocatur] & ob id in errorem lapsi, quòd existiment τὴν ἐπίθυμίδα eadem ratione dici, qua τὸ ἐπίθυμον (flos supra thymum) & τὸ ἐπίθυμβρον, id quod supra Thymbram siue siue Saturciam prouenit.

Epigastrium, vide *Abdomen*.

Epigenema, ἐπιμένημα, quasi superueniens uel supergenitum, idem est ac Symptoma, de symp differ. cap. 1. quanquam aliqui ita distinxerint, ut Syptoma esset quicquid præter naturam animali accidit: ἐπιμένημα uerò, quòd solos morbos necessario sequitur, ἀπὸ τῆς ἐπιγίγνεσθαι, vide *Symptoma*.

Epiglottis, ἐπιγλωττὶς, idest, *Superlingula*, est membrana cartilaginola, rotunditatis oblongæ, in interiori gutturis parte collocata, i. de loc. aff. 1. quæ à radice linguæ exoritur, lib. de uocal. inst. diff. c. 4. quæ & *Glottis* dicitur, 7. de usu part. c. 3. Dicitur etiam *Lingula*, *Ligula*, idest, *Laryngis lingua*; est enim corpus quoddam simile linguæ alicuius fistulæ, ubi arteria, & larynx inter se connectuntur, 7. de usu part. c. 13. velut operculum omni tempore, quo animal respirat, apertum stans, quo transglutit, laryngi accumbens, ibid. c. 17. Cuius ligulæ, nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs, quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cavitatem.

aceruata, ib. estque hæc proprium vocis instrumentum
1. de loc. affect. 6. Vergit autem ad stomachum, positio-
nemque habet tertiæ cartilagini aritænoeidi contrariæ
ut quæ ex aduerso etiam loco exoritur.

Epigonatis, ἐπιγονάτις, vel ἐπιγονὴς, est os cartilagino-
sum, latum, rotundum, intus læue & cauum, toti genu
supra positum. Duabus constat substantiis, vna ossea,
interiore; altera, cartilaginea, quæ exterior superficia-
riaque est, sicut cartilagine quodammodo incrustatum
videatur interna præsertim parte, quæ articulum respi-
cit. Verùm a lateribus asperum est, quo commodius ei
tendines tibiæ extendentes, ipsumque femori atque
tibiæ alligantes aptarentur; propter quos etiam his lo-
cis cartilagosum videri cum Galeno possit, maxime
in iuuenum corporibus: at grandioribus, abrasis cul-
tello, aut coctura abscedentibus tendinibus, manifesto
osseum apparet. Contegit femoris tibiæque articulum,
alioqui nimia patentem, prohibetque ne antrorsum
laxetur. Formam probè orbicularem habet, fastigio ad
tibiæ acuto. Vinbonem imitatur, medio corpore cras-
siore, orisque tenuibus. Vide *Patella*.

Epilampesies, vide *Effulgescentia*.

Epilepsia, (quæ & *Epilepsis* dicitur,) idest, *Morbus*
Comitialis, de d. ff. morb. c. 5. estque totius corporis con-
uulsio, non perpetua, cum mentis & sensuum obliuione.
Eam molestiæ rei sensus inuehit, & cerebro noxiæ, tum
quantitate, tum qualitate. Quantitas quidem cerebro
gravis est, eiusque vim expultricem excitat, consistitque
in humore vel pituitoso, vel melancholico, sed ferè sem-
per frigido, crasso, & viscoso. Quem tamen non adeò
multum esse oportet, ut penitus obstruat, vimque ipsius
cerebri exuperet, alioqui non *Epilepsiam*, sed *Apople-*
xiam potius pareret, sed quantitate mediocrem, ut ad
cuius

eius depulsiōnem,quā natura totius corporis concussu molitur,cerebro adhuc vires suppeditet. Qualitas verò inaligna ac venenata,& virtuti animali infesta est, siue à veneno sumpto, siue ab vlcere cacoethe cerebri vel subiectarum partium,siue ab alia affectione, vt ventriculi cruditate, & largo meri potu proficiscatur. Itaque vbi eorum aliquid in cerebro præter naturam fuerit, ipsum mouendi sentiendique principium in sese recurrit & contrahitur, atque ita totius corporis conuulsionem inducit, quin etiam eam à se moliri contendit crebra & inæquali cerebri totiusque corporis concussione. Apparent enim manifesto in eo morbo hæc duo symptomata conuulsio,concussioq; tanta,vt spumam etiam eliciat. Valido in motu humor qui in cerebro continetur exagitatus,non aliter quā ouī candidum, (spumā creat. Sant autem (quamuis loci affecti nullum signum appareat (cerebri ventriculi, anterior maximè & posterior,huius mali sedes, in quibus spiritus gignitur atque continetur, primum animæ instrumentum, tū in sensibilibus actionibus omnibus, tū in iis quæ à consilio & voluntate prodeunt. Spiritus igitur cū labore, & veluti attonitus in depellenda morbi causa verletur, alias interim functiones deferat, necesse est; quare non imaginari,non ratiocinari,non meminisse potest;2.de sympt.caus.c.2. Vide *Comitiales*.

Epilogismus, communis est quædam ratio,& omnium assensu comprobata, 1.prorrh.6. vel est ratio apparens, nec recedens ab his quæ manifesta sunt, sed illa semper usurpans, ut idem Gal.ait, lib.de sectis. Huiusmodi rationes multæ habentur apud Hippoc. in progn. vt quæ à facie ægri & signis aliis euidentibus sumuntur.

Epinyctides, uide, *Efflorationes*.

Epiparoxinestai, idest, superuacui,& superexacerbari

dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus, ac veluti reduplicaciones, vt in semitertiana, quæ tertio die duplicatam habet accessionem tertianæ intermittentis, cum quotidianam continua, & ἀναδιπλώσεως quædam. Est & ἐπιπαροξύνου irritari, & de abscessib. ad aures subortis, dicitur, in prorrh. sicut & pulsuum Thlipfis, idest, compressio; sic enim nominant, quando incipiente accessione satis parui, atque inæquales pulsus sunt, 1. de diff. feb. cap. 7.

Epiphora, ἐπιφορά, tum inflammationis magnæ, vniuerso illatæ corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum commune nomen est; propria verò, de oculis profertur, vbi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia in illos influxerit, lib. introd. c. 15.

Epiphysis, ἐπίφυσις, est ossium quasi adnata appendix, lib. de ossib. in proœmio: differt autem ab *Apophysi*, ut idem Galenus annotat, quod *Apophysis* sit totius ossis extrema pars, *Epiphysis* uerò non est ossis pars, sed aliquid ossi adnatum.

Epiphysis vermiformis, ἐπίφυσις σκωληκοειδὴς, idem est ac *Conarium*, siue *Conoeides corpus*, & *Turbinatum*; Vide *Conoeides*.

Epiplasma, idem est ac *Cataplasma*; ut, cum tritici farina, ex Hydrelœo decoquitur, ac uulneribus imponitur, 3. de compos. medic. per gen. cap. 2.

Epiploeele, Vide *Celas*.

Epiploocista, plerique homines pingues & obesi dicuntur, quasi dicas *Omenti gestores*, dum in magnam molem omentum iisdem excreuerit, 6. de anat. adm. c. 5.

Epiplaomphalon, omenti est in umbilicum prolapsus, lib. finit.

Epiploon, siue *Epiploon*, Vide *Omentum*,

Episarcidium, Vide *Anasarca*.

Episemasia,

Episemasia, est ipsum principium, siue insultus accessionis febrilis, in quo ægri solent horrere, refrigerari, oscitare, pandiculari, dormire, aut aliud quid simile pati: dicitur Græcis, ἐπισημασία, *Significatio* (alias, ἰσβολὴ παροξυσμοῦ id est, Annotatio paroxylmi, tempus indiutibile, exactè iam primum, quo ista ferè quæ retuli, solent oboriri: horum si quod ægri senserint, iam accessionem adesse, quasi eo signo præsentiant. Ac cuiusmodi quidem accessionis significatio, quæ scilicet eum talibus signis inuadit, simpliciter, ἐπισημασία appellatur, estque febrium putridarum propria. Verùm habent & suam ἐπισημασίαν hæcticae febres, sed ab illa differentem: ea autem est vna ferè hora vel duabus post assumptum cibum, quo tempore qui hæctica febre laborantem tetigerint, quandam febris veluti accessionem deprehendent, calorem & pulsum magnitudinem atque celeritatem intendi sentientes, nec quicquā tamen eorum obseruantes accidisse, quæ solent in putridis febribus eueniri, hoc est, non horrorem, non aliquam pigritiam, aut aliquam omnino inæqualitatem, in calore aut pulsu, sed neque paruitatem, neque debilitatem, neque aliud quid simile. Ideò hæc quia, ἐπισημασία non est, non absolutè, sed cum addito, ἐπισημασία ἀθροιστική nominatur, quod careat iis angustis molestisque, quibus alij grauiter premuntur per initia accessionum. Est autem hæc febrium hæcticarum propria; Galen. lib. 1. de diff. febr. cap. 9. vide *Annotatio*.

Epison, vide *Aqualicus*, siue *Aqualiculus*.

Epispasticum, ἐπισπαστικὸν φάρμακον, quod & ἐλκτικόν, & ἰσχυρικόν dicitur; vide *Astrahens*: est medicamen arium inspersile, ad malignorum vlcere curationem non inefficax, 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Epi-

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valentiora, quæ tum ex vnguentis, tum ex iis, quæ similem vim obtinent, medicamentis componuntur, 7. meth. 4. *Epithema* quoque Operculum est, 2. de vlu part. c. 9.

Epneumatosis, vide *Physis*.

Eboche, est suspensa sententia, nihilque definiens: vti cùm quamdiu humores sunt in nutu, de nulla re pronunciamus, nec asseueramus quicquam certò, lib. de optimo docendi gen.

Epodima, id est, *superhumeralem*, superiorem humor partem dicunt, 1. de anat. adm. 11. vide *Ala*.

Epulis, ἐπυλῖς, est Tuberculum, & carnis excreſcentia in gingiuis proueniens, & ad intimos molares dentes sese extendens, ita vt æger aliquândo os aperire nequeat, 5. de compos. med. ioc.

Epulotica, ἐπυλωτικά φάρμακα, medicamēta sunt, quæ non detrudere, neque liquare carnem, sed indurare, deficcare, & cicatricem inducere apta sunt; vt Alumen, Galla, Omphacium. *Æs* combuitum, præſertim lotum, 5. simpl. cap. 15.

Equus, (qui Græcè ἵππος dicitur, lib. finit.) oculorum affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tempore manere possunt requieti, sed tremuli subinde niſtant, & instabiles, 1. progn. 21. Hanc oculorum affectionem Galen. comparat stridori dentium naturalis, & congenito, patetque ex eo non esse morbum, præſertim cùm nemo Medicorum eius meminert.

Erratica febris, siue *Inordinata*, est, quæ extra horas consuetas, vel tardius, vel celerius inuadit, & inordinatè tum mouetur, tum consistit, lib. de Typis, cap. 4. sunt enim (ait) in erraticis, inordinata principia.

Errhina medicamenta sunt, quæ naribus, quas Græci *Rhinas* vocant, capitis purgandi gratia infunduntur, aut induntur, 5. de simpl. c. 20. Quicquid autem eam habet

bet facultatem, extergens, & acre sit oportet: sic enim & commodissime attrahit, & vim expultricem irritat. Eiusmodi est Betæ succus, Cuminum, Medulla, Cucumeris sylvestris, Staphisagria, tum oleo aut vnguento, aut lacte, aut alio liquore excepta, & naribus inuncta, tum in pulverem trita tenuissimum & per arundinem insufflata. Quod ubi actum est, æger deorsum pronue-
re debet quo videlicet coactus humor distillet.

Erythroides, est intima testiculorum tunica, de caus. morb. cap. 10. vide *Elythroides*.

Eruptionum, siæ, vt Græci dicunt, *Exanthematum* nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet vlcerosis, & asperis, in mento, & corporis vniuersi ambitu sua sponte prouenientibus, 5. de compos. medic. loc. cap. 6.

Erysipelas, est tumor præter naturam non altè descendens, sed in cute consistens, a bilioso humore obortus, colore pallido, 14. meth. 1. Si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mixtus ex pallido & rubro, erit etiam mixta affectio, ex phlegmone (in qua sanguis peccat, coloris rubei) & ex *Erysipelate*, vtique ab eo, quod in mixtura superat, nomen ipsi inditur, ac dicitur vel *Phlegmone erysipelatosa*, vel *Erysipelas Phlegmonosum*, 14. meth. 1. & 2. Habet quidem doloris aliquid, sed longe moderatius quam phlegmona, neque vt illa pulsat, premit, aut distendit. Verum multò calidior est, & aspectu flauior, & si tetigeris, sanguis facile refluit, rursusq; affluit, valè tenuis & rubens. Nominant autem *Erysipelas*, *Vicinstraham*, vel *Vicinirubiam*, quod incensum quidem atque inflammatum est semper, cum tumore, & rubore partium circumpositarum, lib. tertio de his quæ in med. 30. & 2. ad Glauc. 1. *Exactum* autem *Erysipelus* est, quod a biliola fluxione ortum ducit, 7. simpl.

Eshara,

Eschara, crusta est, quæ ulceribus veluti septum, vel sua sponte, vel arte pyroticorum medicaminum usu adnascitur, 3. meth. c. 3. Crassa, nigraque est: quæ autem leuior, *ἡ ἑξήρα*, sed *ἐπὶ πύλιν* dicitur. Propriè vero *ἐξ ἑξήρας* quæ ab ardenti ferro, aut medicamento caustico inducta est, appellatur. Eius generatio, inquit Gal. ex subiectis circumpositisque corporibus, vt sic dicam, semiuissis, sic vt cuiusmodi rem in hyemem extinctos hos carbones parant, eiusmodi ipsæ crustæ carnis exustæ sint reliquæ. Quare quantum particulae acustum ad crustam est, tantum ipsi de naturali carne deperditur.

Escharoticum, medicamentum est, quod perinde vt causticum, in crassa essentia est, & cuiusque inhæserit parti, stipitis ritu infixum eam comburit & excruciat, 3. simplic. 15. Est autem duplex *ἡ ἐξαρτική*, ignitum fer-ramentum, & causticum medicamentum; hoc autem calidum & siccum est, quarto gradu: id carnes colliquat & adurit, sicque crustam facit. Eius usus imprimis necessarius est, vbi ex erosione putrescentis alicuius profluum sanguinis excitatur, atque vbi quoddam computruit, sublatum est ad adurendam ipsius veluti radicem. Est autem incrustantium medicamentorum materia non vtique solus calor, sed cum quo adstringendi facultas sit coniuncta, qualis in chalcitide & mifi, & atramento sutorio, siue vitis, siue iussis. Quæ verò ex calce non extincta conficiuntur, ea vtique valentiora his sunt: cæcerum, calx adstringendi vim non habet. Excidunt igitur citius quæ ab his fiunt crustæ, hærent autem corporibus diutius quæ ab astringentibus: quod vtique longè est vtilius in profluo sanguinis, quando ita prius nascitur in imo earum caro, efficiturque profluenti vasi velint operculum quoddam: vnde nec nosmet præcipit esse ad crustas, vbi hæmorrhagiæ periculum imminet,

detrahendas oportet, nisi in illis tantum affectibus, in quibus propter putredinem candens ferrum admo-
lere coacti sumus; tunc enim celerrimè crustam exci-
lere expedit.

Esthiomenos herpes, ἐσθιόμενος ἕρπης, est inflammatio ex
incera flava bile ad cutem decumbente acriori, & mor-
laciori quam ea est, à qua oritur herpes millaris; in hoc
nim fluor pituita mistus videtur; in illo exacta bilis to-
tam exulcerans, & corrodens cutem; lib. de tumor. c. 9.
vide *Herpes*, *Phagedæna*, *Noma*.

Ethmypo des plarysma, id est, latus ille musculus, siue mus-
culosa dilatatio, quæ cuti subnascens, ἑπὶ τὸν, id est, buc-
cam, siue maxillam mouet; lib. de neru. dist. c. 6.

Euacuationem omnem, siue fiet inedia, siue sanguinis
missione, siue purgante medicamento, solitus est vocare
Hipp. vasorum inanitionem; *Euacuatio* autem pressius
dicta est humorum, qui sua quantitate molestant, purga-
tio, vt purgatio est humorum, qui sua qualitate mole-
stant, euacuatio, i. aphor. 2.

Euchymia, id est, luccorum in corpore bonitas, 2. de
impl. 13. vnde *Echymon* nutrimentum est boni succi, 6.
de san. tuend. c. 7. Id autem duplex est, tum quod portio-
nem quandam boni succi continet ad nutriendum habi-
s, sed plurimum habet recrementi, tum quod plurimū
habet, quod nutrire potest, minimum autem quod sit in-
tile, Gal. lib. 9. method. med.

Eucrasia, est medium omnium temperamentorum, i.
de san. tuen. c. 4 ex optimā & conuenienti cuique na-
turæ, corporiq; misto, mixtura quatuor primarum qua-
tatum conflata. Vnde eius magna est latitudo, quā
ui adeptus est εὐκρασία, siue *Eucrasion corpus*, id est opti-
mè temperatum corpus nactum esse diceretur; secus *dys-*
crasion, siue intemperatum, 2. de temper. 1.

Eusticia.

Eucētica, medicinae pars, quam alij *Gymnasticam* vocant, est, quæ optimum habitum corpori inducere studet, de part. art. med. cap. 5.

Eucēxia, est bona corporis habitudo, i. de sanit. tuen. cap. 8. vt huic opposita *Cachexia*, idest, prauus corporis habitus *ἀνέξια κακία*, illam complent bona omnium partium temperies, actionum robur, *Euchymia*, sanguinis, carnis, totiusque corporeæ molis symmetria. Est autem duplex ἡ ἀνέξια; vna est ἡ ἀπλὴς ἀνέξια, quæ in optima corporis constitutione deprehenditur: altera, vetò, μετὰ προδίξης ἀνέξια, quam habent singulæ corporum naturæ propriam & in comparatione dictam. Itaque ἡ ἀπλὴς ἐνέξια nihil aliud est, quam τῆς ὑγιεινῆς ἐξέως ἡ τελειότης, hoc est, perfectissima & absolutissima sanitas: Et quia species & ipsa τῆς ἐξέως est, non facile a causis insalubribus offenditur, sed firma constansque in corporibus perieuerat. Quæ autem ab hac deficit, modo nondum vitiosa sit, non iam ἀνέξια, sed ab omnibus ὑγίεια, hoc est, *Sanitas*, nuncupatur, quæ eadem est cum τῇ μετὰ προδίξης ἀνέξια; tunc enim non simpliciter, sed huius vel illius ἀνέξια dicetur. Sic ἢ τῶν ἀλλοτῶν ἀνέξια non simpliciter dicitur, quoniam optima non est, quam periculo proximam esse Hippocrates pronuntiauit, & negauit natura esse comparatam: nam vt reliqua habeat optima, attamen sanguis, & præcipuè carnosum genus in ea supra modum excreuit.

Euidentes causa, vide *Continentes*.

Enēchon, ἐνέχον, *Vinculum* vocat Hipp. quod benè gestat, & sustinet, hoc est, firmiter, & sine vlla compressionē continet, 3. de artic. 22.

Eupathia, idest, patiendi promptitudo, 4. de vsu par. 14.

Enphyian, vocat Galenus, bonam habitudinem. 1. de vsu part. 9.

Ευφραα,

Eupnœa, εὐπνία, proba spiratio, quæ secundum naturam sit, opposita *Dyspnœa*, quæ est difficilis spiratio, apud Hipp. vt annotat Gal. in com. prognost.

Eurhythmus, pulsus est cuius ætati, loco, tempori, temperamento, naturalis & conueniens pulsus; cum uero rhythmum quoque seruat in Diastole pariter, & Systole, i. de differ. pull. cap. 9.

Eusarcon, vide *Quadratum*.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis & sua indicatoria die fuit iudicata, vt quæ vñdecimo die coctionem in urina, noctem grauem, quæ accessionem præcedit, insuitus, cum concussione pulsum, decretoria in coramotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit i. dier. de cr. cap. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremque roborans, 6. de tuend. san. cap. 9.

Euthypros, idest. in rectum procedens, alterum ex instrumentis, & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (σώλιονας, Græci vocant) quod quidem Euthypros per vnicum axem; qui in fine machinæ ad infimam eius partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, gemina tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud *Metalepticum* dicitur, quasi *Translatiuum* dixeris, 6. meth. cap. 5.

Euthrophia, idest, bona, & vberior nutritio, 3. de sanit. tuend. cap. 8.

Exanastomosis, vide *Osculorum apertio*.

Exangues corporis partes sunt, vt ossa, & cartilaginee, quæ mucoso quodam humore naturæ suæ analogo aluntur, lentore quodam & albedine prædito, 3. de artic. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet vlcerosi, & asperis in aliqua

aliqua corporis parte prouenientibus, quæ & *Pustula*, & *Bother* dicuntur, 5. de compos. med. loc. c. 6. Sunt autem ἐξάρθρηματα, siue *Papula*, quædam leues eruptiones humorum per cutem efflorescentium; rubræ, pallidæ, flauæ, nonnunquam & nigræ, & liuidæ, pro humorum ratione, nunc indolentes, nunc prurientes cum scalptu, interdum sine pruritu, nunc ulcerosæ, nunc ad vlcus non deuenientes; horum generum sunt *πυκταίναι*, *ψυδράκια*, *θηνύκτιδες*, *καχῆνες*, *Variola*, *Morbilli*, quæque in luc. Venerea etiam gignuntur, & quæ in febribus persistunt; vide *Pustula*; *Eruptiones*.

Exarthrema, luxatio est, non omnis, sed ea tantum, in qua totus articulus à sua sede naturali excidit: nam parua in luxationem, non ἐξάρθρημα, sed *περάρθρημα*, quidam vocari contendunt, 2. meth. 2. Alii per ἐξάρθρημα intelligunt positionem articuli deprauatam, & præter naturam. Ea fieri potest sursum, deorsum, intrò, foras, antè, retro. Sex enim istis differentiis in articulo ossis a sua sede transponi possunt. Est autem luxatio morbus ossis, non qua os pars similis est, sed quod partis organicæ portio sit. Sic enim & in multis aliis partium organicarum morbi partibus similibus per accidens tribuuntur, & contra similiarium morbi, organicis.

Exarticulatio, est alicuius membri luxatio, libr. de morb. dissid. cap. 13. *Exarticulationes* interdum vocat *exarticulata*, id est, ossium è propria sede excessus, sine fractione, com. 1. in 1. de fract. 1. vide *Luxationes*.

Exagritudine senectas, siue *ex morbo senium* (quod & *Tabes*, seu *Marasmus*, & *Marcor*, febrisque à qua proficiscitur, *Tabida*, vel *Marasmodies* dicitur) est extinctio summæve imminutio natiui caloris, ad quam totum corpus contabescit, instar arboris cuiusdam supra modum arefactæ, aut ob longitudinem temporis, aut flammæ

mæ viciniam, aut vehementem, atque immoderatum
 aequalorem. Cumque hæc qualitas senibus, annorum
 multitudinis ratione comparetur, tabidis tamen a febrili
 caliditate, 5. de sanit. tuend. c. 9. & 1. de diff. feb. c. 8.
 fitque ex defectu nutrimenti, ubi quis vel ex electione
 famem tolerat, vel præ ciborum inopia, conficitur, lib.
 de marcore, cap. 1. vide *Marasmus*.

Excavatio, vide *Lordosis*.

Excidentia, apud Hippocratem nunc sine adiectione
 luxatione ossium à propria sede significant, 1. de fract. 1.
 nunc articulorum tantum luxationes, com. 3. de iis, quæ
 in med. 3. 1. vide *Luxationes*.

Excrementum id omne dicitur, quod in alendo cor-
 pore, nec confici, nec assimilari potuit. Cumque corpo-
 ri non adnascatur, nec accrescat, propterea per ipsius
 laxiora intus spatia, superuacaneum erit; unde nomen
 quoque rectè à maioribus ei rei *ἐκείνου*, idest, *perer-*
rans, est inditum, 1. de sanit. tuend. c. 3. vide *Attractrix*,
 & *Lotium*.

Excitationes, idest, ossium extra cutem eiectiones, de
 ossibus enim extantibus est sermo, 4. de art. 34.

Exelcismus, est ossis, vel ossium deductio à superficie
 in profundum, lib. finit.

Exercitatio actiua, cuius celeres motus sunt, est, quæ
 corpus extenuat, & consumit; *contraria*, crassum reddit,
 multa, corpus siccatur; *mediocris*, obesum præstat, 5. de
 sanit. tuend. 3.

Exipotica, digerentia sunt in medicamenta, 7. de com-
 pos. medic. per gener. 9. *ἐξιπωτικά φάρμακα* eadem sunt
 quæ & *ἐμαστικά*.

Ex morbo senium, vide *Ex agitudine senectus*.

Exomphalos dicitur, cui umbilicus foras prominet;
 quod malum, alij *rupturam* vocant, alii *egressionem um-*
bilici.

bilici, quod accidit, vel Peritonæo rupto, aut procidente Omento, aut intestino, vel humore ibidem collecto, vel carne subnata, vel sanguine, in loca hæc irruipente, per *Diapedesim*, vel *Aneurisma*, vel solo aliquando spiritu isruente; vide *Bubonocoele*. Ipsum autem malum *ἑξομφαλον* ~~παθὸς~~ appellatur. Si Omentum procidit, circa umbilicum tumor concolor, mollis tactu indolens, & inæqualis apparet. Si intestinum, præter hæc tumor magis inæqualis est, digitis cedens & euanesceus aliquando cum strepitu, balneisque & distentionibus magis increfcit. Humorem denotat mollis tumor, qui compressu non cedit, nec decrefcit, neque tamen auge- tur. Si præter superiora signa liquidior tumor est & du- rior, adnatæ illic carnis signum est. Introductorii au- thor tres tantum causas videtur nouisse, scribens omnes *ἑξομφαλεις* tribus differentiis comprehendi; alios appel- lans *πνευματωδεις*; alios, *λιπομορφεις*; alios, *ὕδρωμορφεις*. Non est autem malum hoc peritonæi solius, sed oportet omnino transuersorum quoque musculorum epigastri nerueas appendices affectas esse.

Exostosis *ἑξοστόσις*, ossis eminentia & extuberatio, qua- cunque corporis parte præter naturam contigerit, Pe- culiari tamen nomine ossium tubera, quæ in genis con- tingunt, *στυροσμοί* appellantur. Non dubium est huius tumoris, qui præter naturam est, materiam crassam esse & melancholicam. Sunt autem huiusmodi tumores Gallico morbo laborantibus frequentes.

Expansa, *ἐκπεπταμένα*, vide *Abscedentia*.

Experientia, est eius, quod læpius & eodem modo vi- sum est, obseruatio, atque memoria, ad Trasib. c. 11.

Exspiratio, est motus, quo spiritus per respirationem ad interiora latus, ad exteriora cum fuliginosis excre- mentis propellitur, 4 aph. 68. qua in cordis compressio- nibus,

bus, id, quòd fuliginotum est in eo, ac humidum, per
laues arterias, extra funditur, 7. de usu part. 9. vide
Inspiratio.

Exspiratus, species quaedam est respirationis ex con-
uulsione proueniens, quæ musculorum, qui expiratum
efficiunt, conuulsionem sequitur, quam appellat Hipp.
spiritum inter exeundum offendentem, 2. de sympt. caus.
cap. 2. & 4. aphor. 68.

Expaltrix facultas, vide *Attractrix*.

Exquisita tertiana vide *Tertiana simpliciter*.

Exsuccatio, idest, *sugillatio*, 2. de fract. & 24. vide
Contusio.

Exsudare, est circa frontem, & clauiculas parùm su-
dare, com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Exsufflatio, est multi spiritus extra animal ex thora-
ce per guttur affatim facta emissio, agentibus ad id in-
tercostalibus musculis, contra toque Thorace, 1. de loc.
affect. 6, quæ duplex est: altera, citra sonitum & stre-
pitum, cum ex utriusque Thoracis partibus nihil om-
ninò expirat animal; altera, cum vna tantum thora-
cis parte respirat animal, ita ut semispirans, vel semi-
uocale reddatur, diciturque *exsufflatio strepens*, vel cum
sonitu, 4. de loc. affect. c. 6. illa, hiantibus, hæc, constrictis
fit faucibus.

Extasis, idest, *mentis amotio*, insania est, quæ breui fini-
tur, lib. finit. *ἐκστασις*, & *ἐκσίναι* dicuntur, apud Hipp.
de vehementi motione & aberratione mentis, eadem,
prorsus significatione qua *μανία* & *ἐκμανία* usurpat,
ut annotat Gal. comm. 3. in lib. 3. Epidem. Fit à flaua-
bile vsta per cerebrum diffusa; vide *Ecstasis*.

Extensum intestinum, vide *Rectum*.

Extergentia, vide *Rhyptica*.

Externa causa, vide *Procatartica*.

Extubercatio, est vertebræ alicuius ab interiori, ad exteriorem regionem facta luxatio, 9. de placit. 4.

Exustio, quæ & *Densitio* dicitur, siue ipsa Solis operatio, talem sortiatur appellationem, aut qui ab eadem fit in corpore affectus, siue illo iam effectus sit, siue adhuc fiat: ubi sæpius adest calor quidam præternaturalis, non dum tamē febris, nisi cor quoque simul fit ultra modum calefactum, 1. de diff. feb. cap. 2. 3.

F

FACIES, Græce *πρόσωπον*, est quidquid à priore capitis parte, sub tota fronte, auribus, oculis, naso, & ore ad mentum vsque, a superciliis incipiens, circumscribitur, lib. Introduct. cap. 10. De homine tantum dicitur *πρόσωπον*, quod cum unus animantium erectus sit, solus antrosum prospectet, uocemque ante uersus emittat. In brutis butem *πρότομή* appellatur; in auibus *πάρορ*.

Facies Hippocratica, quam mortiferam uocant, est, cuius nasus acutus, caui oculi, adstricta tempora, aures frigida, & contractæ; & fibræ earum uersæ, cutis circa frontem dura, intenta, arida, color totius uultus uiridis, aut niger est, 1. prognost. 7.

Fætus, (quò tempore in utero semen seminis speciem refert; ut in abortu & dissectione uisum est) ab Hippoc. appellatur; ubi semen in uterum injectum, sanguine repletum fuerit; & Cor, Cerebrum, & Iecur, indistincta quidem, & informem, quandam tamen coagulationem; & magnitudinem præ se tulerint, & carnea fætus substantia, & non amplius seminalis apparet, tunc non *Genitura*, ut prius, sed *Fætus*, ab Hipp. appellatur talis forma, 1. de sem. cap. 9.

Famer, Vide *Sensus indigentia*.

Fatuitas, (quæ & μάρως, *Stultitia*, & *Stoliditas* dicitur) symptoma est extra delirium, ægros naturalibus fatuis similes reddens, quales etiam ex iis, qui consenescent, nonnullos fieri nouimus, cui pathemati simile quidem est, quanquam non idem, quod nocant ἀγαν, id est, *ignorantiam*, de qua Thucydides scripsit, in his, qui ex peste seruati sunt, hoc pacto ignorauerunt, tum seiplos, tum familiares, com. 2. in prorrh. 60. deficiens est, seu in infirma motio facultatis ratiocinatricis. Ad eam quidem facultatem propriè pertinet fatuitas, non tamen reliquæ principis facultatis actiones integræ sunt, sed pariten imperfectæ: nam & parum aptè imaginantur, nec probè meminisse solent fatui, quippe qui cerebrum non habere uulgò dicantur. Quæ eam inducunt in prorrh. lect. 2. citantur ἀπορρομένα, hoc est, τὴν μάρωσιν ἐμπούντα τῇ θανάτῳ, sicut Galeus explicat. Eiusmodi sunt uel minus idonea, decensque cerebri conformatio, uel frigida intemperies, aut frigidus aliquis & pituitosus humor in cerebro collectus, uel medicamenta, quæ foris imposita, caput modice refrigerant. Neque enim μάρωσις causa tam magna, ac uehemens est, quàm τῆς ἀνοίας, quæ eiusdem facultatis abolitionem priuationemque significat: eo enim discrimine ἀνοία καὶ μάρωσις distinguuntur. Iam uerò differt ἡ ἀνοία ἀπὸ τῆς παραρροσίουνης, quod ut scribit Galenus illa quidem abolitio sit, hæc uerò functionis ratiocinatricis, aut imaginatricis etiam deprauatio, quodque ut ait Aëtius, *Stultitia* contentanea dicit & facit: delirium autem, quod & λήθῃ & παραρροσιὴν uocatur, non seruata rerum consequentia, alium aut sermonem implicet, qui nihil ad rem faciat, & delirium quidem ut plurimum senibus, μάρωσις autem & pueris & adolescentibus, & reliquis ætatibus à morbo accadat.

Fauces, sunt internus oris locus, ubi simul conue-

niunt, & gulæ, & gutturis partes extremæ, 4. de loc. aff. c. 3. quas fauces *Pharynga* vocant, id est, præjacentem gulæ, & gutturis sedem, qua aperta videmus eundem amplitudinem, in qua gemina ostiola visuntur, tum gulæ, tum etiam gutturis, 3. progn. 16. vide *Isthmus* & *Pharynx*.

Fauus, qui & *Κερίον*, & *μελίμυς* dicitur, vide *Achæres*, & *Cerion*.

Feboire existimamus, non eum modò qui in cute corporis exteriori igneam habet caliditatem, verùm eum cum primis, qui eam, in corporis intò, & visceribus continet, com. 1. in 1. prorrh. 7.

Febris, secundùm communem omnium hominum consentum, est caliditas præter naturam, maxime quidem in totum animal effusa: sin minus, at omninò vel in plurimis partibus, vel in nobilissimis accensa, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29. cum is calor adeò auctus est, ut & hominem offendant, & actionem cordis lædat, 8. method. c. 1. siue idem calor ipsam cordis corpus occupauerit, siue eos, qui in eius ventriculis continentur humores; 1. de diff. febr. c. 1. & 3. de tur. per sangu. cap. 5. *Febrem* autem dicit Hippocr. a feruore, & igne dictam; uti nomen *ἡνέπρεσ* dicitur *ἀπὸ τοῦ πυρός*, id est, ab igne, siquidem Febris essentia calorem igneum habeat; 3. de fract. 8. de caus. morb. c. 2. Genere quidem intemperies est; habetque substantiam in calore præter naturam positam; non modò intensiōe, sed genere etiam diuerso a calore nativo: Sola quidem intensiōe in hecticis & diariis videtur differre, sed in putridis toto genere. Hic in corde primùm concipitur, tanquam in primo febrium subiecto, indeque per arterias in corpus vniuersum facillè spargitur. Neque enim cor solum febris subiectum est, sed reliqui pariter corporis spiritus, uel

Vel humores, vel solidæ partes. Sunt autem februm multiplices differentiæ, quas omnes Hippoc. ut ait Gal. breuiter complexus est, lib. 6. τ' επιδ. his verbis: *Februm hæc quidem manu sunt mordaces, hæc verò mites; hæc autem non mordaces quidem, sed post insurgentes: alia vero acuta, sed quæ manu succumbunt, alia sunt statim exardentes, quædam semper pusilla, sicca quædam salsuginosa, quædam flatibus plena, aspectu graues, nonnulla ad tactum humecta, nonnulla vehementer rubida, aliquæ vehementer pallida, aliæ liuida; & alia eiusmodi.* His enim verbis præcipuas februm differentiæ comprehendit.

Febris ab apostemate (quam febrem phlegmonodem vocat, 14. meth. c. 9.) est, cum aliqui, vel ob inflammationem obortam, abicestum, dolorem, vel erysipelas, lateris, pulmonis, vel alterius partis febricitant; licet Veteres eos non simpliciter febricitare, sed vel pleniticos, peripneumonicos, lienosos, simpliciter dicerent, 4. aph. 73. Eadem etiam febris accidens dicitur, si post sensibilem alicuius membri aduenerit affectum; alioquin ægri-tudo, & passio censenda est, de diff. morb. cap. 5. & com. 1. de morb. vulg. 29.

Febris accidens, vide Febris ab apostemate.

Febris ricinastica, Anabatica, Epacnastica, Paracnastica, Homotona; Causon ardēs, deurens, continua, ἀπαστικὴ καὶ ὁμοτονὴς, ἀναβατικὴ καὶ ἐπακναστικὴς, παρακναστικὴς, καὶ συνεχὴς, Græci vocant, vide Continua febris.

Febris Amphimerina. ἀμφιμέρινη, vide Amphimerib. febris.

Febris Cathemerina, vide Cathemerina febris.

Febris colliquatina, συσπικτικὸς πυρετός, ex genere est februm; quas *Marasmodes* vocant, hoc solo excepto, quod quæ portio carnis in his colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur, adeoque euaporat, in illis in

ventrem defluit; in ardentissimis enim febribus, si carnes humidæ, ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas, unde postea in *Marasmodi* febres transeunt, in quibus sicciores carnes redduntur, & corij ritu durantur, nec defluit in ventrem vlla ex his sensibilis liquatio, 10. meth. 11. Idque fit, cum corporis humores tenucs fuerint, & febris calor acris; nam euaporantur, qui ita extenuantur, per insensibilem euacuationem, 2. de rat. vict. 47. Præcedit ferè semper colligans febris, deinde *Marasmodi*, exhaustis iam prorsus humoribus consequitur.

Februm confusio, vide *Complexio februm*, *ἡ ἀπὸ πολλῶν*

Febris Diaria, vide *Diaria febris*.

Febris diurna, & nocturna, quam Græci *Cathemerinam*, & *Mathemerinam* vocant, est febris quotidiana, quæ nocte, vel die remittit quidem, sed non intermittit; quæ verò remittit, & ad infébricitationem venit, *Amphemerina* dicitur, com. 3. in 1. de morb. vulg. 2. & 9. vide *Amphemerina*.

Febris Ephemera, vide *Ephemera febris*.

Febris facta & siens, vide *Febris schetica*.

Febris focus, est ea animalis particula, quæ prima, solida sua in substantia immodicè fuerit calefacta, quod in ethica febre primùm est Cor, tum Iecur, tum Venter, tandem quæcunque aliæ in consensum Cor abripiunt, lib. de Marcore, cap. 7. *Focus febris* est particula, quam vel obstructio, vel putredo, vel phlegmone obsederit, 11. method. 20.

Febres Hæticas appellant, quæ solidas animalis partes occupant, sic dictæ, vel quoniam firmæ, ac solutæ difficiles sunt, (quemadmodum habitus) aut quoniam ipsum corporis habitum, comprehendunt, 1. de differ. febr. c. 7.

Febris

Febris Hæctica exquisitè, est, quæ nullum particularis accessionis, aut principium, aut incrementum, aut vigorem, aut denique remissionem habet; à solo autem cibo assumpto, *Hæctica febres* efferuescunt, quo incremento ablato, alias ex toto æquales semper perleuerant, lib. de marcore, cap. 8. *ἑκτική*, geminam habet significationem. Vna quidem dicitur omnis febris solutu difficilis, siue sit pituitosa, siue melancholica. Opposita est τῇ *ῥητική*, hoc est, feбри solutu facili: Vt enim *ῥητός* qualitas est a subiecto facillè mobilis; *ἑκτός* verò ægrè mobilis: sic *ῥητική* & *ἑκτική* inuicem opponuntur, vt scribit Gal. lib. 8. method. med. Altera verò significatione, speciatim magis dicitur, quæ & putrida & diaria opposita sit. Retinet tamen eandem nominis rationem: sicut enim *ἑκτός* ægrè separatur à subiecto, sic *Hæctica* curetu difficillima est: vel *ἑκτική* dicitur, quod in habitu corporis, vt supra dictum, quem *ἑκτός* appellant, tanquam in subiecto consistat.

Febris Helodes, quæ & *Typhodes*, & *Humida* dicitur est, cum a prima statim die ægrotantes sudant, sudoreq; ipso, aut parùm, aut nihil leuantur: E contra, sicca, in qua sitis vrget vehemens, ac scabra visitur lingua, duraque tanquam Corium cutis, plurimusque adest in corpore squalor; aduersus Lycum, cap. 2.

Febris Hemitritans, vide *Febris semitertiana*.

Febris Hepiala, *ἡπιάλας*, ex genere est quotidianæ, quando simul ægri rigent, & æstuant, atque eodem tempore in toto corpore vtrumque sentiunt affectum, 2. de diff. feb. e. 6. quæ & *Epialus* appellatur, lib. de inæq. intemp. c. 8. De genere autem quotidianarum esse, non potest esse obscurum, quod a pituita vitrea, & acida oriatur; Nam vbi ea moderatè, aut potius dimidio tui putret, febrim excitat *Epialam*. Febris quidem oritur à

portione vitreæ pituitæ incensa & putrente; frigus verò a reliqua eius parte non putrente nec incensa, sed frigida manente. Siquidem non putris pituitæ pars per omnes venas vel vniuersum corpus dispersa, rigorem concitat: quæ verò iam putruit, febrem accendit, non aliter quam si pituita vitæ, & bilis flaua simul abundarent, & per partes sentientes mouerentur. Frigoris ergo calorisque sensus in *Epiala febre*, eodem tempore, eademque parte contingit, eoque a *lpyriis* & reliquis febribus differt, in quibus vel interna vruntur, cum extima frigeant, vel ardor summus in visceribus est, cum extremæ partes algeant. Nam quod in his maioribus portionibus accidit, hoc in *Epialis* contingit exiguis portionibus, eoque vniuersum corpus pariter ambo perlescit. Quidam aiunt sic vocatam hanc febrem ἀπὸ τῆς ἡπείρου αἰὼς, quod mare in summa etiam tranquillitate perpetuò agitetur: vel παρὰ τὸ ἡπίως αἰετίνην, quod molliter & moderatè incalescat.

Febris homotona, vide *Continua*.

Febris horrida est, in qua magna accessionis pars horrore consumitur, 2. de diff. febr. cap. 8.

Febris humida, vide *Helodes*.

Febris hyemalis, ea est apud aliquos, quæ hyeme fit; apud alios ea, quæ hyemis tempore est peculiaris, 4. rat. vict. 61.

Febres liuida, à colore cognomen adeptæ sunt; ægrum nimis cutis tota liuida, & labia, qualia exesis moris esse solent, & oculorum album liuescit; quæ sanguinem succum deficere nunciant, & cum ipso itidem ingenitum calidum summè exhaustum, atque idcirco mortiferæ sunt, ex quibus nonnullæ syncopas etiam efficiunt, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris lpyria λειπυρία, est, in qua intus in ipsis visceribus,

ribus, calor sentitur vrens, adeo ut neque valde subtile
lium vestimentorum, neque linteolorum velamenta,
neque aliud quicquam præter nuditatem ferre possint;
in externis autem partibus, frigus adest, lib. de inæquali
intemp. cap. 8.

Febrem magnam, aut parvam, consueverunt Medici
appellare; non proprie quidem rei quali nomen quanti
accomodantes; hoc tamen facere assueti, non in febris
bus tantum, sed in mille aliis rebus, quæ licet in qualita-
te subsistant, *magna* tamen, ac *parva* dicuntur, 1. de differ.
febr. cap. 1.

Febris marasmodis, siue Febris Marcida, est, in qua
omnes corporis partes æqualiter marcescunt; lib. de
marcor, cap. 5. vide *Marasmus*.

Febris marcida, apud Philippum idem est, ac Ex morbo
senium, quamquam eam Galenus non vult febrem dici,
tamen in ea frigidius, quam natura postulat, cor sit factum
ostendunt id, pulsus parvus, & rarus redditus, respiratio
parua, tarda, ac per longa intervalla, quæ & ipsa cordis,
& partium ad cor pertinentium frigiditatem indicat,
lib. de marcor. c. 3. *Senium* igitur ex morbo, quoniam in
nullo frigiditas siccitati adiuncta est, febris non est; sed
tantum febris dici potest marcor, qui & Torridus di-
citur, & Marcor syncopticus; his enim ambobus est
pulsus frequens, & parvus, ægrique, dum oscitant, spiri-
tum effiant calidum, ut iure ipsum ardori, & æstui assi-
milare possis, qui marcor torridus, & caliditate, arden-
tissimi que febribus, præsertim in sicciori corporis ha-
bitu, fit; frigidus autem marcor senilis, sit ex permuta-
tione febrium, quæ tum per aquæ frigidaë potionem, tum
per auxilia, quæ refrigerandi gratia Hypochondriis,
ac thoraci imponi solent, fuerint secus, ac oportet refri-
gerata, lib. de marcor. c. 3. vide *Ex egritudine senectus*.
Febris

Febris Methemerina, μεθιμαρνος πυρετός, vide *Febris diurna*.

Febris mitis est, quæ Medici manum non mordicat, neque exurit, aut ferit admodum, sed vaporem adeo minime mordacem exhalat, huiusmodi est *Diaria febris*; *mitis* autem dicitur non simpliciter quidem, sed per comparisonem cum febribus ardentibus; si quidem febrilis omnis calor, sit ignius, acer, & mordax, sed hic magis, ille minus; vide *Febris simplex*.

Febris modos, nonnunquam *mores* vocant, nonnunquam *differentias*, vel *essentias*; cum E. G. dicimus, febrem boni, vel mali moris, esse benignam, vel malignam, i. de morb. vulg. 10.

Febris Pemphigodes, πεμφιγώδης, est, quæ per caloris intensionem, pustulas in ore, quæ Græcis φλυκτιδές dicuntur, generat, lib. fin. Insuper *Pemphigodes febres*, per spirituum effluuium euanescentes interpretantur: sentimus enim plerumque per febricitantium cutes, aerium quandam halitum effluentem. Dicitur quoque *Pemphigodes*, flatulenta febris, vel flatuosa, sed hanc plerique vario modo interpretati sunt. Quidam *Diariam febrem* intelligunt, natam ex spiritibus accensis, quæ & πυρρὴ τώδης; alii, *febrem inadentem*, & *humidam*, ab effluvio quodam vaporoso, per cutem erumpente: alii, eam *febrem* sic vocant, quod veluti exilientium, & manui occurrentium scintillarum opinionem præbet; vel ita appellatur *pestilens*, ἡ καὶ πνευματική, idest, quæ cum pustulis efflorescit. Quanquam possit etiam per *Pemphigodem febrem* intelligi *synochus non putris*, quæ ob id *inflata* vulgus Medicorum vocat, quod sanguinis calore febrilis feruentis copia, venæ omnes plurimum sint inflatæ, & sanguine flatuoso, & bulliente, plenæ. Verum Gal. in eam sententiam inclinat, ut *Diaria* intelligatur, quæ in
spiri-

Ipiritibus accensis , & rarenter putrentibus subsistit.
com.1.in 6.de morb.vulg.29.

Febris pestilens est , quæ a calidiori ambientis aeris constitutione (qualis maxime circa Canis ortum contingit,) vel a putrescibili vaporatione manifestè cor calefaciente, excitatur. In febribus omnibus simul cor affici, est necessarium , & cum supra modum incaluerit, ipsum primum atque potissimum febrilem calorem suscipere, atque ad vniuersum corpus transmittere , r. de diff.febr.c.4. vide *Endemus*.

Febres putridæ sunt, quæ ex humorum putredine accenduntur, cum rigore, extremorum frigore, vel horrore incipientes, inæqualitatem pulsum habent & calorem, siue in principio, siue in augmento acrem , & mordacem : Systole est velocior ipsa diastole , urinæ crudæ, eiusdem febris declinationem integra non subsequitur quies, 1. de diff.febr.cap.7. Generantur autem à precedentibus causis, non à præcipientibus, quæcunque enim in ipso animali sunt , vel dispositiones vel motus præter naturam, ægritudinem præcedentes causas nominant; quæ verò extrinsecus adueniunt, & alterant corpus, atque transmutant naturam vehementer , præincipientes, appellant, de caus.morb.c.2.

Febris putrida intermittens, est, quæcunque ad sensibilem in febricitationem peruenit, ortum habens ab humore putrido, qui per omnes corporis partes expultrice vi defertur, 2. de diff.febr. cap.1. cuius tres sunt omnino differentiæ, quotidiana, tertiana, quartana; quotidiana; quæ pituita putredine est; ex utriusque vero bilis flauæ quidem, tertiana; nigræ autem, quartana, 2. de differ.febr. cap.2.

Febris quartana, vide *Febris putrida*.

Febris quintana, sextana, septimana, est, cum egri non prorsus

prorsus ab affectione morbosa sunt liberati, sed semen aliquod retinuerunt; his vsu venit ed victum conuenientem negligentioribus, sæpè sexto die à principio febricitare, sæpè septimo, non raro octauo, vel alio; & cum febris stata periodus cessauerit, putantibus se prorsus esse liberatos ægris, eodenuque omnino victu vtentibus, ex semine morbi reliquo, totidem diebus affectio febrilis prima redit. Non igitur ex vi morbi hic circuitus datur, sed ex residuo affectionis, & inordinato infirmorum victu, comm. 2. in 1. de morb. vulg. 7. De quintana quidem Hippoer. scripsit, lib. de morb. vulg. 7. Negat tamen Galen. visam a se, nisi obscuram valde & difficilem. Hippocratis verba de ea habentur: *Quintana pessima est omnium; etenim & ante tabem, & iam tabidis superueniens, perimit.*

Febris quotidiana, vide Febris putrida intermittens.

Febris remissio, vide Infebricitatio, totum illud tempus est, quod accessionem sequitur; quod tempus alii interuallum, alii, declinationem, submissionem, vel ablationem nominant, de morb. temp. cap. 6.

Febris reuersua est, non acuta, sed diuturna, imperfecta habens solutiones, quæ postea rursus exoriuntur.

Febris sanguinis, est Febris simplex, synochus non putrida, dicta, in qua sanguis secundum naturam se habens, accenditur quidem, sed non putrescens generat febrem similem Ephemeris, & quæ ex inflammationibus inguinum accidit: nam & inguinis inflammatio, ex bono sanguine, sed accenso, fit, 2. de cris. 12. Putrescit quidem interdum sanguis, sed ex eo simplices nunt febres, quam ex aliis humoribus; similem verò accessionum proportionem assumunt, qualem tertianæ febres ostendunt. Quod si sanguis supra modum alicuius pars eius subtilior, ac pinguior, in flauam omnino conuertitur.

vertitur bilem, quæ autem crassior, in atram; ut in carbunculis contingit, in quibus sanguine supra modum effervescente, ad melancholicum humorem fit transmutatio, 2. de differ. febr. cap. 9. Præsentem itaque febrem videtur reponere in ordinem febrium Synocharum, non putridarum, quo etiam numerat febres diarias, 9. meth. 2.

Febris sebetica, quæ faciliè discutitur, opposita est *Febris hestica*, quæ difficulter soluitur; ut enim illa sit, ita hæc facta est, 8. meth. 1.

Febris semitertiana, siue *Hemitritans*, ~~est~~, est, quæ ex quotidiana, continua, & tertiana intermittente, complicatis confunditur, 2. de diff. febr. c. 7. Fit ex pituita & flava bile sibi proportionem respondentibus, & æquipotentibus, ibid. cap. 8.

Febris significatio, quæ Græcè *ἐμπνημία* dicitur, est primus insultus, accessionis tempus in animo, exactè iam primum, libr. de morb. temper. cap. 6. in quo ægri solent horrere, refrigerari, oscitare, pandiculari, dormire, aut alia quædam his similia pati, quæ & *Annotatio* dicitur, 2. aph. 1. vide *Insultus*.

Febris simplex dicitur, quæ a primo statim die, etsi acuta est, non tamen supremè, sed simplicissima, & cum tutissimis signis inuadit, quam Hip. *ἁπλῆ*, id est, *mitem*, nominat, seu *boni moris*, 1. de crit. e. 16.

Febris singultuosa est, in qua ægri singultiendo, rodentem, acerrimumque humorem vomunt, a quo singultu non liberantur, nisi febris in totum soluta sit, vel propè, 4. acut. 69.

Febres spirituosas quidam nominant (quas *Pemphigæ* aliter appellant) ob difficilem anhelitum, in quibus siquidem magnus creberque spiritus redditur, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris syncopalis, συκοπῆς πυρετός, est, ubi propter maximam crudorum succorum copiam, una cum oris ventriculi offensione, præcordia inflantur, totum corpus ampliore mole, quam pro naturæ modo, cernitur, cum color ad albidius, vel liuidius, vel nigrius, seu plumbei coloris tendit, pulsus minores, obscuri, & inæquales, & syncope etiam solet apprehendere agros stomachica, 12. meth. 3. Est & aliud syncopalis febris genus, quod non ex crassorum, & crudorum succorum copia fit, sed ex tenuibus succis, qui ocissimè exhalant, in qua ægri syncope similiter opprimuntur, 12. method. 6. Priorem vocat Auicenna *syncopalem humorosam*; posteriorem, *syncopalem minutam*.

Febrem synochon Græci Medici eam appellant, in qua una similisque ferè accessio ab initio ad finem perpetuò manet: cum enim accessionis remissio ex feruentium humorum transpiratione contingere soleat; non transpirant autem in vehementi stipatione, qualis est in *Synocha*; necesse est igitur multorum dierum febrilem fieri accessionem, 9. meth. 2. Vel ea est *febris synochus*; quæ omni magna mutatione usque ad iudicationem caret, hæc à Latinis *continens* dici potest. Cæterum, etsi sit idea huiusmodi febrium, à qua synochos eas nominant: natura tamen earundem minimè simplex, unaque est; quædam namque earum manifestam habent putredinis notam, quædam verò prorsus non habent: quæ ex diariarum febrium genere sunt, illas vocamus *synochos putridas*, has, *synochos non putridas*; Barbari hanc vocant *synocham*, illam, *synochum*; Galen. 9. method. & 2. de differ. febr. indiscriminatim, utraque voce utitur, & *synochi*, & *synocha*, utraque sub *synochi* nomine comprehendens. Atqui *synochus febris*, & *synoches*, Græci συκοχός, & συκοχίς, hoc est, *Continens*, & *Continua*, dicunt, ferunt,

ferunt, quod in *synocha* nulla sit feruoris remissio: in *synochis* autem singulis, accessiones in remissionem sensibilem terminentur; neutra tamen ad infebrecitationem peruenit, 2. de cris. 5. vide *Synocha*.

Febris tabida, vide *Marasmus*.

Febris tertiana exquisita, est ea, quæ tertio quoque die accessionem faciens, intermittit, cum breui accessionis tempore, cum frigore inuadens, sudore, bilis vomitu, & biliosis excrementis terminatur in infebrecitationem à bile putrescente fit, cui si aliquid horum defieit, non exquisitè, sed simpliciter *tertiana* dicitur, quod si intermissio sit inior, & accessio longior, dicitur *tertiana extensa*, 2. de diff. febr. 8. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 25. vide *Febris putrida intermittens*.

Febres Tritaphyes, τριταφύεις, hoc est, tertianarum naturam referentes sunt, quæ tertio die inualescunt, 2. de diff. feb. c. 2. vide *Tritaphyes febres*.

Febris Typhodes, τυφώδης, vide *Febris Helodes*.

Fellis folliculus, est Vesica fellis, 5. de loc. affe. 7. vide *Cystis*, & *Chaledocos*.

Femen, vide *Interfemineum*, & *Perinaon*.

Femur, à Ferendo, quod totius corporis reliquum ferat, & sustineat veluti onus, idem ferè quod Crus, Os, magnitudine cunctis animantis ossibus præstat, supra coxendici, infra tibiæ ossi alligatur, cuius ceruicis duo sunt exigui processus, quos *Trochanteres* vocant, quorum exteriorem, qui longè maior est, *Gluton*, hoc est, *Natem*, appellant, lib. de ossib. cap. 21.

Ferina desipientia, vide *Desipientia ferina*.

Fermentatio, vide *Feruor*, & *Zymosis*.

Feruor, siue *Fermentatio*, affectus est, ab atra bile proueniens, ubi amplius incaluerit, aut propter putredinem aut febrem phlegmonodem, quàm nullum animal,

mal, ne ipsi quidam mures gustauerint: terra quoque raditur ab ea, ac partes, quæ ab atra bile raduntur, omnes in altum attolluntur, 14. meth. c. 9.

Fibra seu *Villi*, sunt tenues quædam, & subtiliores nervorum & ligamentorum propagines, aponeuroses, & deneruationes, quibus opitulantis (perinde vt manus digitis) nervi & muscoli actiones suas obeunt, 9. de usu pant. 2. & 1. de placit. cap. 10.

Fibula, vide *Cneme*.

Ficatio, vide *Sycosis*.

Ficatum, idest, *Iecur*, sic dictum est, quod omnium animalis partium compactissimum ad coquendum difficile, tardeque perineet, propterea inactandi animalis iecur, multarum ficuum siccarum esu præparatur, vt euadat seipio melius, cum animal ipsum caricas affatim comederit; qua sola ratione factum est, vt hanc appellationem sortiretur, 3. de alim. fac. cap. 12.

Ficosus tumor, est tumor in inento, natus ex crassiori humore, & serosiori tenuitate, quam Varus, 5. de comp. me. 10. loc. cap. 4.

Ficus in oculo, est Tuberculum quoddam à crassiori humore oculi partibus affectis adhærescente, com. 3. in 3. de morb. vulg. 48 & Græcis, σίκα & σικώσις, eruptiones ulcerosæ sunt, rotundæ, subduræ, rubicundæ, quas dolor comitatur; fit hoc malum magna ex parte in capite, sed & reliquo etiam in corpore; fit etiam in ano, & *Marisca* dicitur; in palpebris adhuc fit, & dicitur etiam σίκαις, quod scilicet ficus granorum referat similitudinem, vnde *ficofam* appellant *palpebram*.

Fistula, *Σύριξ*, est angustus, & longus sinus, lib. de tumor. cap. 5. per translationem dictus a Musicis instrumentis, quæ oblonga obtinent caua, & *Fistula* nominantur, 2. prognost. 64. Nascitur vt & sinus ex abscessu.

Præcipua eius substantia callus est, materia autem humor melancholicus, qui discussis & per halitum digestis tenuioribus humoribus remanet: itaque in genere tumorum præter naturam continetur, quamvis ob manifestam continuam solutionem, inter ulcera potius quam inter tumores numeretur a præstantissimis etiam Medicis. Duæ eius produntur differentiæ, cæca, quæ osculum in profundo sinum ad superficiem habet; occulta, quæ & os & sinum obtinet in profundo.

Fistula urinaria, quæ *Urethra*, *ὑρῆρα* dicitur Græcè, est meatus urinæ reddendæ accommodatus, qui in pene est, a ceruice vesicæ ad extremam usque glandem porrectus. Hic in viris longus, angustus, & S. Romanæ literæ modo obliquus est: In mulieribus verò, brevis, latus, & rectus. Ex nervosa tunica contextitur instar coriaccæ fistulæ, 4 aphor. 76.

Fistulosus, seu *flatuosus nervus*, vide *Cavernosum*.

Flatuosus morbus, vide *Hypochondriacus*.

Flatuosus spiritus, qui & *Flatus* dicitur, tumorem excitans flatuolum, crassus ac vaporosus est vapor, neutiquam tenuis; ille enim Aeris, qui Austrinis constitutionibus fit; hic verò, qui Aquilonaribus regnat, assimilatur: estque hic is, qui in nobis secundum naturam est, spiritus, & proin conservandus, ille verò ceu crassus, extenuandus, ac corrigendus, 2. ad Glauco. 6.

Flauabilis, vide *Amara*.

Flexus varicosiformis, est plexus ille uenarum, & articularum in testibus multipliciter flexarum, in cuius primis flexuum partibus sanguis sincerus continetur, qui certè in ultimis eiusdem flexus uasis, ad ipsos testiculos non amplius ruber planè est, sed iam quodammodo albicat succus is, qui in ipsis continetur, exiguum adhuc requirens ad perfectam substantiæ seminis generationem.

quòd ei à testiculis ipsis accedit, 9. de usu part. cap. 4. vide *Glandulosi assistentes*.

Fluctuatio cum sonitu, Græcè *καύδων*, symptoma est facultatis concoctricis, & reteutricis, nec arctè satis, nec sufficienti tempore complectentis, eamque ob rem insufficienter etiam concoquentis alimentum; unde eo diutius in ventre grauitas ex alimento manet, quo tardius concoquitur, præsertim cum nihil in eo contingitur, quòd verti in flatum possit, aut cum ventriculus vehementer fuerit perfrigeratus. Nam si quid in eo hæsit, quòd possit in flatum conuerti, flatus non *καύδων* excitabit, nisi sit admodum refrigeratus. In flatulenta enim materia flatus fiunt a debili calore: a nullo autem calore nullus flatus est: itaque rationabiliter ventris imbecilli symptoma creditur. Interim enim cum minimum ciborum assumpsimus, non fiunt eiusmodi fluctuationes, complectente prorsus eos ventre, ac vndiq; constringente. Interim plenus cibo venter est, sonitus tamen fluctuantis in eo humoris veluti ex vacuo exaudiuntur. Cum enim pro sua natura se habet, ac constrictoria vi ritè vtitur, quamlibet exiguum sit quod in se continet, totum id vndique complexus, nullum vacuum relinquit locum. Cum imbecillus est quacumque parte complecti exactè assumpta non valet, ibi laxum quoddam spatium efficiens permittit ea quæ in se continet humida, pro figurarum varietate ex alio loco in alium transire, ac fluctuationum sonitus edere. Itaque qui hoc sympt. laborant, non possunt concoquere sufficienter, & eo diutius in eorum uentre grauitas manet, quò tardius concoquunt.

Fluxio, quædam est inflammationum causa, nempe quæ perinde vt inflammationes, non admodum occulta, tamen quandoq; nulla sensibili fluxione præcedente,

te, membrum confestim patitur inflammationem. Affectio, inflammationē, quæ generat, *Rheuma*, idest, *Fluxio* vocatur: ipsa verò passio, *Dispositio rheumatica*, 2. ad Glauco. 2. *Fluxio* adhuc simpliciter dicitur, pilorum defluuium, quod tabescentibus magna ex parte, atque ex diuturno morbo conualescentibus, euenit, lib. finit.

Fluxiones ventris, vocat Hippocr. cum semper, & assidue humida deiciuntur excrementa, sine tenesmo, & lienteria, 1. de morb. vulg. 36.

Fluxus, est tenuium humorum delatio, quam cohibere nequeas, non ex nostra voluntate proueniens, lib. fin.

Fluxus hepaticus, est, in quo ob imbecilitatem hepatis, ab intemperie frigida inductam alui sedimenta, aquæ, in qua nuper macerata caro abluta est, redduntur simillima, 15. de loc. aff. 7.

Fluxus muliebris, est sanguis albi saniosi ex utero profluuium, 9. simplic.

Focile maius, & minus, vide *Cubitus*.

Focus febris, vide *Febris focus*.

Fœtus, (quo tempore in utero semen, seminis speciem refert, ut in abortu, & dissectione visum est) ab Hippocrate vocatur, ubi semen in uterum injectum, sanguine repletum fuerit, & Cor, & Cerebrum, & Iecur, indistinctam quidem adhuc, & informem quandam tamen coagulationem, & magnitudinem alicuius momenti præ se tulerint, carneaque appareat fœtus substantia, & non amplius seminalis; unde neque *genituram* amplius talem formam appileat Hippocrates, sed *fœtum*, 1. de sem. cap. 9.

Folliculus fellis, vide *Fellis folliculus*.

Fomenta, & Forus, sunt, qui per spongas calida aqua decoctionis alicuius simplicis imbutas, & expressas, alicui corporis parti fiunt, 2. de loc. aff. 1.

Foramen cæcum, idest, *Auditorius meatus*; vide *Auditorius meatus*, & *Cæcum foramen*. *Cæcum* verò dicitur, non quod reuera cæcum sit, sed ob flexuosam meatus auditorij obliquitatem, quæ causa est, cur funiculum, aut fetam porcinam in hoc ipsum foramen immittam, trāsmittere non possis, 9. & 11. de vsu part.

Foraminulenta ossa, vide *Cavernosa*.

Foratio, est idem quòd *Perforatio*, siue *Trepanatio*, qua utimur in fracturis capitis, eum usque ad Cerebri membranas, Caluariam diuidimus, 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Formatrix virtus, est, quæ iactò in vterum semine, siue in terram, statim temporibus vniuersas & singulas conflat partes eius, quòd gignitur; quæ est optima, & summa ars, quæ omnia alicuius gratia molitur, sicut nihil otiosum sit, aut superuacaneum, 1. de nat. fac. c. 6.

Formica, quæ & *Myrmecia*, & *Sessilis verruca* dicitur, 2. meth. 2. vide *Myrmecia*.

Formicans pulsus, vide *Vermiculans*.

Fornices, seu *Testudines*, quas Græci *Ψαλidas*, & *Λαονότα* vocant, est forma, & figura concava, figurarum omnium ad patiendum difficillima, qua forma multa ædificia configurantur, ad cuius similitudinem, pars Cerebri intrinseca quædam efformata, *Fornix* dicitur, 11. de vsu part. cap. 15. vide *Camarion*.

Foveola, est cauum vlcus, sed paruum in nigro oculi, lib. finit.

Fractura, vide *Unionis solutio*, & *Rhegma*.

Fractura caulatim, siue ad instar disruptorum caulium, & in medio perfracti raphani facta; vide *Abductio*.

Friccio, (quæ *τριβή*) *sicca*, est, cum corpus vniuersum solis manibus vel linteolo, nullo admisso humido aut pingui corpore, fricatur; cui opponitur *Friccio humida*,

mida, quæ fit per aquæ, & olei admiſſionem; vbi enim cum oleo aqua confunditur; haud facile ſolubili miſſione coit, ita vt quibus corporibus ita inungitur oleum; neceſſe ſit, & pluſculum inhærere aquam: ſola enim aqua, quæ foris circumfunditur, facile deſluit, & quæ in poros ingreſſa corporis, nullam habens anſam, promptè effluit, etſi oleum admiſceatur, 3. ſimplic. cap 25. Frictio duobus modis uſurpatur: vno quidem pro omni motu, qui extrinſecus, tam ſanis, quam ægris adhibetur ad cutem, quotiſ tempore: alterò verò vel pars eſt exercitationis, vel potiùs, vt ait Galen. exercitationi ſubſeruit. Hanc Gymnaſtæ, vt ait Galen. duplicem fecerunt, *παρασκευαστικὴν* & *ἀποθεραπευτικὴν*, hoc eſt, *præparatoriam*, & *recurratoriam*. Tota frictio præparatoria, quæ corpus ad exercitationem præparet, ne quid in ipſa vel rumpatur, vel obſtruatur, huc ſpectat, vt corpus molliat; quòd tamen non omnes præſtant frictiones. Nam cum ſex omnino ſint frictionum differentiar, mollis, dura, & inter eas media, multa, pauca, & in eo genere mediocris, dura ligandi, mollis ſoluendi, multa minuendi, mediocris carnem augendi vim habet, vt ſcripſit Hippocr. Altera frictionis ſpecies, quæ & ipſa exercitationibus ſubſeruit, *ἀποθεραπευτικὴν* dicitur, Recentiores, Gymnaſtæ, vt ait Galen. eam etiam *ἀποθεραπευτικὴν* vocauerunt, quòd totiùs Apothepiæ præcipua portio ſint frictiones, quæ poſt exercitationem adhibentur. Eatum uſus eſt, vt quæcumque excrementa per exercitationem caſeſceta extenuataque in corpore adhuc manent, foras euocentur, ipſæque partes ſolidæ per exercitationem tenſæ & induratæ emolliantur, & laſſitudo præterea tollatur. Id quòd fit, cum frictionibus cuiq; corpori conuenientibus, vñ cū partium ipſarum quæ fricantur tenſione, & ſpiritus cohibi tione, cum pluſculo etiam oleo.

Frigus, χερμίν, non eodem modo in sanis, & ægris sumitur : in ægotantibus enim aliud est rigere, aliud horrere, aliud algere ; sæpè enim accessionis insultus cum rigore, alteri cum horrore, alteri cum sola frigiditate suboritur . Quod si quis cum nulla concussione, & agitatione corporis perfrigescit, nec corpus, nec omnino cutis inæqualiter, & præter voluntatem eidem moueatur, *Perfrictio* dicitur, non hic tamen riget, nisi motum concussionis inæqualem, & cutis, & totius corporis sentiat, isque *Rigor*, ρίγος, dicitur; si autem cutem quidem perturbet, & per quosdam insultus quatiat, corpus autem totum non commoueat, *Horror*, & *Horripilatio*; Græcè *ορμη* nominatur, & proin *Horror* affectus solius cutis talis existit, qualis totius corporis passio existit *Rigor*, lib. de trem. & palp. c. 6.

Frons, Μέτωπον, est pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usque protensa, substantia musculosa, & osse subiecto (quod *Coronale* vocant) constans, superposita superciliis, pilis nuda, inter utramque aurem sita, *Introd. cap. 10.*

Eugaces fructus, qui & *Horarij*, & *Horæi* dicuntur, sunt, qui nascuntur eo tempore, quod *Horam* vocant: Est autem *Hora* Græcis id anni tempus, in cuius medio *Canicula* exoriri contingit; Tempus autem idest, dierum quadraginta, quo tempore *Horarij fructus* constant, nonnulli iam declinantes, alii incipientes, alii in suo vigore, aut ultra vigorem, aut citra consistentes. Vocant autem ipsos *Horarios*, non solum quod dicto fiant tempore, sed (vt mea tert opinio) vt ita ab his, qui ad repouendum sunt idonei, distinguantur, quando & triticum, & hordeum, semina cerealia, & omnia æstiuam quidè atque anniuersariam habent generationem, sed non cito corrumpuntur; vti propriissimè *Horarij dicti fructus*.

Ficus, vt Cucurbitæ, Mora, Pepones, Melo pepones, Persica, & alia id genus; quæ si quis in hyemem seruare volens, exsiccata repoluerit; eo etiam modo veterem naturam in contrarium imitabuatur; 2. de aliment. fac. cap. 2.

Fuliginosus vapor est, qui ex deustione assilatorum eleuatur, lib. de vsu puls. 7.

Fuligo, vide *Fumus*.

Fumus & Fuligo, vapores sunt, qui eleuantur, ille quidem ex materiis semiuistis, hic verò ex immodicè assis, vtilisque. Est namque fuligo, vapor terrestris, fumus, mistio quædam ex terrestri, aqueaque substantia, 8. meth. 5. vtrumque materiæ, ex qua oritur, adustum excrementum, quod in sublimetur, significat, non secus ac in febribus fuliginosum excrementum, expiratione, & contractione arteriarum, natura ex corpore expellit, 3. de prælag. ex puls. cap. 7.

Fulua, vide *Dichroma*.

Funis brachij vena, est pars venæ humeralis, quæ protenditur, secundum diuersas adiutorij, id est, ossis humeri partes, lib. de anat. viu. & de ratione cur. per sang. c. 16

Fungos, vocant crassas palpebrarum eminentias, item ex capitis vulneribus quæ nascuntur, *πλασθήματα σαρκώδη*. Galen. com. 3. in 3. de morb. vulg. 94.

Furcula superior, & inferior, vide *Claues*.

Furfuratio, quæ & *furfur*, & *πιτύρα*, est, cum quibusdam se scalpentibus furfuribus similia, ex capitis cute decidunt, à vitiatiss succis nutritiis prouenientia, 1. de comp. med. loc. 6. quæ & *Pityriasis* dicitur, & *Porrigo*. Hæ quasi squamulæ interdum madent, multò sæpius siccæ sunt: idque euenit modò sine vlcere, modò ex ulcerato loco, huic quoque modò malo odore, modò nullo accedente. Idem malum ferè in capillo fit, rariùs

in

barba, aliquando etiam in supercilio, vel reliquo etiam corpore. Prouenit à vitioso corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso & melancholico sanguine caput subeunte, vt ait Paulus, vel a vitiosis serosis humoribus, vt Galenus & Aetius scripserunt. Nomen morbo inditum a similitudine.

Cum caput immensa pexum porrigine ningit,

Copia faris uti freudentibus edita saxis.

vt Quintus Serenus Poeta cecinit.

Furor, vide Melancholia.

Furor ἐρωτικός amatorius, qui ex amore fit, perinde atque ille, qui ex Musis *ὑποκτικός* dicitur.

Furunculi, *Δοῦλνες* Græcis dicti, tumores sunt præter naturam, ex genere phlegmonum ex similibus humoribus quibus Vari geniti, per Vniuersum corpus, duplices sunt, aliqui, vt ita dixerim, variosi, duri, & ægrè concoctiles: aliqui inflammatorii, adnexas habent febres, vbi tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur, 5. de compos. medic. loc. cap. 7. Estque furunculus *mitis* qui rem, cum in ipsa sola cute constituitur; *malignus* verò, cum altè exoritur, Phymati, idest, Tuberculo similis, a quo sola duritie differt, lib. de tumor. cap. 15.

Fusaneus morbus est, qui omni loco & tempore fit, lib. finit.

G

GALIANCONES, *γαλιάνκωνες* dicuntur ab Hippocrate, vt scribit Galenus, qui ob humeri caput in alam prolapsum dum adhuc crescebant, humerum breuiorem habent. Huius autem rei ille duplicem assignat causam, vel quòd dum in vtero sunt, humeri luxentur, vel quòd post ortum tenera adhuc ætate iuxta hu-

meri

meri caput in intimis partibus atque suppurationes oriuntur, siue lecentur, siue vrantur, siue per se pus aperiat, ut ab eo scriptum. Idem verò scribit sic appellari eos qui paruum & gracile habent brachiū, partes autem circa cubitum tumentiores in modum mustelæ, quam γαῖς appellant, a qua deductum hoc nomen esse videtur.

Ganglia, γαῖς, quæ Auicenna & Paulus vocant *Glandulas*, Apostemata sunt glandulosa, sicut Auellana, & Nux accidunt super manus, talos, & frontem, quæ si comprimantur, digitos effugiunt, & mox redeunt, & aliquando multiplicantur, læpèque impositione, & forti alligatione lamine plumbeæ curantur, & discutiuntur, passiones has etiam *Contractiones* vocat Galen. 5. de compol. medic. per gener. c. 7. Paulus lib. 4. cap. 14. Vocantur etiam & *Gangilia* quasi concretiones, & contortiones quædam, ex lento & mucoso humore accrescente, & conglomerato, quòd proprium nervorum alimentum est, 2. de art. 56. His ferè notisprehenditur: tumor est parvus, inæqualis, nullo præternaturam colore, dolorisque expers, nisi validè comprimatur: Verùm ne tum quidem vehemens sed stupidus dolor mouetur. Plerumque ex plaga aut lasitudine, raro sponte provenit; nec in alto, sed sub cuteradicibus agit, neque in orbem vel ad interiora posterioraque transferri potest, sicut Melicerides & Atheromata, sed si vim facias, ad latera tantum, hoc est, ad dextram vel sinistram pro nervi situ, moveri, & flecti potest.

Gangrana, γάγγραινα, est alicuius membri mortificatio, ex magnitudine inflammationis, quæ iam sit, non quæ tacta est, 2. ad Glau. 9. Nam cum omnino membrum affectum est demortuum, ita ut punctum, vel scutum,

uel

vel vñum non sentiat; quæ patitur, statim rescindere oportet, quæ sanam partem vicinam attingit, sed quòd ita affectum est denigratur; quòd verò in medio est constitutum, ita vt tendat ad mortificationem, *Gangrana* nominatur; ibid. uide *Syderatio*. Hipp. *Gangranas* quoque emortuarum venarum torporem nominat, qui ex nimia inflammatione consequitur, 2. de fract. 24.

Gargareon, siue *Gurgulio*, *Cion*, *Columna*, *Curgulio*, est ea gutturis pars, quæ Fauicibus, adjacet, cum secundum naturam se habet; cum autem morbo afficitur, ita vt eius extremitas phlegmone laboras, sit similis *Acino Vuæ*, dicitur *Vua*; quando tota hæc pars afficitur, *Cion*, *Columna*; dicitur & *ἰμάς*. *Ταρυαρίων*, *σαφύλη*, *Κίων*, & *Κιονία*, 4. de loc. aff. cap. 3. Id ipsum *Gargareon*, quia ad vocis modulationem fit, idè a quibusdam *Plectrum*, *πλῆκτρον* id est, vocis refractorium appellatur, 7. de usu part. cap. 5. Hanc eandem partem, *Columellam*, *Staphylen*, & *carnosam particulam summo ore dependentem* vocant, 6. de com. loc. c. 3. vide *Columella*, *Pharynx*, *Staphyle*, *Epiglottis*.

Gastrocnemion, est posterior carnosæ tibiæ pars, seu tibiæ venter, siquidem extuberat, propter musculorum eam tibiæ sedem occupantium crassitiem, (vt anterior tibiæ pars carnis expers, dicitur *Anticnemion*, *ἀντικνήμιον*) Græcè *Γαστροκνήμιον*, & *Γαστροκνῆμια*, *Sura* appellatur, lib. de musc. dist. 32. & 2. de anat. adm. cap. 4. Ea vni homini inesse dicitur, cum reliqua omnia animalia crura habeant sine *Suris*. vide *Sura*.

Gastrophia, id est, *Abdominis futura*. 5. de anatom. adm. cap. 6. *γαστροφάγια*, ventris vulnerati connexio.

Gemelli, vide *Vates Cerebri*.

Genæ, faciei pars, sunt quæ inter nasum & aures sitæ sunt, quæ benè coloratis, & ingenuis, pudore suffusis,

fi, rubent, quæ & *Mala* dicuntur, Introd. c. 10. Τίτλος significat *Maxillam*, tam superiorem, quàm inferiorem: additur autem ad distinctionem ἡ ἄνω, vel ἡ κάτω. Dicitur & alio nomine γνάθος, sed ambigua pariter significatio- ne, Vocatur ἡ ἄνω γένυς, hoc est, *Gena superior*, pars faciei fronti proximè subiecta, a tribus vtrinque, ab imo autem gingivis terminata. Non vnico osse, sed pluribus solidis, duris & lenibus constat. ἡ κάτω γένυς dicitur pars faciei infima & mobilis, dentes inferiores continens. Constat osse non simplici, vt plerique putant, sed gemi- no, sicut Hipp. & Gal. visum est, quorum distinctio me- dio in mento est, vbi Sutura apparet, in pueris quidem euidenter, in adultioribus autem paulò obicurius, quæ etiam in prouectis tamen coctura fatiscit. Alioer namq; ea duo ossa separari vix possunt adeò inter se τὴν συνήρῃσθαι coaluerunt.

Geneion, lib. de musc. dissec. cap. 2. vide *Mentum*.

Genitalis meatus, quem *varicosum assistentem* vocant, maxima illa via est, quæ genituram a testibus haustam, ad Colis radicem defert, 1. de semin. capit. 15.

Genitaram appellat Hippocr. illud, quòd in abortu reiectum, vel dilecto vtero exiens, seminis speciem re- præsentat, non autem animal constitutum: id quòd pri- mis duobus mensibus solet accidere, quo tempore neq; *Fœtum*, neque *Embryon* vocat, sed *Genituram*, 1. de sem. cap. 9. *Genituram* etiam aliquando appellat *Mem- bragenitalia*, in fœminis quidem vterum, in maribus vero leminaria vasa quæ nuncupantur, 3. de art. 41. vi- de *Cyema*: frequentius autem *Genitura* sumitur pro se- mine recenter emisso, vel in suis vasis adhuc contento, Græcè γόνι, Hipp. lib. de natura pueri.

Gena, Græcè γένυς, est femoris & tibie dearticula- tio, & artificiosissima connexio, in qua sinus est qui-
dam

dam prominens, alterius caput excipiens, quod anteriori parte, quod firmitus fieret, *Rotula*, seu *Pateſſa* munivit, quam *κύαλη*, & *επιγονατίδα* vocant, quæ prohibet, ne femur curuatus, aut per declivia currentibus loco excidat, & dilabatur, lib. de offib. c. 21. & 22. & lib. Introd. cap. 10. Est autem ea de articulatione omnium expeditissima, iuxta illamque, ut scripsit Hipp. lib. de fract. præterea firmissima, magnoque naturæ artificio comparata, ut quæ in ea epiphyſes & cavitates ita construxit, & ad amuſſim fabricata est, ut neque laxior sit Epiphylon in cavitates ingreſſus, neque etiam adſtrictior. Continentur autem & firmanur extrinsecus superciliis quibusdam ipſorum oſſium a ligamentis, aliis quidem in profundo positis, aliis autem in circuitu totam de articulationem comprehendentibus.

Gerocomia, *γερκομική*, est ea medicinæ pars, quæ senes regit, iisdemque conuenientem vitæ ac victus rationem præſcribit, de part. med. c. 5. Incertum an ad *γυναικήν*, an ad *ἄνδρα* pertineat, cum ſenium corpus neutrum sit, & lentet non exacta planè ſanitas, ſed vel morbi & ſanitatis affectio quædam media, vel omnino eius generis non eſt, quæ firma conſtanſque ſit, quam *κατὰ γῆρας* appellant, ſed potiùs fallax & incerta, quæ *κατὰ γῆρας* dicitur. Plures tamen eam ſalubris medicinæ partem eſſe ſtatuunt.

Gibba Hepatis, vide *Sima*.

Gibboſitas, quæ Græcis *κίρως* dicitur, eſt diſtortio ſpinæ in poſteriorem partem, 3. de art. 2. vide *Cyphoſis*, & *Incurvatio*.

Gibbus eſt, ubi inter diſtraſtas vertebraſ, vel vna, vel plures illæ ſæpe permanſerint; accidere ſolet, ubi vnica ſunt taxat vertebra, aut etiam duæ, aut tres, ſeſe deinceps conſequentes, diſtrahuntur, ea parte quatenus

spinam cauari contingit, 2. de loc. affect. 5.

Gilus emplastra, vide *Dichroma*.

Gingina, ὄλλα, carnes sunt, quæ sunt circa dentes, 9. de usu part. cap. 15. vbi primum è locellis suis & alueolis emergunt, 5. de comp. med. loc. c. 8. quarum connexio χαλινός dicitur. In iis nuper natorum dentes latent, & veluti in præsepulis conditi sunt, & vt siccoribus adstrictisque continentur, ita redundante humiditate laxioribus decidunt. Nervos habent a tertio pari, vt & dentes, per quos sentiunt & dolent, sæpèque in iis dolor est, qui in dente putatur esse.

Ginglymos, species est Diarthrosicos, qua ossa sese invicem ingredientia, cōunguntur; vt vertebræ inter se, ac cubitus, humerusq; colligantur, lib. de ossib. in proœmio; ita vt vnus caput in alterius cavitatē condatur, & vicissim huius caput in illius sinum excipiatur. Est enim hæc διαρθρῶς, pleriq; ossium carinibus similis, in quibus ferramētū vtriusq; (quod proprie a Græcis γίγλυμος appellatur) tum eius quod parieti infixum est; tum alterius, quod ostio adhæret, pectines mutuò implexum sese lubent. Quæ quidem compositionis ratio non videtur, nisi τῶν ῥαβδῶν, id est, a Sutura valde differre. In quibus vero ostium clauus crassior parieti affixus ostij verticillum subit, non γίγλυμος, sed verius γόμφος dicitur.

Glabrities, vide *Madarosis*.

Glacialis humor, vide *Crystallinus*.

Glandium, vide *Thymus*.

Glans, est finis, & extrema totius Colis pars, cuius cutis, quæ eam vestit, *Preputium*, dicitur, 5. meth. c. 13. Arist. verò, 1. de hist. anim. c. 13. dicit cutem, quæ Glan- dem integit, carere nomine, & totum, quod ex ea cute, glandeque constat, *Preputium* appellat. Dicitur etiam illo significato *Glans*, *Suppositorium*, quod clysteris loco

loco sedē inditur, 6. de comp. medic. loc. cap. 3.

Glandula, corpus quoddam carniforme est, laxum & fungosum, quod utriusque velut cunei quidam, valorum diuisionibus incubantes, fulcimentum ipsis suggerunt, ut à nullo violento casu afficiantur, 4. de usu part. capit. 20. *Glandulam* etiam *Suppositorium* vocat, com. 2. in 1. prorrhēt. 6. *Glandulam* etiam *Thymum* dicunt, 3. de alimen. facult. cap. 6. Sunt autem proprie sic dictæ *Glandulae*, (quas etiam *Adenes* vocant,) imbecilliores corporis partes, ad quas valentiores corporis partes, superuacua sibi tum quantitate, tum qualitate, & præsertim ad eas, quæ rariores natura sunt, transmittunt; quippe valentius est arteriarum, venarum, neruorum, musculorum robur; imbecillius autem, aut prorsus nullum corporum, quæ *Glandularum* sunt natura, 13. method. cap. 5.

Glandula laryngis, sunt corpora laxiora, & fungosiora cæteris, *Glandulis*, laryngi utrinque adiacentes, factæ à natura, ut partes omnes, quæ tum ad laryngem, tum ad fauces pertinent, humore ad ipsas largiter decumbente perfunderent, 7. de usu part. 17.

Glandulosi assistentes, vel *Assites*, vel *Parasitæ*, *Vasa seminaria*, *Vasa spermatica*, *Plexus* seu *Flexus varicosi*, *Plexus capreolaris*, & *hederarius*, 1. de sem. c. 12. homonyma sunt, significantia duo vasa, venam scilicet, eique cui subjacentem arteriam, flexus multos numero æquales, instar *Capreolorum* quorundam, variè complexorum efficientia, quo in implexu sanguis, & spiritus, qui ad testes feruntur, diutissimè coquuntur, ipsumque semen elaboratur, eidem flexus postremi in testes terminantur, qui testes, laxi & cauernosi, chymum, qui in vasis incepit concoqui, excipientes, exactius percoquant, & perfectam seminis formam ubi adeptus est, id ipsum

idipsum per aliud vas, quòd ad pudendum porrigitur, semen eiaculantur (quòd *varicosm assistentem* vocant, 1. de semin. 15. vulgus *vasa deferentia*, vt priora, *vasa preparantia* appellat,) quòd vas spermati cum maribus latum & longum, fœminis angustum & breue, natura concessit, 14. de vsu part. 10. & 11.

Glandulosa corpora, quæ prius, *Herophilus*, admodum *ἡρῶφίλος*, quasi Glandulosos Præstites, aut Prostates, appellauit, vtraque parte colli vesicæ sunt locata, in quibus humor quidam spermati similis, crassus, viscosus, verùm longè tenuior continetur, quo in coitu repente, ac simul vna cum semine elabitur, reliquo autem tempore omni paulatim congeritur: cuius vsus est, vt ad venereum coitum excitet, & in coitu deleat; denique vt ad instar olei meatum vrinarium humectet, & inungat aduersus vrinæ rosionem, & ne exsiccatus confideat, prohibeatque, quò minus per se lotium, ac semen facile feratur; in musculis Glandes hæ (alias *vesicula seminaria* dictæ) notabilis magnitudinis sunt, 14. de vsu part. & 1. de sem.

Glaucoſis, *γλαυκῶσις*, *Glaucoſis*, est oculorum affectus, quia ex inmodica siccitate, vel concretionc humoris crystallini, vel ex largiori eius euacuatione, (quæ fit in compunctionibus) solet progigni, quique cœcitatem præ omnibus maximè, qui oculis accidunt, morbis, inferre solet, 10. de vsu part. cap. 6. *Glaucoma* verò, (*γλαύκωμα*) est naturalium humorum, in Glaucom colorem mutatio, lib. finit. diciturque id oculi vitium, quòd orta prius suffusione, & humore circa pupillam valdè concreto, & resiccato, contractum est; vnde *Glaucoſis* à siccitate est, vt *Glaucoma* ab humiditate; & propterea Galenus, 3. aph. 31. dicit *Glaucoma* spetiem esse *ἰσχυρῶς*. idest, suffusionis, non tamen docet

esse eundem morbum; differt enim *suffusio* tum à *Glaucedine*, tum à *Glaucoma*; est enim *Suffusio* extranei humoris, & aliunde influentis concretio: *Glaucedo* verò, ipsius humoris crystallini, densatio, & resiccatio. Nec omnes suffusiones tantæ sunt, ut toti pupillæ prætendantur, & visum ex toto adimant; *Glaucoma* verò, crystallini vniuersi est, atque siccitatis, per ipsum totum ex æquo diffusa, & ex siccitate concretio. Adhæc, pleræque *Suffusiones* curationem recipiunt, cum tamen nullum *Glaucoma* curetur, uti nullus alius morbus ab immodica siccitate proueniens, facile, & plenè curatur.

Glaucedo, vide *Glaucosis*.

Glaucuma, vide *Glaucosis*.

Glene est, quod in superficie extremi ossis, tum capitum, tum sinuum, situm est, ab ocularis sinus similitudine sic dicta; lib. de ossibus, in præfatione γλῶττις pupilla oculi: Cavitates ipsa oculi. Ab ea facta metaphora est ad alias ossium cavitates. Siquidem apud Hippocratem γλῶττις significat cavitatem ossis, in quam alterum os interitur, quæ & κοτύλη appellatur: Inter quæ tamen posteriores Medici distinxerunt. Nam auctore Gal. lib. de ossibus, ex cavitatibus ossium capita suscipientibus quæ profundior est, κοτύλη dicitur: quæ verò superficialior, ut ambigere possis an cavitates sint nec ne, γλῶττις nominatur: Id verò quoniam in latitudine quadam dicitur, idcirco γλιννοειδής appellatur sinus qui obscurus est: Nec tamen sinit γλιννοειδής & γλῶττις differunt, sed idem sunt omnino.

Glenoideides, sunt duo sinus leuiter caui, in inferiorē summæ vertebræ parte [quos ab ocularis sinus similitudine sic appellant] similes superioribus; sed sinus superiores, cum caput ipsum excipiant, non abs re
sunt

sunt maiores, infra verò minores sunt, qui vertebram secundam admittunt, lib. de ossib. cap. 8,

Glossocomion, quod & *Glottocomion* dicitur, machinâ quædam est, in qua extenduntur, & vinciuntur fracta membra laqueis, ad iustam eorundem distentionem, 7. de usu part. c. 14 *γλωσσόκομον ἢ γλωττοκόμον*, nomen est Atticum, vt scribit Galen. & propriè significat arculam, in qua homines recondunt res pretiosas, & quam multi iter facientes portant; est autem oblonga & angusta. Ab eius similitudine Medici Hipp. posteriores, nam Hipp. id genus instrumenti non nouisse Gal. author est, machinam quandam chirurgicam, fracto femori vel cruri, vbi callus circumdatur accommodatâ *γλωσσόκομον* nominarunt. Est autem machina caua oblonga, & ad femoris proportionem arcta superna parte trochleas vtrinq; singulas habens ad latera sitas, & inferna parte transuersum axem, ad quem alligati laquei contrarium nixum toti membro gemina tensione efficiunt.

Glutia, Græcè *γλῦτια*, idest, partuæ nates Cerebri, sunt tenues, ac prælongæ Cerebri eminentiæ, ex vtrâq; parte illius meatus, qui spiritum ex medio Cerebri ventriculo, in Parencephalidis ventriculum transmittit, quarum concursus, hominum coniunctis inter se femoribus, siue natibus, rectissimè comparaueris, sunt aut qui Didymis, hoc est, Testiculis, ea æmülantes, malunt vocare *Didymia*, siue *Testes*, quæ verò his proxima., *Glutia*, 9. de usu part. c. 4. Producta sunt ex Cerebri substantia duriore, supraque & ante conarium sustinent, posterius verò Epiphyssim *σκληροειδῆ* inter latus dextrum & sinistrum constituunt meatum, qui à medio ventre ad postremum fertur. Eorum autem usus est, ne meatus ille à supernis cerebri partibus comprimatur & intercludatur.

Glutinatorium medicamentum, quod & *sanguinari-um*, *cruentis opitulans*, & *enamon* dicitur, est, quod vulneris oras committere, & glutinare molitur, 3. de compos. medic. per gen. cap. 2.

Gluton, hoc est, *Natam*, appellant alterum ex duobus processibus ceruicis ossis femoris, qui maior, & exterior, & gibbus est, lib. de ossib. cap. 21 γλυτς autem ea apophysis (quam & τὸ χαλῆρα μίγαν appellant) dicta est vel a similitudine quam habet cum natibus, vel quod muscoli, quibus nates constant, ei præcipuè inferantur: vide *Femur*.

Glycea medicamenta sunt, quæ aliquando purgant, & interdum acres humores indulcant quasi & alterant lib. de Dynamid. in procæmio.

Gomphos, affectus oculi est, qui Latine dicitur *Clauus* cum pupilla egrediens pelliculas uveæ, superficie tenuis aperit, unde eius forma fit quasi Clauus, lib. de ocul. cap. 11. vide *Clauus*. Τόμφοι, clauales seu molares dentes, sunt dentes asperi, inæquales, ampli, lati, molendis, atterendisque cibis comparati, à caninis ad extremam usque mandibulam pluribus radicibus affixi. Dicuntur γόμφοι, quod clauorum modo genis infigantur, unde & γόμφοις dentium ferè propria.

Gomphosis, Synarthroseos species, cum ad instar clauus, ossi infigitur; vel cum os vnum, alteri penitus est in-
fixum, ita ut ne tantillum quidem, veluti dentes suis al-
ueolis, moueatur, lib. de ossib. in procæmio. Per γόμφοις
quoque iuncta quædam ossa dici possunt in Carpo, Me-
tacarpo, Tarso, Pedio, & aliis quibusdam partibus, Sy-
narthroses Enarthrosi, & Arthrodiaë similes, sola mo-
tuum magnitudine ab ea differentes.

Gonorrhœa, est feminis inuita, & assidua excretio,
cole non extenso. *Gonorrhœa* autem nomen planè com-
positum

positum est, ἀπὸ τῆς πέρας, καὶ γόνιμα, quasi seminis genitalis fluor, ob imbecillitatem retentricem continentium ipsum corporum, 6. de loc. affect. 6. Quæ verò intento pudendo sit, propter conuulsionem accidit, inque ea duo morbi coniunguntur.

Gracilis, siue *tenuis pulsus*, est, in quo longitudinis dimensio, quo lammodo duabus reliquis dimensionibus præstat; in quo autem duæ reliquæ superant longitudinem, *pulsus* huiusmodi *turgidus*, siue *crassus* appellatur, 1. de differ. puls. cap. 5.

Grando, est tumor crassus in partibus anterioribus palpebrarum coagulatus, vt quasi *Grando* videatur, lib. de ocul. cap. 9.

Graphioides, aut *Belenotides processus*, idest, *graphio*, seu *stylo*, & *acui similes*, qui & *styloides* dicuntur à Columnæ specie, quæ partibus huiusmodi sese offert, *tenuis ossium capitis processus* appellitant, 10. de usu part. cap. 4. Adhuc *Graphioides* & *Styloides* processus, est Cubiti processus, quem è directo parui digiti porrectum, à Graphij, seu Styli modo, Græci *dissectores*, sic vocant, 1. de anat. adm. cap. 10.

Granatius dolor, vide *Dolor tristis*.

Grauedo, siue *Coryza*, est tenuis & incoctus humor, qui per nares secernitur, 2. progn. 49. quem Gal. docet non esse pituitæ speciem, vt quidam falsò asserunt, sed excrementum, quod à Cerebro destillat, tenue, aut crassum, quod tùm in senibus, tùm iis, qui ratione quauis sunt perfrigerati, plurimum aceruatur, 2. de natur. fac. cap. 9. vide *Coryza*.

Graneolentia, vide *Beneolentia*.

Gravis, seu *Granitius dolor*, vide *Dolor tristis*.

Gressuram, γρησάρα, vocat Hippocrates totum id, quod inter inguina vtriusque cruris est, cuius mediam

partem *ἡμιστάσιον*, tuncupat, hoc est, *interfemineum*, eo, quod duobus feminibus interiaceat. Est Intestinum, seu Intercapedo, quæ ab exortu pudendi, vsque ad anum pertingit, vbi etiam vesicæ collum, collocatum est, 4. de artic. 45.

Grumus, Græcè *σπύμνον*, est concretus sanguis, lib. de atrabile, cap. 2. estque aggregata concretio sensibilis sanguinis li de tumor. c. 2. Proprie quidem significat continuæ rei fragmentum & frustum: Inde ad lac & sanguinem Medicis translata vox est, qui *σπύμνον* dixerunt, in lacte quidem quoties a puerperio foeminae lac fluere desinens, in mamminis densatur, & in exigua frustra concrevit: in sanguine verò, cum a venis suis effusus, & in vicina spatia abscedens, siue per Diapedesin, siue eroso aut rupto quomodolibet vase similiter coit atque condensatur, non in vesica modo, verum etiam in omni denique corporis cavitare. In qua quoniam præter naturam ineit, calorem natium amittit, indeque niger euadit, & cogitur, tandemque putrescit, vt & reliqua omnia quæ extra naturalem locum sita sunt.

Guidex vena, vide *Apoplectica*.

Gula, vide *Oesophagus*.

Gurgulio, vide *Staphyle*, & *Gargareon*.

Guttur, vide *Larynx*.

Gutturifusus, idest, *ἐξελκόμενος*, quam *gutturifusos*, vocat Hippocr. eos, qui prominentia in anteriorem partem, guttura habent: Guttur enim, Græcis *βρόγχον*, vel totam asperam arteriam nominat, vel fauces tantum, 3. de artic. 8.

Gynæcicia, idest, mulierum passiones, liber de Gynæciis.

Gynecomastion, muliebris mamma, & subiectæ, ditæque

additæque mamminis pinguedinis, auctio est, præter naturam, lib. finit. *γυναικομασόν*, muliebrium mammarum summum incrementum: τὰ δὲ *γυναικεία*, muliebria sunt, mulierum menstruæ purgationes.

H

HABITVS est partium nostri corporis structura, constitutio, & compositio: qua ratione dicimus, huius corpus est habitus solidi, compacti, rari, cuius ratione etiam corpus. rarum facile euaporatur, & synco- pen incurrat, habitus verò densiores in morbis cunctan- ter, diutiusque laborant, 2. de ratione vict. 47. Præte- rea *Habitus* nomine de omni re vti solemus, quæ con- stans est, ægræque amouetur; vnde & sanitatem bo- nam *habitudinem* dicimus, lib. de bona habitudine, & 4, de rat. vict. 25.

Hamalopa, est oboriens cruenta suffusio ad plagas oculi illatas, 4. de compos. med. loc. cap. 8. & proin- sultatio in oculis, ex plaga, aut ictu, vel effusio, sub con- tulum locum, sanguine. Vnde Archigenes dicebat; *Hamalopa* idem malum esse cum *Hyposphagmate*, atque etiam in omni alia corporis parte posse contingere, præterquam in oculo. Dicitur autem *αἱμάλωψ*, quasi *αἷμα ἐν ὀφθαλμῷ*. Dioscorides verò etiam cruorem per adipe- m (partum *αἱμάλωπα* uuncupauit, scribens lib. 2. cap. de hircino & ouillo leuo: vere paulatim aquam affun- dens, donec ne amplius quidem cruentum virus excer- natur. Galen. etiam *ἐν ταῖς γλαυκασίαις*. annotauit *αἱμάλωπας* vocari rubentes quosdam in cute circulos, qui alio no- mine *αἱδαλῖκες* appellantur.

Hamatosis, idest, *Sanguificatio*, vide *Hepar*, & *San- guificatio*.

Hamodia, est affectus, qui dentes, gingiuasque infestare solet, cum quispiam & austeros, & acidos cibos ingesserit, adeoque dentium quidam quasi stupor, cui portulacam manducatam mederi, experientia probat, 2. de loc. aff. 6. Eum affectum oratione quidem explicare, impossibile est; sed cum quis eiusmodi cibos manducauit, ut iis dentes & gingivæ malè afficiantur, affectum hunc in eo, & omnibus similem, esse credimus, qualem in nobis ipsis experimur. Sunt autem qui τῆς αἱμαδίας nomine, omnem simpliciter dolorem dentium intelligant.

Hamophobus, id est, sanguinis mittendi timidus, 9. meth. 5. vide *Psyrophobus*.

Hemoptoicus is est, qui sanguinem sputo eijcit, lib. 7. de comp. medic. loc. cap. 4. siue vomendo, siue tussiendo, siue screando, siue simpliciter expuendo, reijciatur, 4. de loc. affect. 5.

Hemorrhagia, id est, sanguinis eruptio, & abundans effusio, quæ si per magnum vulnus fiat, per largum obitur fluxum; si angustum, per iaculationem, ut in venis secandis. Differt autem *Hemorrhagia*, ab *Hemorrhoide*, quod illa sit abundans effusio sanguinis ex venis, indifferenter qualibuscunque, hæc vero effusio sanguinis, ex ani, sedive venis per disultationem, ac paulatim facta, ut quæ ut plurimum per vasorum erosionem fiat, lib. de finit. unde *Hemorrhoidas*, sanguifluas venas, in ano existentes, appellant, 4. de art. 40. Sanguinis ex vena, vel arteria vacuatio interdum critica, ut plurimum vero symptomatrica est, & tribus de causis contingere potest; tunica earum diuisa, aut reserato earum ore per ἀνατόμην, aut transcolatus siue transmissus per διατρίβην. Diuiditur tunica vulnere, contusione, ruptione, erosione. ἀνατόμης accidit propter

tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius impetu copiam, adhuc acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat qualitatem *διαπιδνους* ex tunica quidæ ipsa rarefacta, sanguine verò tenuato oritur: accidere præterea interim potest & ex gracilium vasorum ore adaperto. Cæterum a partibus ferinè omnibus profluere sanguis potest, Naribus, Ore, Thorace, Pulmone, Ventriculo, Iecinore, Intestinis, & Hæmorrhoidibus; atque earum partium *ἡ ἀμωππαγία* dicitur, à quibus ille profluit. Verùm apud Hippoc. cum simpliciter *ἀμωππαγία* dicitur, non addito partis nomine, quæ sanguinem fundit, id modò sanguinis profluvium intelligitur, quòd è naribus manat, vt annotavit Gal. 1. Epid. Cum autem *ὁ αὐτὸς ἀμωππαγιὺς*, nomine omne sanguinis profluvium intelligi possit; eo tamen propriè dicitur, quod confertim fit *ἀπὸ τῆς παγῖνος*, quod apud Hippoc. significat *ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, hoc est impetu & confertim prodire, vt Gal. in gioff. explicavit.

Hæmorrhoides, vide *Hæmorrhagia*.

Halitua, seu *vaporosa*, sunt quæcumque per cutem foras exhalare apta sunt: *humida*, quæ per vesicam; *seca*, quæ per alium; quippe à vincenti in singulis eorum substantia, nomina ipsis imponuntur. Contraria *Halitua*, & *Dikreticis*, dicuntur *Emplastrumena*, quæ exiguis meatibus cutis, & vesicæ inhærentia obstruunt, & ea detinent, quæ per cutim & vrinas expurgantur: quæ verò opponuntur *solutivis*, dicuntur *Stryphna*, quod valenter adstringant, §. method. 2.

Halituosus vapor & spiritus, est alicuius corporis partis humiditas, quæ ad summum concocta, in tenuem halitum, virtute insiti, & validi caloris soluta, insensibili transpiratione in ambientem effluit; qui halituosus spiritus in animalis corpore ex succis, qui lentè, sensim,

que excalescunt, nascitur: ubi verò calor imbecillior est, vel naturalis humor, tum semicoctus, tum crassus, tum glutinosus atque particula densior, ubi crassior excitatur halitus, quam ut transpirare possit, 14. meth. cap. 7.

Harmonia in ossibus, species συναρθρώσεως est, in qua ossum sit: uetur a, per simplicem lineam sit, non autem, ut in sutura anfractuosa. Sunt autem maxillæ superioris, adhæc narium, & quædam etiam capitis ossa, ad hunc modum inter se iuncta, lib. de ossib. in proœm. Eo modo & pars occipitis infima, & ossa nasi, carpi, tarsi, secum connectuntur. Galenus etiam ad finem commentar. 3. εις τὸ καθ' ἑνὸν scribit capitis ossa, ubi se tangunt, proprie dici ἀρμονίας; sed translato vocabulo, φαράς appellari. Calvariæ enim ossa ait, inter se ἡρμοσμέναι, id est, committuntur; atque idcirco ipsorum contactus, καθ' ἀρμονίαν committi merito dicuntur: verum a similitudine eorum quæ sumuntur, φαράς nuncupantur. Ἀρμονία etiam medicamenti nomen est in catapotia coacti, & perutilis ad sistendas destillationes. Galen. lib. 7. τὸ κατὰ τὴν ἀρμονίαν est etiam medicamentum ἀνὰ συνὸν βεχικόν, hoc est, ad tullim comparatum doloris expers; cuius descriptio est apud Aetium, lib. 8. Est etiam ἀρμονία emplastri nomen, quod describitur ab Aetio.

Hebetudo visus, quæ & *offuscatio visus* nominatur, est summa offensio visionis, sine causa manifesta, lib. Introd. c. 15. Græci vocant ἀμαύρωσιν, Arabes, *Guttam serenam*; differtque ab *Amblyopia*, (ἀμβλυωπία) in eo, quod magis in illa, quam in hac læditur vitio. Si paulatim ἀμαύρωσις conflata est, causas habet easdem, quas etiam ἡ ἀμβλυωπία, si verò repente vnoque impetu incidit, in causa est nervi visui obstructio, a crassis & viscosis humoribus subito illapsis, aut eiusdem nervi resolutio.

solutio. Habet & plures alias latentes & internas causas, habet etiam externas: ut frequentes cruditates, crapulas, insolationem, capitis insultionem, atq; ardorem aut refrigerationem, aut multalctionem a cibo, aut balnei usum post cibum, vomitiones, & concubitus immoderatos intempestiuosque, spiritus violentam cohibitionem; a quibus omnibus caput valdè repletur. Hæc quidem atque his similia, si minora imbecilliora que sint, ἀβλαπίαν: si verò & magnitudo, & vehementia ipsis accesserit, ἀμαύρωσιν efficiunt.

Hæctica febris, duplicem habet significationem; sic enim dicitur omnis febris solutu difficilis (siue sit pituitosa, siue melancholica opposita τῇ γερικῇ, hoc est, febris solutu facili.) Altera verò significatione; spectatim magis dicitur *Hæctica febris*. quæ & *pusride*, & *Diaria* opposita sit, diciturque *Hæctica*, quòd in habitu corporis, ἐξιν appellant, tanquam in subiecto consistat; est enim *Hæctica febris*, calor præter naturam, in solidis partibus ipsius cordis accensus; vide *Febris hæctica*.

Hæcticus pulsus, ita ut *Febris hæctica* vocatur, qui nō magnoperè vllō modo variat, cæterum manet in perpetuum sibi similis, cohæretque, nec soluitur vnquam, quòd totus corporis habitus in orbem induat, in eiusmodi febribus, & pulsibus, lib. de pulsib. ad Tyrones, c. 8. Ἐκτικὸς σφυγμὸς est species inæqualis pulsus in vna pulsatione, & diuersis arteriæ partibus, confinis formicanti, qui Græcis κυρμανκίζων dicitur, sed eo adhuc minor. Pthysi, Empyemati, & Febri hæcticæ proprius est, & sicut hæc, ita nec ipse magnam mutationem sustinet, sed perpetuò est gracilis paruusque, quia propter siccitatem in linguam & latum deduci nequit arteria, & debilis ob facultatis vitalis imbecillitatem, &

præ-

præterea frequens: quia cum propter auctum calorem pulsus velox esse deberet, nec tamen talis esse hæcticis possit propter virium infirmitatem, necesse sit frequentia magnitudinem & velocitatem suppleri.

Hæcticus spiritus seu *insitus*, & natura partium substantiæ complantatus, *spiritui influenti* opponitur *naturali & animali*, cum primis solidis corporis in partibus continetur, ex quo quippe compositæ sunt, iidemque in vniuerso corpore, nec diuisis, nec condensatis, nec e loco suo motis conseruatur, resoluitur autem spiritibus influentibus intensis: vt in phreniticis, vel dissolutis: vt in lethargicis, vel iis, qui cardiaco affectu laborant, lib. Introd. cap. 13.

Hedarius flexus, vide *Glandulosi assistentes*.

Hædra, *Sedes*, *Anus*, *Podex*, dicitur, & Græcis alio nomine *δακτύλιος*, & *περὶκτός*; est autem meatus ventris inferior, continendis, transmittendisque excrementis destinatus. Cum enim venter totus peritonæo vndique conclusus sit, duo tamen in eo sunt meatus, superior quidem ad stomachum, *πυλαρός* dictus: inferior verò hic, de quo sermo est, ad rectum intestinum, cuius oræ vltimæ incumbit: Est autem instrumentum vacuandis excrementis comparatum. Cuius generis instrumenta cum sint duplica, aliis excrementorum effluxum impestiuium cohibentibus, aliis verò tempestiuium incitantibus, ea quidem ne impestiue & præpropere labantur, musculi sedem ipsam constituentes non sinunt. Sunt autem duo ad sedem musculi, quorum vnus rotundus est, solutus, & sine pari siue opposito musculo, per transversum ipsi circumfusus, adeo vt rectum intestinum exactè & firmiter occludat, & excrementa intus contineat. Alter verò sedis musculi est geminus, vel etiam tergeminus (cum namque in
duos

duos vel tres diuidere possis) qui obliquè supra rotundum musculum situs sedem surlum retrahit. Quo fit, vt si quando resoluatur aut reddatur imbecillior, sedem ipsam prociduum & prolabentem, vt in magnis contentionibus corporis fieri aliquando solet, surlum retrahare & reuocare non possit, sed ea omnino euersa maneat, nisi manu reponatur. *Adhuc Hedra* apud Hipp. lib. de vulneribus capitis, est ossis fracturæ species talis, vt in eo teli vestigium remaneat, atque appareat, qua telum infederit. Quem quidem affectum à telo acuto fieri necesse est, authore Galeno.

Hedysma, idest, *Vnguentum odoratum*, i. de compos. medic. loc. cap. 2. ἡδύσματα dicuntur vnguenta ipsa, quibus ad suauitatem odoris, Aromata adiuncta sunt. Vnguenta autem ea, quæ ἡδύσματα olim vocabantur, succus tantum erant, hoc est, liquida, vt quæ solis ferò constarent oleis, eoque differebant, ἀπὸ τῶν συμπλατῶν, vt Plinius scribit, quòd hæc corpus haberent, hoc est, solidiora essent: vtriusque tamen eadem odoris gratia. Dicuntur ἀπὸ τῆς ἡδύνης, quod est suaue & odore gratum facere: vnde & ἡδύσματα generaliter dici possunt quæcunque rem aliquam iucundiorē gratioresque reddunt. In qua significatione Galenus lib. 3. de alimentis pinguedinem & adipem carniū ἡδύσματα esse dixit: Cibis enim suauitatem potius conciliant, quam in alimentum vertantur.

Hegemonice, ἡγεμονικῆ, idest, principis animæ virtutes, sunt rectrices, & animales, quæ in capite collocantur, videl. facultas imaginatrix, ratiocinatrix, & recordatrix, lib. de sympt. diff. cap. 3.

Helcydria, idest pustulæ vlcerosæ in capite genitæ, i. de compos. medic. loc. cap. nono. Ἑλκύδριον dicitur nunc vlcus paruum, nec eo nomine certa vlla species

Species ulceris designatur .

Heliosis, Ἡλίωσις, *Insolatio*, est corporis in Sole ap-
 catio. Remedii genus est veteribus Medicis usurpatum
 variis modis, quo alii ad Solem eiusque radios expone-
 bantur, siue stantes, siue ambulantes, siue iacentes; quo
 remedio præmissa per aluum euacuatione, iuuabantur
 Hydropici, Ischiadici, Nephritici, Paralytici, Elephā-
 tici, Cæliaci, Hysterica: mulieres, & alba vteri fluxio-
 ne laborantes, & Cephalalgici, ubi ex eo auxilio, cor-
 poris perspirationem vberiore, sudores, alui adstri-
 ctionem, adipis consumptionem, tumorum laxorum,
 tum maximè hydropicorum detumescuntiam, facili
 respirationem, omnisque superflui humoris absorptio-
 nem fuissent consecuti.

Helodes febris, vide *Febris Helodes*.

Helos, siue *Clauus*, est callosum tuberculum, album,
 rotundum, capiti clauorum simile, toto in corpore
 preueniens; sed pedum plantis, digitisque potissimum,
 & calcaneis accidit, & oculis; vide *Clauus*.

Helosis, est curua ac reflexa palpebræ eversio, vtro-
 que oculi musculo conuulso, partemque Tarsi sibi con-
 tinuam, ad se ipsum trahente, quod in magnis morbis,
 magnum malum significat. Hanc ipsam palpebrarum
 contorsionem, Hippocr. vocat *Campylon*, 10. de usu
 part. cap. 9.

Helminthes, vide *Elmintes*.

Hemitritæos febris, ἡμιτρίταιος πυρετός, *Semitertiana*
febris, vide *Febris semitertiana*.

Hemicrania, αἵτεκτιο est dolorosa, circa dimidiam
 capitis partem, aliquando dexteram, aliquando sinistra
 (quæ iuxta suturam sagittalem terminatur) vt plurimū
 per circuitum exacerbatur, plerisque circa temporum
 musculos dolentibus, quibusdam in vertice capitis; qui-
 dam

nam verò adeò vehementer dolent, ut ne manuum
 contactum facile ferant, in quibus pelliculà Caluam
 ambiens, læta est. Dicitur etiam aliquando *Heterocra-*
nia, Græce *ἡτεροκρανία* & *ἡτεροκρανία*, 2. de compol. med.
 loc. c. 3. Estque & aliud *Hemicrania* genus, quod *Spha-*
celodes nominant, estque conuulsorius dimidiæ partis
 capitis dolor, 2 de loc. affect. 7. Causa doloris tanti est
 vaporum aut humorum, aut utrorumque vel multo-
 rum, vel calidorum, uel frigidorum, vel acrium salso-
 rumque influxus, siue per venas, siue per arterias. Af-
 fluunt autem hi, vel quod à cerebro, eiusque membranis
 foras pellantur tanquam redundantes aut vitiosi, vel
 quod à subiectis partibus sursum mittantur; ac vapores
 quidem tenuis doloribus afficiunt: biliosa excrementa
 mordaces inducunt: plenitudo grauitatis sensum ad-
 fert: rubor & calor, calidos humores significant. *ἡμ-*
ικρανα φάρμακα dicuntur medicamenta topica, curan-
 tis *hemicranys* convenientia. Ea non sunt vnius gene-
 ris: alia enim magis, alia minus calida sunt: omnia ta-
 men calida esse oportet, multum quidem, ubi non est
 multus calor. maderatiùs verò, si multa caliditas in do-
 lore percipiatur: tunc enim ad reprimendum caloris
 excessum, calidis pharmacis aliquid refrigerans miscen-
 dum. Omnia etiam aliquid habere oportet, quod fir-
 mitatem & robur addat, quod adstringentem scilicet
 habet facultatem,

Hemiplexia, *ἡμιπληξία*, *Paraplegiam* significat, vide
Paraplegia.

Hepar, quod & *Iecur*, est membrum princeps in
 dextro hypochondrio collocatum; venarum omnium
 principium, & primum sanguificationis, (quam *Hema-*
tofin vocant) officina, & instrumentum est, & nutrien-
 tis virtutis fons, 4. de vsu part. cap. 12.

Hepatica vena, vide *Axillaris*.

Hepaticus affectus, (quæ & *Hepatitis* nominatur, de sympt. differ. 5.) est lecoris imbecillitas citra phlegmonem, cum nutrimentum per vasa, quæ in mesenterio sunt, veluti per ora quædam semicoctum attrahit, rursusque per eadem semicoctum ablegat in intestina; unde oritur excretionis species, maxime similis loturæ carniū cruentarum, ac recenter coctarum, siue, quod idem est, aquosi sanguinis. Atque hoc quidem symptoma semicoctorum ciborum, vomitioni ob p.n. affectum ventriculi quæ excitatur, proportionatum est, 3. de sympt. caus. c. 2. Eos igitur, qui sic affecti sunt, & quibus ulceris ipsius vires fuerint imbecillæ, *Hepaticos* vocat, affectumque hunc, *Hepaticum fluxum*, alium à *Dysenteria* facit, 5. de loc. aff. 7. Affectus igitur *Hepatica* appellata, veluti etiam & *Cæliaca*, & *Stomachica*, citra tumores præter naturam, circa ipsas partes contingit; inflammatum enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse Medici dicunt, aut aliud quippiam tale, non tamen *hepaticum* vocant hominem ipsum, cui tale quid accidit, 8. de comp. med. loc. cap. 6.

Hepatica febris, *ἡπατική πυρετός*, vide, *Febris hepatica*.

Hepsema, id est, *Sapa*, vide *Apothermus*.

Herculeus morbus, vide *Comitalis*.

Hermaphroditon, *Ἑρμαφρόδιτων*, est vitiosa membrorum genitalium conformatio, præter legitimum pudendum, alterius etiam sexus pudendo apparente. Huius vitii quatuor differentias esse. Leonides memoriam prodidit, tres quidem in uiris, unam in mulieribus. In uiris quidem alias iuxta *ἡρμαφροδίτην*; alias in medio scroto, pudendum muliebrem pilotum apparet; alias uerò; quæ tertia differentia est; per id ipsum quod in medio scroto pudendi formam habet, urina emittitur in mulieribus.

lieribus autem supra pudendum iuxta pubem virile frequenter genitale reperitur tribus quibusdam extantibus corporibus, uno tanquam cole, duobus autem veluti testiculis. Sed fere fit, ut è duobus pudendis alterum iners sit & inualidum, nec nisi rarissime utrumque ad Venerem idoneum habetur. Pluribus verò etiam utrumque imperfectum est, ut nec maris, nec foeminae opus exercere possit. Quod Ausonius hoc Epigrammate indicauit.

*Mercurio genitore satus, genitrice Cythere,
Nominis ut misti, sic corporis Hermaphroditus;
Concretus sexu, sed non perfectus utroque,
Ambigua Veneris, neutro potiundus amori.*

Nomen huic malo datum est ab Hermaphrodito, quem Mercurij & Veneris filium fuisse, & ἀνδρόγυνος hoc est, virū, & mulierem peribent: A quo, qui utrumque similiter sexum habent, ἐρμαφρόδιτος & ἀνδρόγυνος appellantur.

Hernia, vide Ramex, & Celes.

Herpes, qui & Serpigo nominatur, est repens inflammatio, ex sincera flaua bile, suam seruanta naturam; quæ ipsa bilis flaua si cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui Icteros, idest, Regius, appellatur; sola verò quando ab aliis succis secreta est, & in aliquo externo membro consistit, Herpes vocatur, quæ si crassa sit, totam exulcerans cutem, vsque ad suppositam carnem. Herpes exedens, siue Esthiomenes, siue Phagedæna; si verò tenuior fuerit, id quod in superficie est, tantum veluti deuriens, generis sortitur appellationem, ac simpliciter, & sine adiectione Herpes vocatur. Altera Herpetis species miliaris, Græcis Cenchria vocatur, quoniam parvæ postulae, ac multæ per summam cutem similes milijs, in ea excitantur, quæ non protinus

vlcus faciunt, quemadmodum alter, sed interposito tempore in vlcus abeunt, 2. ad Glauc. 1. & 6. aphor. 45. Est autem omnis *Herpes* eiusdem generis cum *Erysipellate*, atque huius quoque magis cum eo, quod exulceratum est: differunt autem humoris tenuitate: est enim admodum tenuis, qui *Herpetem* excitat, adeò vt non solum interiores partes, quæ vtique carnosæ substantia sunt, transeat, sed etiam cutem ipsam, ad summam vsq; cuticulam tum erodat, tum exedat, quando si hanc quoque sudoris vice transiret, haudquaquam vlcus excitaret, 15. Meth. 17. & 2. meth 2.

Heterocrania, vide *Hemicrania*.

Heterogeneum, vide *Disimilare*.

Heterorhythmum pulsum vocamus, qui alterius ætatis habet rhythmum, lib. finit. vide *Pararhythmus*.

Hexis, habitus, varia significat. Primum quidem eo nomine in re omni uti solemus, quæ stabilis est, & egrè mouetur a subiecto. Quomodo & Aristoteles usurpanit in Logicis, distinguens ἀπὸ τῆς διαδέσεως, id est, a dispositione. Hic comparatur a multa longaue διαδέσει: Proinde secundum eam significationem, id quod est, ὡς δυσλῦτον διαδέσει, siue sanitas, siue morbus, siue aliud quodlibet, καὶ ἔξιν διακείσθαι dicit vt scribit Galenus, lib. method. medic. Hic contrarium est καὶ χέειν, siue ὡς χέειν, vt idem docet lib. 8. idem significans quod simpliciter ὡς τῇ διαδέσει. Sic autem simpliciter dictus. Habitus neque bonum, neque malum significat; sed eum in hominibus valetudine designare volentes, illum ἐν ἐξίαν, hunc καχοξίαν nuncupamus. Sunt enim hæc duæ τῆς ἕξιος, differentia: Medicis supra cæteras usurpatæ, vide *Affectus* qui & *Schesis*.

Hiatuli, qui & *Hyatuli* dicuntur, & σκευδόντες Græcè vocantur, ij sunt, quorum venter inter comedendum

in ore inuenitur, quod accidit in vehementiore appetentia, & fame nimia, in qua venter quibusdam animalibus sursum procurrit, adeò vt nonnulli cùm primum incipere eum affectum sentiunt, foras repere sibi ventrem dicant: aliis verò, cibos, quos adhuc mandunt, nec dum satis ore confecerunt, famelicus ventriculus eripit plane inuitis, 3. de anat. facult. 8.

Hidra ἰδρῶν τὰ, postulat quædam genitalium partium sunt, summam cutem occupantes, & exulcerantes, 3. aphorism. 21. Oriuntur vt ipsum nomen ostendit, ab earum partium sudore acri, biliolo, & mordaci, qui perfacile ijs in partibus putrescens, pruriginem mouet, cutemque velut vlceribus exasperat. Dicuntur & *Intertrigines*, 6. de simplic. cap. de Balanitis, Græci vocant ἰδρῶν, & παρατρίμματα; Plinius vocat *Atrita*. Vide, *Sudamina*.

Hidros, *Sudor*, ἰδρῶς, est humidum tertie concoctionis excrementum, per cutem in aquæ speciem erumpens. Et cum tenuissimum quidem sit huiusmodi excrementum, facile elicitur, partim in speciem halitus ab infuso calore solutum, & per transpirationem vacuatum: partim violento motu confertim in aquæ specie erumpens. Appellant autem Medici, quod ita excernitur. *Sudorem*: quod aliter erumpit, non *Sudor*, sed ὑπέραις, ὑγρῶν, & δῖος, hoc est, *Mador*, à plerisque appellatur. vide *Sudor*.

Himas, affectus est *Gurgulionis*, à Corrigiarum similitudine sic dictus, cùm longior, gracilior, sicciorque euaserit: (talis enim *Loro* non in præ comparari potest, quod Græci ἰμᾶς nuncupant) differt à *Cionide*, quod in hac *Gurgulio* non extenuatus est, sed crassitiem ex fluxione solito maiorem vt plurimum adeptus esse videtur. Prouenit, inquit Actius, cùm ex suffitu nimium.

ignescit: tunc enim gracilescit, & secundum omnem dimensionem comminuitur.

Hippocratica facies, vide *Facies Hippocratica*.

Hippocraticum scamnum, est machina quædam, quæ Hipp. consulit præparandam iis, qui in aliqua magna urbe curati sunt, 1. de art. 4.

Hippos, vide *Equus*.

Hirqui, vide *Anguli*.

Homio meres, & *Homio meres*, *ὁμοιομερές*; *Homogenea*; idest, *Similares*, *Elementares*, & primæ corporis nostri particulæ, 6. de sanit. tuend. c. 2. quas etiam prima corpora vocat, 8. de placit. 8 sic autem dicuntur partes, quæ in similes diuiduntur particulas, idest, omnes earum partes, tum sibi mutuò, tum toti similes habentur, quæ & simplices etiam & primæ, & in compositæ nonnunquam appellantur, quod ex illis constitutæ sint particulæ, quæ organicae, idest, *Instrumentales*, siue *Officiales* vocantur: Sunt autem hæc; Os, Caro, Vena, Arteria, Nervus, Ligamentum, Tendo, Membrana, Adeps, Unguis, Curis. His adduntur humores; vt sanguis: & qui in oculo sunt, crystallinus, & vitreus humor.

Homonyma, duplicia sunt; aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, & conuenientia; vt, cum Canem dicimus terrestrem, & marinum, atque hæc *æquiuoca* dicimus: alia verò, quæ synonymis, idest, *uniuocis*, aliquatenus conueniunt, quatenus ab vno factam appellationem habuerint, lib. 4. de vi et rat. 13.

Homoplatea, aut *Omoplatea*, quas *opertas scopulas* vocant, partes sunt, quas ij, qui toto thorace respirant, attingunt sensibilibus, & notabiliter, ex difficultate respirationis, præcordia sursum variè & inæqualiter trahentes, 10. Meth. cap. 8. vide *Omoplatea*.

Homotona, vide *Continua*, & *Epacmaistica*:

Horam

Horam vocat Galenus, id tempus anni, in cuius medio caniculam exoriri contingit, 2. de aliment. facult. cap. 2. vide *Fugaces*.

Horarij fructus, vide *Fugaces*.

Hordeolum, est Apostema, nascens in extremitate palpebrarum, lib. de ocul. cap. 9. appellaturque *Crithe*, *Hordeum*, siue *Oculorum, tuberculum*, lib. de remed. par. facult. cap. 10. vide *Crithe*.

Horrestica medicamenta, quæ fastidium cibi auferunt, & appetentiam eiusdem cient; & intendunt, de Dynamis. in procemio.

Horrida febris, *ἐπιόδus πυρετός*, dicitur apud Hippocratem, 1. de morb. vulg. non simpliciter ea febris, quæ cum horrore ianadit (id enim in numerabilibus accidit febribus) sed exquisitus hemitritæus, in quo videlicet magnam accessionis partem horrores sæuiunt, eo maxime die, in quo tertiana, & quotidiana continua simul concurrunt, 2. de differ. febr. vide *Febris horrida*. Eam biliosus pituitosusque humor ex æquo missi committunt, itaque confusi horrorem mouent, non per initia modò accessionis, sed etiam per totam propè accessionem. Tunc autem duobus modis horror iste commouetur per reduplicationem, & per inæqualem incrementi motum: Hoc breuioribus horroris internallis, illud longioribus distinguitur: Vtrumque autem febris semitertianæ proprium est, propter humoris, à quo gignitur, inæqualitatem, vt docet Galenus.

Horror, est inæqualis concussio totius corporis, & punctio quædam: quasi, seu vlceratio summæ cutis, & ipsius carnis sensibilis, ab humore tenui, & acri, per illā transeunte, 3. de sanit. tuend. cap. 5. & 10. meth. cap. 4. sit eodem modo, & ab iisdem causis, à quibus rigor; sed horroris causæ initiores, pauciores, quiescentes, & minus

motæ sunt, quàm rigoris. Nam excrementum mordax, erodens, nitrosum, salsum, amarum in cute, vel subdita illi carne motum, vt intentione qualitatis & motus rigorem vel maximum, vel medium, vel minimum excitat, prout causæ magis vel minus erodunt, abundant, mouentur, ita paucitate, tenuitate, & motionis impetu inferius, horrorem tantum mouet. Vt autem horror minus quiddam est quàm rigor, sic maius quiddam est refrigeratione & inæqualitate, Qui enim refrigeratione committit, humor frigidus est, crassus, & imnotus. Qui verò inæqualitatem, minimum calidus, tenuis, motusq; vt in ea ferè non motus, sed sensus tantum, qualis in vlcerosa latitudine, vel pruritu sentiatur. Qui corpore sunt robusto, & vix patiente, horrore vel rigore ininus tentantur, quàm qui sunt corpore imbecillo, & sensu facili præ liti. Vide *Frigus*.

Humeraria vena est, quæ in superficie brachij exteriori collocata, iuxta interiorem superficiem musculi Deltoidis, ad extemum ipsius protenditur, 3. de anat. adm. c. 5. Hanc *Omigam* Græci vocant, 1. de anat. adm. c. 11. dicitur autem *Humeraria*, vel *Humeralis*, quod obliquior à Clauicula sensim recedens, se porrigat ad Humenum, lib. de venar. & arter. dissect. cap. 6. Eadem *Vena capitis Cephalica*, & *Vena cubiti externa* dicitur: Vide *Cephalica*.

Humerus, totum illud est, quod apparet in ea dearticulatione, qua superior humeri pars, quæ *Epomis*, & *Superhumeralis* dicitur, ad Collum vergit, & a posteriori parte, ossi scapulæ; ab inferiori autem, ei ossi, quod, dum totum brachium attollitur, manifestum fit, & *Ala* nuncupatur, 1. de artic. 4. & 62.

Humilis pulsus, vide *Latus*.

Humor, & *Succus*, non idem est; *Humor* enim est hu.

humiditas quædam, quæ in corpore animantis est; *Succus*, humiditas est, quæ in fructibus, quibus vescimur, continetur, & ex medicamentis vegetabilibus exprimitur, lib. de humor. comm. 1.

Humor urina, est id, quo i re ipsa urina est, sub quo nomine, & substantia, & color urinae continetur; præter hæc, quòd in urina reliquum est, *inharens* dicitur, & eiusdem contentum, lib. de urina, cap. 1.

Humorem mucosum, eum appellare consuevit Hipp. qui lentore quodam & albedine præditus, ad exangues partes, idest, ossa & cartilagines, pro nutrimento cogi consuevit; cum imbecilla ita natura est eorum, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat, 3. de artic. 65.

Hyaloeides humor, *Υαλοειδὲς ὕγρον*, est humor oculi tertius in posteriori illius sede collocatus, qui & *Vitreus* dicitur, & *Hyalinus*; qui quantò crassior & albior est sanguine, tantò à crystallino humore, humiditate secedit atque albedine, 10. de usu part. cap. 1. Hic non ambit vniuersum crystallinum, sed dimidium tantum, posteriore parte, ut qui eius diametrum non excedat, qui a dextra eius parte, in sinistram ducitur. In eum, vsum a natura comparatus est, ut crystallino humori alimento esset, eamque ob causam inter eum & sanguinem propè medius factus. Vitreus hic humidus est instar vitri, a quo nomen habet, igne liquefacti, & tam albus, quam cum minimum nigri multo albo permistum est. Sed cum neutri horum humorum vena insit, per Diadosim crystallinus à vitreo, & vitreus à tunica ipsum ambiente, quam *ἀμφιβλεβερσίς* vocant, nutritur, quæ non est aliud quam nervi optici substantia in mucum cerebro similem soluta; vide *Crystallinus*.

Hyatuli, vide *Hiatuli*.

Hyboma, Curuamen, Gibbositas, ῥέωμα, idem est ac *κῦρτωμα*, vox generalis est apud Hippocratem, significans omnem vertebrarum eruersionem, & luxationem, præter naturam, 3. de artic.

Hydaris, Aquula, substratæ superiori genæ pinguedinis extrema parte augmentum est, qua fluunt præter naturam oculi, lib. finit. Sunt autem *Hydatida*, humiditates illæ, quæ circa vinctuola, & viscosa corpora per medium spatium, inter duas portiones tunicæ Perioestij adnascuntur, quæ corpora molliendarum sua pinguedine palpebrarum gratia, à natura fuerunt creata, 10. de usu part. cap. 7. Pinguis autem ea substantia palpebræ cuti naturaliter substantia in aliquibus, & præsertim pueris, ceu natura humidioribus, augescens supra modum *ὑδατίδα* parit, quæ oculum pondere suo grauans, fluxionem in eo excitat, facitque vt ab oculis humor præter naturam stillet. Palpebræ igitur hoc vitio detentis infra supercilia aquam intercutem repræsentat, nec sursum attolli possunt; si verò digitis ipsas deprimamus, inde digitos quòd medium intercedit, inflatur. Horis autem antelucanis potissimum defluxione tentantur, neque contra Solis splendores cernere sultinēt, sed illacrymant, continuisque lippitudinibus infestantur. Si magna *ὑδατίς* est, non nisi manu curatur: quæ parua est, siccantibus remediis iuuatur.

Hydatodes vinum, ῥιδαδὸς οἶνον, est, quod multa aqua dilui potest, vel iam dilutum est, 5. de san. tuen. cap. 12. Vinum autem *Oenodes* vocant, quod multam sustineat aquæ missionem, & imbecilles vires feriat: cui opponitur *ὀλιγόροπον*, idest, *aquosum vinum*, quòd paucam sustineat aquæ missionem, 7. meth. 6.

Hydatoeides, ὑδαποειδὲς δαπῶδες ὕγρον, aqueus humor, unus ex oculi humoribus, crystallinum anteriore parte
cir-

circumdans, & medium complectens. Hic totum illud spatium, quod inter crystallinum humorem, & pupillā intercedit, replet, sectaque cornea tunica primus effluit. Cēsetur autem verus humor, vt qui aquæ modo effluat, & pellucidus sit: inde *υδατωδης* dictus est. Alii verò, ipsum *ωκυδης*, hoc est, Ouo similem, siue Albugineum nuncupantur, vt Aetius, lib. 7. c. 1. quod magnam gerat cum ouo humore similitudinem albo ac tenui. Cæterum cum eo humore permultum etiam spiritus inest, qui qui oculi tunicas ita distendit, vt nulla vsquam parte laxæ, aut corrugatæ videantur, magno vlui est non modò replens spatium inter corneam & crystallinum mediū, sed vetans etiam, ne ab externo aere & ipse crystallinus humor, & vna tunica exiccentur, simulque colorum discrimina primus excipiens, ne primo statim eorum obiectu crystallinus percussus læderetur.

Hyderici, qui & *Hydropici*, & *Vtricularij* dicuntur; lib. de atra bile, cap. 9. sunt laborantes aqua inter cutem, 5. de loc. affect. 7.

Hyderos Phlegmatias, vide *Leucophlegmatias*.

Hyderos, est species Hydropis, quæ *Anasarca* dicitur, de sympt. caus. cap. 2.

Hydragoga medicamenta sunt, quæ aquam Vtricularijs, Hydropicisque educunt, lib. de atra bile, cap. 6. inde *Hydragogia*, Latinis *Aque ductus* sanguinis lationem per venas (nomine à similitudine fluminis, ad riuos translato) significat; qui fit spiritu, vna cum caliditate per ventrem exeunte, ac deinde secum contractas nutrimenti particulas deferente; Gal. in Timœum Platonis, fol. 587.

Hydrelaum, est compositio ex aqua & oleo, *Υδρὲλαιο*, incerta autem & multiplex misturæ ratio est. Re-rigerat, ideoque à Galeno adhibetur ad dolores capi-
tis

tis ex febre, & ciendis vomitionibus conuenit, si tepide
detur, 2. simpl. 25.

Hydrenterocole, herniæ species est composita, quar
do videlicet, vna cum intestino, aquosus humor in scro
tum descenderit; lib. finit.

Hydrocele, vide *Cele*, & *Sarcocoele*.

Hydrocephalon, est humoris aquosi, vel sæculenti san
guinis collectus tumor, in parte aliqua corporum eorū,
quæ caput concinnant, lib. finit. Est autem is humor pi
ger & deses, tribusque in locis colligitur: aut inter Cu
tem & Pericranium, aut inter Cranium, & Pericranium
aut inter cranium, & Cerebri mēbranas: aliqui addunt
ex Aetio quartum locum, inter Cerebrū, & eius mem
branas, sed tunc nullā recipit curationē. Puerilis maxi
mè familiaris morbus est, & eorum proprius. Multis au
tem de causis aqueus ille humor colligitur, quarū aliæ
evidentes, aliæ internæ sunt. Interna quidem est, cum
spontē sua vasa capitis rarescunt, & aquosam illā sub
stantiam, quæ sanguini mista est, in locum aliquem
effundunt, vnde totum caput intumescat. Externa
vero euidensque causa est plaga, aut contusio, non om
nis quidem, sed quæ infantibus præsertim ab obstetrice
infertur in puerperio, rudiùs contracto, oppresloque
eorum capite.

Hydromphalon, coitio, & concretio in vmbilico ef
fusi humoris, qui sub tunica ibidem congeritur, &
continetur, lib. finit. Græcè, Ὑδρομφαλον.

Hydrophobus, id est, aque timidus. Ὑδροφοβος is proprie
dicitur, qui ex morfu canis rabidi, aquam re formidat, &
meth. 5. inde *Hydrophobis*, id est, aque timor, ex rabidi
animantis mordicatione prognatus. Alijs statim, alijs
quadagesimo die, alijs etiam serius superuenit, sed ne
mo eorum qui a rabioso cane demorfi fuerint, immuni
ab

ab ea affectione est, qui neglexerit, aut malè subierit curationem, idque maxime, si corpore fuerit cacochymo & melancholico. Id tantum autem aquam (nec eam modo ut fertur, sed omne etiam liquoris genus) metunt, ut ea visa animo vehementissime perturbentur. Res quidem admiratione digna, cum ita affecti canibus fere similes euadant non modo rabie, latratibus & moribus æquè pestiferis, quibus obuiam factos petunt, sed calida etiam siccaque intemperie & siti. Huius causas qui inuestigarunt, existimant eos aqua tantoperè auerlari, quòd in ea tanquam in speculo, intueantur le rubenti facie, torius oculus, & supra humanum morem effratis: vnde non aquam modo, sed quicquid etiam pellucidum est, abhorrent. Alij dicunt fieri ijs *Hydrophobiam*, quo Canis, a quo demorsus sunt, imaginem in aqua cernere sibi videantur. Nam ut fertur, cum Philolophus quidam eo affectu laboraret, & falso, sicut cæteris, Canis species ante oculos obuersaretur, & propterea a bibendo deterreretur, animum fortiter recolligans, secumque reputans, quam absurdum sit canem in balneo versari, aquam intrepide bibisset, sitimque expleisset, curationem est consecutus. Alij, metum aquæ gigni docent, ab humida siccitate, quasi in còtrarium habitum mutata penitus humida eorum substantia, sunt qui vanam esse huius rei causæ inquisitionem dicant, ipsamque *Hydrophobiam* nihil aliud esse, quam insaniam ex atra bilis genus. Est enim magna huius ueneni cum eo humore similitudo, notumque est ualde differentes esse melancholiam differentias, cumq; omnium melancholicorum communis sit metus, alios tamen alia timere.

Hyaropici, vide *Hyderici*.

Hydrops, ὁ ὕδωρ, est aqua inter cutem, in quo per cutem extantam, siue aer & flatus, siue humor aliquis

quis in profundo conclusus, locatur; frigitur in membrana abdominis interiore, *Peritonæo* Græcè dicta, ac recludatur, fit *Hydropis* species, quæ *sicca* ab Hippocrate vocatur; si verò humor, fit *Ascites*, qui & *Hydrops aquosus* ab eodem dicitur, 4. aphorif. 11. Eius tres sunt species: prima, *Ascites*, ἀσκίτης, quæ fit cū ter membranam *Peritonæum*, & intestina, plurimus aquosus humor coaceruatur, qui locus, aquoso humore, vtris modo impletus videatur; vnde & *utricularem* appellant, Barbari corrupta voce *Aselitis*. Altera, *Tympania*, τυμπανίας, & τυμπανίτης, dicitur, qui fit, vbi flatus, ac spiritus copiosius, in iisdem ventris locis congregatur; Hoc nomine à *Tympano* omnibus notissimo instrumento, appellata est; si enim pulsetur venter inferior, instar *Tympani* sonum edit. Tertia *Anasarca*, ἀνασάρκη, ὕδρωσ ἀρκη, & ὁδωδυστυμία; dicitur, fitque quoties per totum corpus humor picuitosus diffunditur, adeò vt instar spongiarum, aut papyri, vniuersa caro permadida appareat, ideòque in ea totum corpus intumescit, ac mortuo simile euadit. Sed omnium ferè communia ista sunt, quod iecinore vehementer refrigerato oriantur, sintque deprauatæ sanguificationis symptomata, siue primario propter phlegmonem, aut scirrhum, aut aliud vitium, iecur malè affectum sit, siue lege consortij, quod illi cum aliis partibus intercedit, quodque omnis à cachexia initium sumat. Fieri quidem non potest vt *hydrops* vllus citra hepatis refrigerationem gignatur: id quod illi contingit tum per se, tum etiam liene, aut ventriculo refrigerato. Compatitur propterea aluo & intestinis, maxime ieiuno, pulmōni, renibus, & septo transuerso. Sed & immodica per hæmorrhoidas, aut vterum, aut dysenteriam, sanguinis euacuatio, *hydropem* gignit

gignit, sicut & consuetæ vacuationis suppressio: His enim de causis refrigeratur hepar, post verò aliquando & durum sit. Quamuis autem frigida intemperies hydropem pariat, omnes tamen hydropici & febricitant & sitiunt, quod humor circa viscera desces nec perflatus falsedinem putredinemque colligat. Sed febris quamuis assidua, lenta tamen est, cum pulso paruo. Adhæc omnes spirandi difficultatem, tumorem, grauitatem, colorem vitiosum, cibique fastidium incurrunt.

Hydrops, aquosus, & siccus; vide Hydrops.

Hydrops matella, vide Diabetes.

Hydrops in vas urinale, vide Diabetes.

Hyelbeides, vide Crystallinus.

Hygieia, idest, Sanitas; est affectio, constitutioque partium, cuius ope, functiones secundum naturam edimus, i. meth. 9. Inde v̄yem salubris medicinæ pars est; quæ sanitatem tuetur, & imminentes morbos præcauet, lib. introd. c. 7. v̄yleia (per synecopen v̄yeia) emplastrum etiam Cephalicum est; quod & Panaceam, & Trium fratrum vocant. Heras v̄yleia facit ad nomas; & omnia vlcera maligna. Valet ad plurima, ad quæ commendat ipsum Aetius, lib. 13. cap. de Emplast. Cephal. v̄yem verò, cæteras medicinæ partes dignitate antecellit, duobusque summis continetur præceptis: optimè valentia corpora similibus esse conseruanda: quæ parum ab optima constitutione desciscunt; aut quodammodo ad neutrum statum accedunt, modico contrariorum v̄lu ad mediocritatem reuocanda esse: Itaque ad eam pertinent aeris, cibi, potus, exercitatio, somni, vigiliarum, excretionum, atque affectuum animi discrimina; de quibus Galenus copiosissime differuit. v̄yemov̄ salubre tripliciter apud Medicos dicitur: vt corpus, vt causa, vt signum. Salubre autem corpus

corpus tripliciter dicitur: aut simpliciter, quòd ab ipso nature ortu bonam habet temperaturam in simplicibus & primis particulis, atque in his quæ ex ipsis componentur, est commensuratum, aut, vt nunc, quòd in præfenti est, sanum. Est verò & hoc ipso tempore quo sanum existit, si non optimam, at sibi propriam habens temperaturam, vt multum autem, quòd à constitutione optima non admodum deficit, vt explicat Galen. in art. med.

Hygrocyrcocle, id est, *aquosus*, simul & *varicosus* *ra-mex*, est dilatatio vasorum testem nutrientium, & lenti humoris copiosissimi in Scroti aliqua parte collectio, lib. finit.

Hymen, *Hymenæon*, vide *Colliculum*.

Hyoëides, siue *Hypsiloëides*, siue *Lambdoëides*, à similitudine, quam cum γ & Λ (quæ inuersa, non est valdissimilis ab υ) Græcis obtinet, dictum est os capiti gutturis incumbens, rectum secundum colli longitudinem, & leniter cauum, pluribus ossiculis contextum, & ad radicem linguæ situm, firmamentum est linguæ & laryngis musculorum. Os namque eius maximum, quòd totius ossis velut basis est, anteriore parte ad securitatem gibbum est, posteriore linguam spectante cauum, ad continendum. Huic autem alia duo vtrinque ossicula, velut duo cornua vniuntur: vnum breuius & inferius, osse vnico constans, in thyroëidis (est autem laryngis cartilago) apophysim prolongam inserto: alterum gracilius, longius, rotundius, ossiculis tribus vel quatuor colligatis inuicem, ad styloëides radicem ascendentibus conflatum: Quo loco quibusdam, præsertim mulieribus ligamenta sunt tantum sine ossiculis, ab osse hyoëide ad styloëides ascendentia. Est autem os hyoëides quadrupedibus multum diuersum ab humano, lib. de musc.

muscle dissect. cap 13. quod & *Pharyngethron* vocant, li.
de vocal. inst. dissect. cap. 6.

Hypelata, Catatherica, siue *Deietoria medicamenta*,
sunt. quæ renes, vesicam, & gibbam iecinoris partem,
cum multo vitioso suecolunt referta, expurgant, 7.
method. 13.

Hyperbolica figura corporis est, quoties quatuor mem-
bra, Græcè *κῶλα*, idest, *Crura*, ac *Manus*, aut summè
extenduntur, aut immodicè inflectuntur, ipsa item spi-
ra, cuius partes vertebræ quoque in ceruice existunt,
cum plus nimium incuruatur, aut extenditur. 1. prog. 13

Hypercatharsis, ὑπερκαθάρσις, *Superpurgatio*, immo-
dica est ex medicamento violentiori epoto purgatio, in
causa ergo est vis nimia medicamenti, quod vasa ad
intrem attinentia, mordens, aperiens, & continenter
irritans, atque conuellens, corpora tota, eorundemque
omnes vires naturales cum primis enervat ac dissolvit.
Sed cum initio vasa modicè pateant, nec multum imbe-
cilla sint, non nisi quod tenuissimum est, minimeque
naturæ familiarè excernitur. Tandem verò vasis tum-
multum dehiscentibus, tum imbecillioribus reditis, suc-
cedit eorum vacuatio, quæ sunt naturæ charissima.
Quamobrem in *ὑπερκαθάρσι* primùm flaua bilis, deinde
pituita, demùm atra bilis, postremo sanguis, (quippe
quem sanguinem natura habet familiarissimum) excer-
nitur, initio tenuissimus, demùm crassissimus: Itaque
medicamento dato pituitam ducente, si immodica fiat
purgatio, primùm flaua bilis, mox atra, ultimo loco
sanguis excernitur. Si verò quod flauam ducat bilem,
exhibita sit, pituita sequetur, tertia atra bilis, quartus
tandem sanguis. Quod si medicamentum datum sit
atram bilem purgans, eam quidem primùm vacuabit
deinde flauam, postea pituitam, postremò sanguinem,
tamquam

tamquam ex inanitis iam vasculis effluentem. Cum enim ea non amplius in se continere alios succos præ imbecillitate possint, eorum verò ora aperta fuerint, nec irritare uel medicamentum desinat, nec familiarem præterea succum possit attrahere, necesse est reliquos eo ordine, quem diximus, excerni. Si verò humoris vel sanguinis euacuatio, spontè fiat, a natura, vel sanguinis, vel humorum multitudine aggrauata, & ad ipsorum quæ onerosa sunt, euacuationem excitata, & modum obtinere nequeunt, *Hypercrisis*, dicitur, seu *Superuacuario*, 3, prorrh. 5.

Hypercrisis, vi de *Hypercatharsis*.

Hyperoa, ὑπερώα, est pars oris superior, modicè concava, foraminulis pertusa, per quæ à cerebro pituita ad os descendit. Extenditur a faucibus ad dentes usque, & in fornicis aut cameræ modum concava est, sed leniter, nec supra modum, ut iis accidit qui sunt acuto capite, ut li. 6. Epidem. Hippoc. annotauit. Latine *Palatum*, & *Basis cerebri, osse sphenocide firmata*; quod propterea Gal. το καὶ τὴν ὑπερώαν ὀστέον aliquando appellat.

Hypersarcon, vlcus est, cui caro supercrescit, veluti *Hypersarcosis*, carnis excrescentia, ὑπερσάρκωσις Græcè, 2. method. 2 & 3. method. 6 Neque in vlceribus solum verum etiam in oculis, auribus, gingiuis, naso, testiculis, & aliis plerisque partibus caro supercrescit. Est igitur morbus in incommoderatione magnitudinis, siue ex eo genere quod in quantitate, magnitudineve partium spectatur: itaq; vel excindi debet, vel medicamentis catharticis absumi. Huiusmodi incrementi præcipua causa est boni sanguinis in carnem vberior affluxus. Quare curatio eius perficitur iis, quæ contrariam sarcoticis habent facultatem: vocantur autem ea κατὰρπντικά.

Hypozoetes membrana, siue *Subcingentes*, sunt quæ tela

tela araneorum similes, natura simplices, internam, utramque thoracis regionem subcingunt: quæ verò rectæ ad iugulum vsque perferuntur, *Diaphragmatones*, idest, *Intercipientes*, siue *Intersepientes*: ubi autem pulmonum cohærescunt, huius *Operimentum* dicuntur, 5. de anat. adm. c. 8. Has ipsas pleuræ tunicas, omnium spirationis instrumentorum commune esse, communemque iis largiri tunicam, scribit Gal. 7. de anatom. adm. cap. 2. vide *Cingentes*.

Hypnoticum medicamentum est, quod somnum conciliat, ὑπνωτικόν, Soporemque & Cataphoram, epotum molitur, refrigerat enim corpus, & sensum eò vsque, stupefacit, ut, si paulò liberalius ebibatur, mortem quoque afferat, 5. simpl. cap. 19. vide *Narcoticum*.

Hypocaustata, idest, *caloris nostri fomites*, alimenta nominant iuxta omnium philosophorum dogma, quorum, quæ animalia constituunt, Elementorum, Ignem maximè vitæ esse causam existimarunt, qui rursum suis pabulis, tanquam alimentis alitur, ut lucernæ flamma & oleo, 1. aphor. 14.

Hypochaemienis, idest, *Suffusi*, 6. de sanit. tuend. c. 9.

Hypochondria, idest, *Subcartilaginea*, aut quasi dicas, *sub cartilaginibus posita*, sunt partes illæ, quæ sub ventriculi ore, ad partem exteriorem apparent, cuiusmodi sunt muscoli, qui expansi, membrana prætenui, veluti Araneæ, quam *Peritoneon* vocant, incumbunt, extrinsecus verò cutē conteguntur. Æquiuoco autem cum his vocabulo, etiam interiora viscera vocamus *Hypochondria*; quoniam & ipsa sub cartilaginibus notharum costarum ab interiori parte existunt, lib. introd. cap. 10. In priori significatu, dictum; *febres ab Hypochondrijs moderatæ*, idest, omnium febrium acutarum, quæ ab *Hypochondrijs* proficiuntur, sunt initissimæ: in posteriori

significato, quando voce *Hypocondriorum* complectimur, Ventrem, lecur, Lienem, & Septum transversum, quædam *maligna*, quædam *mites* sunt, comm. 2. in 3. de morb. vulg. Atque in hoc secundo significato, *Hypocondrion*, ὑποχόνδριον, ab Epigastrio non distinguitur. Vbi Hippocrat. *Hypochondrium* simpliciter nominat; dextrum interpretatur, propter excellentiam, quæ præstat alteri.

Hypochondriacus, siue *Flatuosus affectus*, qui & simpliciter *Melancholia* dicitur *Hypochondriaca*, morbus est ex tertio melancholiæ genere, a ventriculo & finitimarum partium ex affectu p. n. ortum ducens, pravis symptomatibus stipatus, imprimis metu, & mæstitia, Idem alui defectione, vomitione, proba concoctione, & rectibus levatur, 3. de loc. affect. cap. 7. Græcè ὑποχονδριακή μελαγχολία dicitur.

Hypochyma, (quæ & *Hypochymis*) est crassi humoris coalitio, in cornea membrana, vel inter corneam tunicam, & crystallinum humorem, iuxta pupillam concretio: Qua in re, *Hypochymatos*, & *Glaucomatos*, differentiam recentiores posuere, dicentes, τὸ ὑπόχυμα, non aliud esse, quam humorem illic concretum; Γλαύκωμα autem alterationem esse humoris crystallini, in glaucū colorem ab humiditate quadam intra ipsum congeſta, cum tamen veteribus Medicis, idem esset vterque affectus: nec tamen hoc solo differunt, sed etiam, quod omnes suffusione laborantes, lucem videant multam, aut paucam: qui vero Γλαύκωμα, quique ἐμπόρουν, patiuntur lucem omninò nullam cernant. Est autem *Suffusio* duplex; vna, propriè dicta, quæ est oculorum per se suffusorum morbus, ab humore crasso pupillam obscurante; altera verò, impropriè, in qua oculi non primò, & per se patiuntur, sed visa quædam visis propriè suffusorum similia

similia repræsentant, quæ est per consensum suffusio, ut illa per essentiam, siue à ventriculo sursum ad oculos ascendendo, siue a cerebro deorsum, siue à toto corpore, ut in febribus, crisi instante per sanguinis fluorem è naribus. vide *Glaucoſis* Alia etiam Suffusio recens est, & quæ nondum radices egit; alia verò confirmata est, & ex toto concreuit: quas quomodo ab inuicem distinguere oporteat, Paulus lib. 6. hoc modo explicauit: Oculus suffusione têtatus, cōcluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eique adducitur, simulq; hac illa exprimitur, deinde oculo aperto per attentè suffusionem contemplantur: in ijs enim in quibus humor nōdum coaluit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur, ac primùm latior apparet, rursus in suam figuram & magnitudinem recurrit; At in confirmatis suffusionibus nulla immutatio, vel latitudinis, nec figure, ex impressione obuenit. Quoniam verò commune hoc est signum, & eorum in quibus modicè, & illorum in quibus supra modum humor concreuit, colore ipsas discernemus. Nam si ferri, aut marinæ aquæ, aut plumbi colorem suffusio habeat, moderatè coaluit, & ad educationē idonea redditur: si verò gypso aut grandini similis color suffusionis est, supra quam par est, concreuit.

Hypogastrion, vide *Abdomen*.

Hypoglossis, medicamentum est, leniens, læuigans, & corrigens asperitates aspræ arteriæ, quin & omne, quod in viis spiritalibus inflammationis reliquum est, concoquit, & perlanat; quod medicamentum, quia linguæ subditur, eoque paulatim liqueſcente, aspræ arteriæ summū madescit, & irrigatur, ob id τ'πόγλωττις dicitur, de quibus sub linguacibus præſidijs, Galen. fusè, 7. compos. med. loc. Eiusmodi pharmaca parantur ex passo, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, quibus si

libet addere detergentia, conuenient mel despumatum, amygdalæ, resina, terebinthina, ficus, vua passa, semen iridis; & alia huiusmodi. Oportet autem reniti tussi, & ne excitetur cauere. Obluctantes autem vt ne tussiant, quod ex pharmaco defluit, in asperam arteriam excipient; vide *Arteriace*. Hypoglossis etiam dicitur interior linguæ pars, quæ subiectam attingit maxillam.

Hypophora, sunt fistulæ, & vitia profunda, quæ dehiscunt, vt sinus, vlcera, aliaque huiusmodi omnia, quæ ex defectu repletionē desiderant, atq; indicant, l. Inter. c. 3.

Hypophysis, seu *Hypochysis*, idest, *Suffusio*, 3. meth. 2.

Hypopyos vocamus, quibus pus in oculis congregatū est, quod vacuari solet, diuisa ea tunica, quæ cornu est similis, pauld supra locum quo committuntur inter se tunicæ oculi vniuersæ, quem alij *Irim*, alij *Stephanon*, alij *Coronam* vocant, differtque ab *Hypochymate*, in quo non pus, sed leuis quædam nebula, tunicis oculi interponitur, 14. meth. c. 19. Quod autem *Hypopyon* sub oculis fiat, nomen ipsum indicat, idem enim est, veluti si quis *Hypophthalmiam* dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autem ex genere effusionum, & Ecchymomatum appellatarum; Appellant ita Hippocr. & alij multi Medici, circa cutem affectionem, cum tenuibus in ipsa venis contusis, sanguis per fissuras effunditur, non vno loco acruatim, ac statim ita excretis in grumos coit; sed postquam per Diapedesim, effusio ista est facta, tūc enim temporis progressu, contingit liuescere & denigrari oculum, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis, 5. de compos. medic. loc. cap. 1. & lib. de Virtute Centauræ, cap. 4. ὑπὸ πύονος ὁ ὀφθαλμὸς, Græci vocant. Sunt autem τὰ ὑποπύονα symptomatica dolor pulsatorius vehemens, rubor oculi totius, & temporum dolor.

Hypophthalmia, & *Hypophthalmium*, vide *Hypophos*.

Hypofarca, quæ & *Hypofarcidium*, & *Episarcidium* dicitur, species hydropis est, in qua habitus totius corporis pituita plenus redditur, 4. de rat. vict. 11. vide *Anafarca*.

Hyposphigmata, plagas oculi illatas, & abortas ex eis cruentas suffusiones, appellant, 5. de compos. med. loc. e. 8. species τῆς ἐκχυμώσεως. Fit autem cum ruptis, aut contusis ex plaga valis, quæ in oculorum tunicis habentur; sed iis maximè, quæ sunt in adnata membrana, sanguis sub eam subit; ac primum quidem is rubet, postea verò liuescit. Eorum qui sic affecti sunt, hoc vnum symptomata dicitur, quod quæcumque videant, rubra esse putent, ut Gal. lib. de sympt. caus. annotavit, sed præsertim recente malo: ob id etiam ab Archygene αἱμαλωπα dictum esse putant. Sed tamen αἱμαλωπ generalius dicitur, quàm ὑπόσφαιγμα.

Hypospadiaz. ὑποσπασιαί, ij sunt, quibus ob vinculum, quod ob finem virgæ habent, meatus seminalis est, contortus, & ob læsa genitalia steriles sunt, non quod semen fecundum non habeant, sed quod in virgæ flexibus hærens ferri prorsus nequeat, recta in uterum, quam rem curatio ipsa comprobat, vinculo enim abscisso, generant, 15. de usu part. cap. 3. Κύμα, siue κυμαδίσκιον, hoc est, Canem, vel Caninum vinculum, vocant id, quo cutis membri genitalis cum Glande colligatur, vitium id a prima origine contrahitur. Et quia Glans non recta forata est, sed sub eo vinculo, qui sic affecti sunt, urinam quoque antè facere nequeunt, nisi pudendum ad pubem reflectant; differunt ἀπὸ τῶ ἀτρήτων. Quod ἀτρήτος dicantur etiam viri quàm mulieres, quibus anus aut genitalia perforata non sunt, siue id ex natura sit, siue ex morbo acciderit, carne, vel

membrana supercrefcente, & meatum obstruente.

Hypostasis, siue *Sedimentum*, est id, quod in vrinā residet, tanquam crassior vrinæ portio, & in sanis quidem tertiæ concoctionis excrementorum, in ægris verò morbidi succi pars, ab vrinæ liquore secreta, & in fundo subsidens, lib. de vrinis capit. 16. Licet generaliter quidquid subsidet, atque in imo cuiusque liquidioris excrementi subsistit, *Hypostasis* sit; quæ crassior vrinæ pars, si ad supremam superficiem terminatur, dicitur *Nubecula*; si ad mediam regionem, *Suspensum*, si profundiore parte inferiorem locum occupet, dicitur *Hypostasis*, ibid. cap. 21. quæ si diuisa non sit, sed continua, apud Hippocr. dicitur *Plana*; quod si per omne tempus sui similis est, ita ut, si primo die sit cocta, sit etiam postero die; & insuper quæ sedimentum, & humorem vrinariū habet non distantem à se, sed totum sibi æqualem, quæque continuò sibi similis perseverat, *aqualis* apud Hippocr. dicitur, ibid. c. 38. Optima vrina vesicæ (cui maxime facultas inest vrinam concoquendi, sicut & renibus attrahendi) optimè se habentis indicium primò est; secundo, renum; tertio, sanguinis & vasorum quibus ipse continetur; quarto, iecinoris; deinde verò ventriculi. Sic enim vrinæ concoctio procedit, nec potest subsequens præcedentis vitium omnino corrigere & abolere. Quamobrem si optima est *Hypostasis* è vesica prodiens, omnibus iis in partibus optimam factam esse concoctionem testatur, & proinde partium solidarum robur, vimque caloris natiui ostendit, sicut è contrario mala, partium solidarum, & caloris imbecillitatem, a quo certum est, omnia naturæ opera perfici. Ad hunc modum in mammis lac, in testibus semen, in abscessibus pus album euadit, ex continua vasorum, neruorum, ligamentorum, membranarum, cartilagi-

num, ossium, & reliquarum solidarum partium, quæ sunt in sede affecta, alteratione. Quod ad eius substantiam quoque pertinet Hypostasin, & constantia & copia mediocrem esse oportet, præterea, quæ omnium maxima laus est, albam, læuem, & æqualem. Horum enim trium signorum in Hypostasi tanta vis est, ut iis tantum tribus optimam urinam Medici definierint. Si enim hæc adsint, reliquorum nullo omnino defuturum videtur: Sunt namque perfectæ concoctionis indicia, ex qua reliquæ omnes notæ dependent. Nec tamen, vlla Hypostasis perfectè cocta est, sed cum sit ex genere excrementorum, aliquid præter naturam in se contineat, necesse est. Quicquid enim alimenti in sanguinem conuerti non potest, subsidet in urina. Itaque prout concocta apparet, sanguinem etiam vnde manauit, tantum decoctum esse declarat. Crassa enim crassum, sublimis, flatulentum, flaua, biliosum, liuida vel nigra, melancholicum aut corruptum significat. Ex consequenti verò caloris natiui, a quo concoctio perficitur, vim aut imbecillitatem denotat.

Hypothernar, idest, *subuola*, pars ea manus est, quæ opponitur *vola manus*, quæ *Thenar* dicitur, lib. Intr. c. 10.

Hypsiloecides, vide *Hyeidesos*.

Hystera, idest, *Vterus*, *Vulua*, *Matrix*, foetus gestandi siue generationis organum, foris neruosum, intus carnosius, diciturque a Græcis *ὑστέρα*, quod postrema sit partium omnium, lib. finit. Vnde *hysterica mulier*, id est ab utero suffocata, siue hunc affectum *uteri suffocationem*, siue *spirationis ob uterum ablationem* vocites, quo interdum mulieres, sine sensu immobiles iacent, cum nullo, aut paruo. aut quam obscurissimo pulsu, interdum mitiori existente malo sentientes, & moueri possunt, atque integra ratione: tamen animi defectio-

ne, & difficili spiratione laborantes, etiam crura, & brachia contrahunt, 5. de loc. aff. 5. *Præfocatas etiam vterarias* vocant, idest, vtero laborantis, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. vnde *Hysterologia*, vteri dolor: *Hystericus typus*, & *morbis*, accessionis est retardatio, cum posterior accessio seriùs inuaserit, quàm præcedens.

I.

IANITOR, vide *Piloros*.

Ianatrix vena, idest, *Vena porta*. 1. 6 de placit. c. 5.

Ichor, est tenue excrementum vlceris, vt sordes crassum; 3. method. 3. Vocat etiam *Ichores* Hippocrates, tenues, acres, aquosas, & mordaces sanguinis humiditates; sanguinis veluti vehicula, 4. de rat. viët. 2. Appellat adhuc *Ichores*, superfluas sanies, quas corpus aceruat; ex quarum vapore; non solum capitis dolores nonnullis oboriuntur; sed etiam fustulorum, symptomata; aliquibus verò & Comitialis conuulsio concitatur, 6. de sanitat. tuend. capit. 9. Dicuntur adhuc *Ichores*, fluentes humiditates ex Coryza, & Catarrho, 2. de rat. viët. 44. Græcè ἰχὼρ dicitur; ex Latinis quidam vertunt, *serosum humorem*; quidam *aquosum*, quidam *tenuem*, alii verò, *sanie*m interpretantur. *Ichoreides* autem *sanguis* non simpliciter tenuis, & aqueus ab Hippocrate vocatur: sed qui venenosa aliqua, & maligna facultate præditus sit: vnde Galenus ex Platone: *Ichor* autem, sanguinis quidem serum, mitis; nigræ verò bilis, acris, & ferus. *Ichoreides* quoque sanguis vocatur, in seipso prauam ac tenuem humiditatem continens, mordacem, & erodentem, non aqueam, & morfu carentem, commentar. 2. in 6. de morb. vulg. 38. Cellus lib. quinto, cap. 26. ἰχὼρ dicit sa-

hici speciem esse tenuis, subalbidae, & ex malo ulcere exeuntis, maximèque ubi nervo læso inflammatio secuta est. Ego verò sic dijudicandum censeo, ut intra corpus quidem *Ἰχῶρ*, aquosa vel serosa humiditas, siue sanguinis, siue alterius humoris Latine reddi possit, extra corpus verò saniem verti debere. Sic Plinius inassati iecinoris saniem appellavit, cum humorem significans, qui à iecinore; dum assatur, emanat. Itaque apud Galen. tenuis in ulceribus excrementum non absurde sanies exponitur: Et in capitis vitiis, quæ *ἀχῶρ* vocantur, *Ἰχῶρ* sanies non ineptè verti possunt; vide *Sordes*.

Icteros, est discoloratio ex flava bile, sui seruante naturam, una cum sanguine per totum corpus delata, 2. ad Glauc. i. sic dictum hoc malum; vel ab Aue, quæ Græcis, *Ἰκτερός*, Latinis verò *Galbula* dicitur: hæc enim suspicetur, sanari malum dicunt, & Auem mori; vel ab Aue, quæ *Ἰλθίνος*, *Ἰκτινός* Græcis, *Milvus* Latinis appellatur; oculi siquidem, hoc vitio laborantium, Miluinis oculis similes, hoc est, Auricolores videntur; vel à mustella sylvestri; quæ auricolores oculos habet, & Græcis *Ἰκτίς*, Latinis *Viuera* nominatur. Etiam *Regius morbus* dicitur, quoniam mulso, (quod genus potionis in Regum delitijs erat) curabatur, rebusque omnibus hominis mentem exhilarantibus. *Anrigo* quoque nominatur à Celso, ab Auri colore, quem bilis, per vniuersum diffusa corpus refert. *Arquatus* denique nuncupatur, quod eiusdem coloris respectu referat celestis arcus similitudinem. Oritur propter caularum diuersitatem. Aliquando enim fit ab obstructione illius vesicæ, quæ bilem excipit. Tunc autem bilis non patentibus illis meatibus, per quos secerni, & euacuari debet, regurgitat in iecur & venas, & sanguine permista effunditur in vni-

vniuersum habitum. Inde tota cutis flauescit aureo colore, sed imprimis oculi, in quibus vitiosus color, propter ingentem illis candorem magis conspicuus est. Et quia destinatis à natura locis non potest excerni, maxima sui parte propellitur à natura in renes vna cum vrina, eamque colore suo inficit, & crassam impuramque reddit: è contrario autem intestina bile vacua sunt, & eorum excrementa candida; deiciendi autem cupiditas nulla vel segnis admodum. Alia *Icteri* species est, quam nulla parit obstructio, sed vel calida & sicca totius corporis, maximeque hepatis itemperies, vel facultatis secreticis imbecillitas: illa quidem quod multam bilem gignat toto corpore, hæc verò, quòd genitam secerne-
 re à sanguine non possit. Ea hoc vno argumento maxime apprehenditur, quòd intestina, & quæ in his continentur excrementa multa bile, perinde atque reliquæ corporis partes, perfusa sint. Ad hanc speciem referri poterit is *Icterus*, qui à venenatorum moribus aut potu pharmacorum deleteriorum solet contingere, quique nascitur ab omni alio iccinoris vitio quo sanguis deprauatur, & flauus, vel porraceus, vel pallidus, vel plumbeus euadit, siue id inflàmatio sit, siue durities, siue compositus ex utroque morbus. Tertia autem *Icteri* species est, qui fit per morborum biliosorum crises. Natura enim aliquando bilem quæ morbum fecit ad cutem propellit, vnde color biliolus vniuerso corpori inducitur. Cæterum, quæ dicta sunt omnia, communia sunt tam flauo, quam nigro *Ictero*: nisi quòd *Icterus niger* non fit obstructi one illius vesiculæ bilem continentis, sed lienis quodq; in eo non flaua bilis, sed nigra effusa sit in corpus, & proinde color non flauus, sed niger appareat.

Ictus, est arteriæ motus, tactui occurrens; *intervallum* autem, est tempus interpositum inter duos *ictus*, quo di-
 ligitur.

stenditur, contrahiturq; arteria, de puls. ad Tyrones, c. 4.

Idea morbi, idest, *Morbi essentia*, 3. de cris. 4.

Idiopathia, ἰδιοπάθεια, proprius affectus est, qui & πρωτοπάθεια, idest, primarius affectus dicitur, ex aduerso distinctus ab affectu per consensum: seu per viciniam, & secundarium, seu posteriorem: Ei vero, qui per consensum infestat, qui συμπαθεια, quod δευτεροπάθεια dicitur proprium opponimus, 1. de loc. affe. 3. Per consensum autem affici tribus modis membrum aliquod dicitur, vel propter viciniam, vel propter familiaritatem generis, vel operis: generis, vbi nervosum nervoso, venosum venoso consentit; operis, cum mammæ, & thorax, partibus genitalibus condolet, com. 3. in 3. de mor. vulg. 4. vide *Symphathia*.

Idiosyncrasia, idest, corporum proprietas, & conuenientia, ac cuiuslibet peculiaris temperatura, 3. meth. 2. & 7.

Iecoraria vena, vide *Cava vena*.

Iecoris vena, vide *Choledocos*.

Iecur, vide *Hepar*.

Ieiunum intestinum, secundum est intestinum in ordine, quod à Duodeno intestino (quod vocant) multifariam in orbes conuoluitur, vasorum complurium serie contextos; Dicitur autem *ieiunum*, quod semper cibo vacuum reperiatur, 6. de anat. adm. cap. 9. quapropter Νίσσις, hoc est, *ieiunum*, appellatur, quod semper inane permaneat, nec tantillum quidem in se ipso alimenti contineat, 5. de vsu part. cap. 3.

Ignem, suo more Hippocrat febrem vehementissimam appellat, com. 3. in 1. morb. vulg. 19.

Ignis sacer, idest, *Erysypelas*, 8. de plac. 3. & lib. de purg. med. fac. cap. 5. vide *Sacer ignis*.

Ile, alias, Κερεών, locus appellatur, qui est inter thoracem,

racem, & os coxæ, propterea quòd κεντὸν, id est, cauum, & vacuum, depressumque est, 2. de his quæ in medic. 16. Totà ea regio inanis videtur, si tam cum inferis quam superis partibus, vtrisque ossibus conferatur. Quem locum etiam Græci Λαπάριον appellant, qui inter thoracis & iliorum ossa subidet, propterea quòd eo loco cingulum circumdatur, vnde & Λαγόνας ἰξύων etiam nominant, secundo de fract. 70.

Ileon, εἰλεὸν, intestinum est ordine à ventriculo tertium, quòd incipit vbi ieiunum desinit; eo scilicet loco, in quo chylus iam crassior effectus incipit consistere; chylus enim admodum liquidus à ventriculo prodians, facile per Ecphysim & Ieiunum intestinum effluit; exutus verò à venis quæ ieiunum circumstant, attractaque liquidiore eius parte, paulò crassior redditur, & in Ileo diutius cunctatur, præsertim obtula iam bilis acrimonia in Ecphysim excretæ, Ileoque ab ea minus demorlo atque irritato, diciturque εἰλεὸν, à multis anfractibus, & circumuolutionibus; idem verò & λεπτὸν, hoc est, tenue, simpliciter dicitur, nomine duobus etiam superioribus communi. A qua parte affecta, obstructa, & inflammata, nomen desumptis morbus peracutus, qui *Ileos*, εἰλεὸς appellatur, sed nihil vetat in crassiori intestino colo, eundem affectum progigni, sed mitiorem, & minus mortiferum, com. 2. in 3. de morb. vulg. Licet aliqui eundem in pleniori intestino factum vocent εἰλεὸν, in tenuiori εἰλεὸς, (cùm prius χορδαῖον diceretur) quòd per eum intestina εἰλεὸς, id est, conuolui, videantur: vnde quidam Latine *Voluulum* dixere; *Chordapsm* autem, quod qui manuum loco dolenti admovent, ex tensione, τῆς χορδῆς ἀπείλαι, hoc est, *Chordam attingere* videatur, 3. aphor. 22. & 6. aphor. 44. Sunt autem huius morbi symptomata, signaque ventris tormina, stomachus

chus multa humiditate perfusus, exolutiones animi, ructus inanes, vomitus pituitosi & biliosi, & inde aliquando desipientiæ, & conuulsiones. Moriturus vero sudor frigidus, vrinæ difficultas, podex ita astrictus, vt vel specilli extremum nequeat admittere, & vomitio stercoris. Verùm hæc omnia non omnibus pariter contingunt; vnum tantum est huic morbo proprium inseparabile, quod nihil ad inferiora descendat, nisi fortè liquida quædam pauca & serosa. Vomitus non semper adest, sed morbo tantum exitiali. Quod si vehementius æger laboret, stercus in os vsque ascendit, & singultus oritur. Cum enim intestina, quæ hoc malo tentantur, appetant a se expellere quod nocet, quodque iam longo tempore cæpit esse molestum, nec se propter obstructionem exonerare possint, concitant violentius noxiâ materiam, & in partes superiores contra naturam propellunt. Obstructionis autem causæ sunt cruditates, & continua ciborum corruptio, lethalia medicamenta, Enterocæle, Inflammatio, Colicus affectus, & aliquando stercoris nimia resiccatio.

Ilings, ἐλσγός, est tenebricosa vertigo, quæ fit, cum humor crudus, cum flatuoso crasso spiritu, in capite mouetur, & idcirco præcedit Epilepsiam, & Apoplexiam, 3. aphor. 17.

Ilium, λαγόνων ὄσφυς, est apophysis ossis sacri, superna, & ampla, continens intus ventris imi partem plurimam, tangensque Iliâ. Os enim sacrum tres habet apophyses rectas, nec deorsum, nec sursum repentes, *Ilium*, *Coxa*, & *Pubis os*; tamen os totum, sæpè *Os ilium* vocamus, quod id magnitudine, & crassitie præpolleat reliquis.

Illegitima costæ, quæ *Nothæ*, *Spuriæ*, & *Mendosæ* dicuntur, 5. de anatom. adin. cap. 1. cartilagineæ admodum existentes, sunt quatuor vltimæ costæ, quæ ad pectoris

es non pertingunt, 8. de anat. adm. cap. 1.

Illisio, vide *Collisio*.

Illofis, ab ἰλλο, *Oculus*, & *Strabismus*, seu *Strabilismus*, sunt inuitæ, musculorum palpebras mouentium, concussionones, 2. de sympt. caus. cap. 1.

Imas, vide *Gargareon*.

Imbecilla corporis pars est, vel quæ à primo ortu suo, & natura, est intemperatior, vel quæ ex præcedente aliquo morbo, intemperiem contraxit, vel quæ ex præfenti affectu intemperata reddita, promptius verò in iis partibus imbecillibus superuacaneum, qualecunque id sit, & morbidum congeritur, & suscipitur, quam in membris fortioribus, 1. 1. meth. 20.

Immutatus morbus est, cuius longior est accessio, & minor latis remissio; quo genere Antiqui *Typum quotidianarum*, & *semitertianarum* reponebant, lib. de Typis, cap. 3.

Impetigo Ἀειχλω, est summæ cutis asperitas cum multa prurigne, lquamis, & furfuribus, lib. finit. *Agrestes* verò *impetigines* nominant, quæ à medicamentis imbecilliter siccantibus, nihil iuuantur, a validis irritantur, 6. de comp. med. per gener. cap. 1. Ea autem *Impetigo*, quæ cum pruritu fit, etsi non aspera, sed lenior, quam vel *Psoa*, vel *Lepra* est, adeò vt si sola salua quotidie defricetur, sanescat; sed vbi increuerit, extremam cutem in furfures resoluens, in *Psoam* transit, atque deinde in *Lepram*, vbi pro furfuribus, pilcium quasi squamulæ concresecunt, & per frictionem decedunt, 5. de comp. med. loc. c. 5. & c. 7. (nec tamen est is morbus, quem Gallicum, seu Neapolitanum, seu Hispanam scabiem vocant, ut alibi mihi forte ostendendum erit.) Cæterum Ἀειχλω, *Lichenis* nomine, illum etiam *impetiginosum morbum*, *Mentagram* Romanis appellatum, multò magis

gis ferum, & ægreſtem. Plinius comprehendit, non ſquamis, vt Lepra, ſed ſædo cutis ſurfure, totos primum vultus, deinde verò & collum, pectusque, & manus occupans, oculis tantum immunibus. Fuit autem, vt idem author eſt, nouus morbus, & ante Tiberij Principatum penitus incognitus: nec verò in iis tantum notis feritas eiuserat, ſed quòd admodum contagioſus eſſet, ſoloque oſculo vel contactu, non humilem aut mediam plebem, ſed ſolos proceres inuaderet. Celſus *Lichenem*, non *Impetiginem* interpretatur, ſed *Papulam*; cuius duas, quas habet & *Lichen*, differentias, ſtatuit *feram*, & *mitiorem*: Nam quæ ab eo deſcribitur *Impetigo*, Lepra eſt.

Impetum facientia, vide *Continentia*.

Implicatus affectus eſt, in quo multæ ſunt affectæ partes; nam poteſt idem homo, non ſolum laborare ex Thorace, ſed etiam ex pulmone, capite, ventre, iecinore, com. 2. in 3. de morb. vulg.

Imum ventrem, vocat Hippocrætes regionem vètris imam, quæ vmbilicum ac pudenda interiacer, ita vt in hæc tria totum Abdomen diuidatur; in Hypochondriũ & loca ad vmbilicum attinentia, & imum ventrem, 2. aph. 35. Aut ſicuti Anatomici faciunt, in Epigaſtrium, Regionem vmbilicalem, & Hypogaſtrium.

Inæqualis, & *Inordinatus pulſus* eſt, cuius circuitus nullus prorsus aut ordo ſeruatur; Eſt verò *equalis*, & *ordinatus*, quando pari pulſuum æqualium numero intercurrat pulſus vnus impar, qui æqualitatem corrumpit, proportionem circuituum obſeruata, de pulſ. ad Tyr. cup. 6. *Inæqualis* autem *deſiciens pulſus* eſt, in quo nulla ſeruatur æqualitas, motuque ipſo ſemper deficit, 1. de differ. pulſ. cap. 12.

Inanes, illæ corporis partes vocantur, quæcunque inter

inter extremam Thoracis costam, & Femoris *Ααγος*, ossa habentur; inanis siquidem videtur omnis talis sedes, si eam cum supernis, infernisque partibus, vtriusque offei conferas, 2. prognost. 1.

Incesiones, Hippocrates vocat, *Inflammationes*, unde etiam nomen calidis tumoribus impositum est, 3: de his quæ in medic. 30.

Incidentes dies, vide *Decretorius*.

Incisio, vide *Unionis solutio*.

Incisorii dentes, vide *Dentes*, & *Tomi dentes*.

Incoctionem vocat Galenus non coctionis tantum in ventriculo frustrationem, sed in vasis quoque, & iecore, & vniuerso corporis habitu, lib. de med. art. const. c. 15.

Incrementum morbi, vide *Ascensus morbi*.

Increscens, vide *Continuus*.

Incubus, vide *Ephialtes*.

Incurvatio, quæ & *Gibberositas* dicitur, est distortio spinæ in posteriorem partem, ex Panis, & Tuberculis immaturis in spina exortis magnis, & duris, & diuturnis, vt nonnulli arbitrantur.

Index digitus, est proximus à Pollice, qui nomen ab usu sortitus est, lib. intròd. c. 10. Dicitur & *Index*, *Dies contemplatorius*, qui eam habet naturam, vt qualisnam dies, cuius est index, sit faturus decretorius, prænunciet velut, & indicet, 1. prorrh. 1. & 2. aph 14.

Indicatio, est iuuantis comprehensio, simul cum comprehensione nocentis eueniens, sine obseruatione, & ratiocinatione; ad Thrasib. cap. 11. Quippe ipsam sequentis, siue agendi & eius, quo fieri debet, *Indicationem* dicimus; Ergo, ex ipsa rei natura exordiri, atque ita, quod sequens sit, citra experientiam inuenire, idem est, quod indicatione inuenire. Vt si queratur de sanitate, quid sentiendum sit; primum perpendere oportet sanitatis

tatis naturam, quæ quia bona omnibus mortalibus videtur, facit, ut iudicemus eam a nobis seruandam esse; quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem vero & in morbo agendum, qui, quoniam totus præter naturam non est, & toto genere malus, indicat, & ostendit, se tollendum esse.

Indicatoria, vide Prognostica.

Indices, & spectabiles dies, consueto more appellat Hippocrates, in quibus signum aliquod iudicationis apparet, alio quopiam ex diebus decretoriis futuræ, quos ipse, 3 progn. 4. per quaterniones digessit, singulis septimanis bipartito sectis, 2. aphor. 24. qui Græcè *Ἰνδίκαι, & Δεσπινῆαι*, & hoc est, *Indices, & Contemplabiles*, nuncupantur, quod maiorem vim, & potestatem habeant, ad prælagendam, contemplandamque futuram crism, quam ad iudicandos morbos; licet in eis, aliquando perfecta crisis possit accidere; ut dies quarta, vndecima, decimateptima. Nulla crudi humoris excretio critica est, ut crism igitur concoctio præcedat, omnino necesse est, quoque ut perfectior concoctio fuerit, eò melior futura est crisis. Itaque ubi concoctionis signa videri incipiunt, spes est propediem futuram crism: ut, si quarto appareant, futuram septimo: si vndecimo, futuram decimoquarto: si decimoseptimo futuram vigesimo: atque ita deinceps aliis septimanis. Hippocr. aphor. 24. lib. 2. Si igitur quarto die cuiusque septimanæ signa mortifera appareant, certa perniciēs septimo expectanda: contra, si illo die salutifera signa se prodant, salus die septimo promittitur. Quod, cum in omnibus morbis verum sit, in acutis tamen omnium manifestissimè deprehenditur, in quibus mutationes maiores magisque subitæ contingunt. Adeo verum est, quod scripsit Hippocrates, septenorum semper quar-

tum diem esse indicem . Quod si fuerit aliter aliquando obseruatum , sciendum id non ex diei ipsius natura , sed alia de causa contigisse . Ex sua namque natura hoc est , si nihil rarum magnumque vel extrinsecus , vel ex ipsa morbi specie , morèque , vel etiam ægrotantis habitus acciderit , quartus omnino septimum , qualis futurus sit , declarat , vt Galenus libr. 1. cap. 11. de diebus criticis apertissimè demonstrauit .

Indicia , & signa , certa , Prægnostica , illa sola nominantur , ex quibus licet certò colligere aliquid de salute , & interiectione infirmi , quæ comprehendens vno capite dicit aliquis esse significationes virium gubernantium corpus , quo pacto robore valeant , aut deficient , in quibus scilicet cruditat's etiam , aut costionis signa continentur , 3. prognost. 39.

Inflammata Lassitudo , & Lassitudo contusiva , Phlegmonodes , musculorum est affectio , quæ manibus , cruribus , lumbis , spinæ , musculis , ac vbi plurimum laborem pertulerint accidit : hisque , qui ex vehementi clamore , organa vocis , idest , arteriæ asperæ caput , laryngem , & fauces oblæsas habent , vocemq; raucam effecerunt , 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Inflammationis nomen , propriissimè dicitur de tumore partium carnosarum , coniunctis cum renitentia , tensione , febris , calore , dolore , & rubore , lib. de tumore cap. 2. *Phlegmone* , fit vel propter concidentiam , vel propter impactionem , obstructionemq; omnium vasorum , siue ob circumstantiam quandam inolium , vicinarumque partium molestias , quæ inæatus occupant . Tandem etiam ex abundantia sanguinis , inflammatio oboritur multoties , lib. de totius morbi temper. cap. 3. Dicitur verò *Inflamatio , Phlegmone* , multoties esse nihil aliud , quam *Phlogosis* , siue *Inflammen* . Est igitur

*Inflammati*o, omnis genus, si spectes, immoderata caliditas; in specie autem est, cum, sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obunente, ad particulam aliquam vniuersim fluente, atque ob multum linem edomari nequeunte, vehemens dolor arripit hominem (nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit,) pulsusque in profundo molestus accidit, tendique omnino, ac contundi membrum, apparet, & vehementem calorem per sentit, adeo ut comburi videatur, & refrigerari desideret; talisque robur per summa viget, qualis ex balneis accidit, aut ex igne, aut quouis alio modo calefactis. Multæque sunt huius species, nam aut affluente sanguine, aut staua bile altera, ambobusque simul humoribus, alia tertia oritur Phlegmone, 2. ad Glauc. 1.

Inflammen, vide *Inflammati*o.

Inflatio, vide *Physis*, 14. Meth. 7.

Infractiones oculorum, affectus est, in quo palpebræ inuertuntur, com. 5. in 6. de morib. vulg. 2.

Infundibulum, vide *Choana*.

Inion, est ea capitis pars, quæ occiput dicitur, principium medullæ spinalis, ad stipitis motum in multos ramos diuisæ, in sexaginta ferè, iuxta numerum nervorum, 2. de compos. med. loc. c. 1. τὸ Ἰνιον terminatur futura Δαμῶνιδει. Quinque videtur lateribus constare. Est autem valde inæquale: siquidem parte postica admodum crassum est, inferna qua musculos excipit, aut aut emittit, asperum, tenue, solidum. Duæ illi sunt acutæ apophyses, quæ in cavitates duas primæ vertebræ inferuntur. Intus quidem læue, minimèque asperum est: infernis autem partibus, & ubi non minimam capitis basis portionem constituit, valde asperum & inæquale, ut commodius inde ligamenta & musculi nascerentur, quibus caput collumque vel extenderetur, vel

flecteretur. Sic quidem Medici Anatomes periti *ὀνόματι* describunt: Sed a quibusdam Grammaticis definitur tendo ceruicis, quo concidente ad inferiora, & contracto ad humeros *ἰσχυρῶς*, hoc est, incuruari dicitur, quid patitur. Plerisque placet *ὀνυχ* sic dictum esse *διὰ τὸ νεύοντες εἶναι*, quia nervosū sit: quod Græcis *νεύρι*, nervi dicantur, a capite in collum descendentes, quos alij *τένοντες* vocant.

Initiatrice, vide *Antegressa*.

Innominata Carilago: vide *Cricocides*.

Innomizatus morbus est, qui medio loco, inter Lethargum & Phrenitim collocatur; alias dicitur *Coma perniciosa*, in quo ægri conuiuent oculis, somnolenti stertunt, oculis fixis intuentur, difficiles & tardi ad respondendum, stultè loquuntur, & temerè nugantur, lib. de Puls. ad Tyron. ca. 11. quem affectum, cū longo tempore perdurauerit, *Typhamaniam* vocant, 1. prorrh. 1.

Innuens, circumnuens pulsus est, qui inæqualis est in vna distentione, 1. de diff. puls. cap. 20. & 4. de caus. puls. cap. 10.

Inordinata febris est, quæ omni periculo, & certo circuitu caret; 5. de placit. cap. 2. Aliàs, *Erratica* dicitur, 8. de placit. cap. 6. vide *Erratica*.

Insanire, est desipere citra febrem.

Inspiratio, est externi aeris intra thoracem facta attractio, 4. de loc. aff. 7 ad natiui caloris conseruationem, & spiritus animalis nutritionem, 7. de vsu part. cap. 9. duplex est; lenis, & coacta. *Lenem* & *non coactam* appellant, quæ in bene valentibus, nullaue vehementi agitatione motis cernitur, ac solo peragitur Diaphragmatis motu. *Coactam* verò, quæ tū in morbis nonnullis, (imprimis in Apoplexia forti) tū in exercitationibus paulò vehementioribus accidit, in qua protinus
untur,

omnes etiam scapularum partes simul attolli conspiciuntur, 2. de placit. cap. quarto, *Inspiratio, & Exspiratio*, *εισπνοή & εκπνοή*, oppositi motus sunt; Ille est, quo distensus Thorax per asperam arteriam, necessario in pulmones aerem exteriorem attrahit, tribus de causis: vt refrigeret, vt ventilet calorem nativum, & vt spiritum animale gignat; Hic est, quo thorax contractus, eundem aerem exprimit, vt quicquid in ipso fuliginosum, fumosumque ex humoribus creatum fuerit, id exprimendo elidat. Vtrique nomen *Respiratio, & Respiratus*, *πνεύμα*, 4. de loc. aff. 7. Per *inspirationem* autem attrahit in se homo exteriorem aerem, per os, in pulmonem; per raritatem autem cutis, & carnis, in arterias. Horum motuum vterque tam ille, quo per os, quam is, quo per cutim fit aeris attractio, vno nomine *inspiratio* appellatur. Per *expirationem* verò, per eodem meatus, per quos aerem recipit, eundem remittit; qui cum per os remittitur, *expirationis*; cum per cutis meatus, *transpirationis, perspirationis, difflationis, transpiratus, perspiratus, difflationis*, *πνεύμα* dicitur, 8. de plac. c. 8.

Instrumenta prima censentur, quæcunque ex similibus partibus simplicis alicuius operationis gratia sunt constituta; quæcunque verò rursus ex his componuntur, etsi vni totius instrumenti actui, quam maximè inserviant, tamen inter secunda connumerantur; musculus enim & vena, & arteria, inter prima instrumenta numerantur, digitus verò inter secunda, atque hoc magis pes, & pede magis crus, lib. de morbis temp. cap. 4. Vnde *instrumentales corporis partes* sunt, Cerebrum, Cor, Pulmo, Hepar, Venter, Splen, Oculi, Renes, ibid. cap. 3. *Instrumentales* autem morbi fiunt, vel naturalium partium formatione permutata, vel non servato numero partium ea componentium opportuno,

aut vnicuique parti conuenienti magnitudine sublata, vel quod non vt naturalis positus expetebat, ipsæ cohæreant; ibid. c. 6. Vide *Similare*.

Insultus accessionis, est indiuisibile illud tempus, quo accessio primū inuadit, quod alij *Febrils significationem*, *Annotationem*, & *Episemasiam* vocant, li. de morb. temp. 6.

Intemperies morbosa, Græcis Νοσῶδης δυσκρασία, partium similiarium morbus est, fitque, vbi qualitates primæ, seu elementa ipsa a naturali symmetria & commodatione deflectunt. Non autem citra rationem adiectum est *morbosa*; duplex enim existit intemperies, ex Gal. 2. de temper. Alia enim est naturalis, seu sanitatis, & alia morbi (vt nos tetigimus in nostra Synopsi medicinæ, quam anno superiori typis dedimus, tab. 5.) *Sanitas*, siue *naturalis* est, quæ a media temperie paululum abest, citra euidentem interim functionis noxam, vel in qua nulla functio animalis adhuc manifestè læditur, licet imbecillior reddatur; tunc etenim intemperior sanè erit, sed non ægrotabit homo. Quod si quis hoc denegauerit, horum alterum fateatur necesse est, vel omnes homines ægrotare semper, vel vnam esse omnium intemperiem; vtrumque verò absurdum est. *Morbosa* verò *intemperies* est, cum animal naturalis temperamenti vitio ægrotat; quæ si omnibus corporis partibus æqualiter intus, vt in Hectica febre, æqualis intemperies appellatur, & dolorem non efficit; locus vero doloris sensum efficit, & inæqualis dicitur, vt docet Gal. de inæquali temper. i. de sanit. tuend. lib. de const. art. & cap. 8. artis paræ.

Interceptiones venarum, ἀπολήψεις τῶν φλεβῶν, sunt oppletiones valorum a copia sanguinis; venæ enim cum supra modum oppletæ fuerint, premi virtutem, grauarique est necesse, atque in extinctionis agi periculum
nati-

natiuam caliditatem; quippè quæ ob multitudinem, copiamque, suffocationi quippiam simile patitur, 4. aph. 23. Vbi verò interceptiuntur, quæ sunt in animali arteriæ, & ita oppletæ sanguine fuerint, vt nullus in ipsis vacuus reliquatur locus, in quem dum attolluntur, aerẽ externum attrahere possint, tunc strangulatur, atque extinguitur calor innatus: qui ita affecti sunt, subito sensum & motum totius corporis amittunt, lib. de caus. morb. c. 3. tertio, nequeuntibus spiritibus naturales pertransire meatus, atque ob id Hippoc. *interceptiones spirituum* nuncupantur, 4. de rat. vict. 27.

Intercidentes, vide *Decretorius*. *Intercidens* autem pulsus est, cum inter duos ictus, qui in ordine proprio inferuntur, ictus medius incurrit, lib. finit.

Intercidentia, vide *Coincidentia*, & *Peremptosis*.

Intercipientes membrane, vide *Cingentes*, & *Hypozocotes*.

Intercostales muscoli, μεσοπλευροὶ μύες, sunt muscoli inter medias costas sitii, quorum bini sunt in singulis costarum intervallis; alter externam partem spectans, alter interiorem: *externi*, thoracem dilatant, ad inspirationem; *interni*, contrahunt ad expirationem, 5. de caus. respir. 8. de anat. ad m. 7. & de vlu part. Hi numero sunt quadraginta quatuor, vtriusque videlicet duo & viginti. Horum autem vndecim interni, & totidem externi sunt. Externi quidem singuli in singulis costarum intervallis oriuntur, & fibras habent ex superiore costa in inferiorem oblique deductas. Interni verò contrario & oriuntur, & proceunt modo, originem quidem ex inferiore costa ducentes, & oblique sursum in superiorem protensi, & externos ubique in χ litteræ formam interfecantes. Cum autem eiusdem fibras eoque modo protensas habere hi muscoli dicuntur, intelligendum

dum est de spuriarum quidem costarum interuallis tōtis verarum autem costarum non totis, sed ad eam tantum costarum sedem, vbi in cartilaginem degenerant. Siquidem in verarum costarum cartilagine, vtrique muscoli intercostales villorum situm prædicto contrarium sortiuntur, vt propterea vnus idemque musculus inter verarum costarum cartilagine situs, non vnus, sed geminus plerisque existimatus fuerit.

Intercurrens pulsus est, qui inæqualis est, inæqualitate crebritatis, 1. de diff. puls. cap. 12.

Interfœmineum, quod *Perinaeum*, Græci vocant, est media illa pars corporis, quæ inter totum id, quod inter inguina vtriusq; cruris est (quod *Gressuram* solet Hipp. appellare) interiacet, quod duobus feminibus sit interpositum. Siue est intercapedo; quæ ab exortu pudendi vsque ad anum pertinet, vbi etiam vesicæ collum collocatum est, 4. de art. 45. 2. de fract. 43.

Intermissionem febris, vocat Gal. cum febris in quietem desierit, 1. de cris. cap. 3. & ad infebrecitationem deuenerit, Græcis ἀπουσία, 3. de cris. cap. 4.

Intermittens pulsus est, qui inæqualitatem constat raritatis, & paruitatis, alio atque alio vtroque modo. Habet raritatis inæqualitatem, quod quies sit longissimè producta; paruitatis autem quod distentio minimum dilatata, 1. de differ. puls. 12.

Internodia, vide *Phalanx*, & *Digitum*.

Intersepientes, vide *Hypozocotes*.

Interseptum, ea est pars narium, quæ alas seu pinnae las narium nominatas, internamque illam cauitatem in duas partes discriminat, lib. Introd. cap. 10.

Interstitium, est duodecim horarum spatium, in quo febris terminatur, 2. cris. 9.

Interrigines, vide *Hidroa*

Inter-

Interuallum, vide *Œtas*, *Ablatio*.

Intestinum, vide *Entera*.

Intestinum cæcum, τυφλόν, est intestinum à ventriculo, ordine quartum, quod paruus quidam velut venter est, vnde figura a reliquis differt; nec enim, vt reliqua, oblongum est, sed in modum ventriculi rotandius; ex qua figura efficitur, vt vna tantum parte pertusum videatur, & vno foramine tanquam oculo præditum esse; peruium tamen est, quodque ad ipsum ex tenui intestino ileo descendit, facile in Colon delabitur. Principium est crassi intestini. Vbi enim tenue intestinum desinit, illinc ad dextram quidem cæcum, ad sinistram autem Colon emergit, dextra prius ilia præteruestum. Cum auibus ferè omnibus cæcum intestinum duplex sit, homini tamen vnicum est. Et gibbosum cum sit, vnum foramen habet à latere, cui iunguntur duo foramina, duorum proximorum intesti norum; quorum vni infra, alteri supra continuum est. Id propter magnitudinem aliquando absolute έντερον appellatur, vt scribit Galen. comm. 4. in lib. 6. Epid. quamuis alii eo nomine absolute posito, το κώλον intelligi velint. Cum autem reliqua omnia intestina lactibus alligentur, solum cæcum omni vinculo solutum est, ideoque descendit in Scrotum, per Enterocelen.

Intestini norum difficultas, est velox exitus eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deijciuntur, qualia fuerunt deuorata, 4. aphor. 12. Propriè, *lienteria* dicitur, 6. de loc. affe. 2. quæ duabus potissimum notis a *Cœliaca* dispositione discernitur, siquidem lientericis alimentis prorsus cruda, protinus vt supra sunt, infernè prodeunt tanta, tamque manifesta cruditate, vtimenti assumpti genus aperte dignoscatur; verum in Cœliacis iam adepta sunt aliquam coctionem, & diutius in ventriculo

tulo morantur, neque tam citò per alium descendunt; Cruda tamen sunt, & aliquando foetida, non mordacia, sed quod læpius excreta, animi deliquium inducant.

Intumescencias, quas *οἰδήματα* Græci vocant, Hippocrates omnes tumores præter naturam vocare consuevit, cum cæteri posteriores, in inflammationes, & durities, & intumescencias, eos distinguant, 3. de his quæ in medic. 30.

Inuiolata membrana, vide *Membrana dura*.

Inuiscatio oculi, est quædam viscositas, palpebram, cum pupilla iungens, siue in eius albedine, siue in eius nigredine; vel vtrasque palpebras simul iungens, qualis fit propter vulnera in oculis, lib. de ocul. cap. 9.

Inuolucrum cordis, vide *Membrana pericardios*, lib. de ven. & art. diss. cap. 2.

Inuolutum intestinum, quod & *Ileon*, & *Tenne* dicitur, vide *Ileon*, & *Tenne*.

Inustio in ventre, oritur, propter acrem eorum, quæ ingesta sunt, caliditatem, ob quam & febrile contingit; *Colliquatio* verò fit, febrili a caliditate absumpta pinguedine, colliquataque molli carne, 4. acut. 12.

Iorbo Græcè, Latine *Varus*, tumor parvus, & durus, in faciei cute ortus, a crasso videlicet succo nullius serosæ tenuitatis particeps, 5. de comp. med. loc. cap. 3. eam ob rem pruriginosus non est, neque ad scalpendum inuitat. Ex iis quæ scribuntur a Paulo, lib. 3. c. 25. apparet, duplex esse *Varigenus*: vnum duriores & veluti callotum; alterum verò, minus durum. Aetius scribit *ἰορβος*, alio nomine *αἰνυ* vocari.

Iris oculi, quem alii *Stephanon*, alii *Coronam* vocant, est medius ille oculi locus, quo committuntur inter se tunicæ vniuersæ. 14. meth. 19. siue *Iris*, est oculi tunica mollissima, alba, desinens in circulo, vbi & aliæ omnes subiectæ

subiectæ sunt tunicæ, & album nigro coniungitur, 10. de vlu part. cap. 2. Inditum ei fuit nomen, ab arcus cælestis similitudine. Huius partes quæ pupillæ proximæ sunt nigræ, *πασαί* dicuntur: circulus vero qui candido proximus est, *ἄλως*. *Iris* herba etiam est; folia ferens gladioli, sed maiora, latiora, pinguiora. Flores in summitate cuiusque caulis æqualibus inter se spatii distant, incurui, varii, siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei aut cærulei conspiciuntur, qua diuersi coloris specie, quædam cælestis arcus imago in cauo caliculi sinu representatur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustratim dissectæ in umbra secantur, & traictæ lino reconduntur. Melior est *Illyrica*, & *Macedonica*: atque est satiuæ, & sylvestris. *Iris* nomen quoque est *Pastilli*, *Croco*, *Myrrha*; & *Alumina* constantis, vt refert *Acrus*. Est etiam gemmæ nomen, quæ non est aliud quam *CrySTALLUS* candida, limpida, sexangula, quæ exposita Solis radiis, per rimam aut aliter subauntibus, angulorum repercussu arcus cælestis speciem in proximis parietibus imprimit. Sed in ipsa in se arcus illius imaginem habere videtur in vno aut altero sui angulo, si luci obuersa conspiciatur.

Isarodes bilis, vide *Bilis pallida*.

Ischamon, medicamentum est ad sanguinem fluentem continendum, 5. de comp. medic. loc. cap. 14 Græcè *ἰσχάμων*, paulò diuersum ἀπὸ τῆς *Ναίμης*; hoc enim non sanguinem modo supprimit, sed & inflammationem arcet; illud verò rationem habet tantum sistendi sanguinem. Huius, cum aliquot formulæ descriptæ sint apud Galenum, omnes contine reperi as vrentibus, crustamque inducentibus medicamentis.

Ischiadica vena est, quæ supernè descendens, ad partem cruris intimam tendit, & occultatur, quousque ad

Malleo

Maleolum veniat exteriorem, lib. de anat. viii. quæ vena, externa *Maleoli* dicitur, & *Ischiadica*, quod secta, *Ischiadicis* conferat.

Ischias, & *Ischion*, vide *Coxa*, & *Arthritis*, 2. method. 2. & 15. de vlsu part. 8.

Ischuria, *ixupia*, est urinae suppressio, & retentio *Dysuria*, in qua urina fertur cum difficultate; *Stranguria*, cum guttatim destillat, quam & *urinae stillicidium* appellant, de const. artie. 6. & 8. de placit. 6. Fit autem urinae suppressio, vesicæ vel excernere non valente, vel eius collo occluso: vocat autem vulgus Medicorum, non lecus *Ischuriam* (quanquam *Ischuria* non sit,) illud quoque symptoma; cum urina in vesicam omnino non venit, perdita scilicet renum actione, & permittendi profectò sunt ita nominare, cum propriam appellationem non habent; Collum siquidem vesicæ clauditur, vel propter obstructionem à sanguine concreto, tum erasso pure, tum calculo, tum topho, tum aliquo germine carneo ibidem enato, vel propter conniuentiam, ab aliquo tumore præter naturam, aut cum immodice est repleta; 3. de sympt. caus. cap. 2.

Isis emplastrum, est *Cephalicum emplastrum*, 2. de compos. medic. per gener. cap. 18. Ad cruenta vulnera efficax, præsertim capitis, ad glutinandum, carnem inducendum, purgandum, & reliqua multa, ut habetur apud Aetium, lib. 15 quo loco descriptionem eius habet, & dicit à quibusdam referri ad Hermonem Sacerdotem, & appellari *Hermonis viride*. Habetur & apud Scribonium Largum, cap. 206. (sed *Viride Glyconis* nominat) diuersa quidem ratione compositum, quam sit ab Aetio & Paulo, sed magna ex parte iisdem medicamentis constans. Est & *Isis* alterum Emplastrum, quod Epigonio inscribitur apud Aetium eodem loco. Est igitur

Igitur huius nominis Emplastrum triplex; Ἰσθμίου, Ἰσθμίου, Ἰσθμίου, Ἰσθμίου, Ἰσθμίου.

Isthmus, est regio communis gulæ, & gutturi, in qua vtriusque osculum ascendit, angusta & longa; corpus verò hunc locum ambiens, *Pharynga*, idest, *Fauces*, vocant, lib. de muscul. diff. cap. 15. *Isthmus* ea pars corporis est, quæ os, & gulam interiacet, quæ per metaphoram quandam ita nominatur ab iis, qui propriè dicuntur *Isthmi*. sunt autem angusti quidam terræ processus, inter duo maria siti: Vnde *Palisthnia*, idest, *Tonsillæ*, sunt inflammationes locorum, & partium, ad hunc *Isthmum*, pertinentium, 5. aph. 26. quæ ratione ἰσθμὸς καὶ λάρυγξ, idem erunt, hoc est, quæ inter stomachum, & laryngem, idest, guttur, interiacet latitudo & capacitas.

Isthmoeidea ossa vide *Cavernosa*.

Indicatoria signa, ab Hippocrate vocata sunt, sudores, rigores, sanguinis fluxus, multum alui profluvium, multus vomitus, dolor capitis repentinè inuadens, vehemens spirandi difficultas præter rationem, cordis morsus, quædam in Hypochondriis citra dolorem tensio, vigilæ vehementes, delirium, nox absque ratione molesta, accessio anticipans, lacrymæ inuoluntariæ, nihil patientibus oculis, neque ex tristitia provenientes, rubor faciei, labrum inferius agitaturn, liuida, vel obscura, & tenebrosa quædam ante oculos obseruantia, hallucinationes quædam, genæ vel nares repentinè rubescens, parotides, aut denique abscessus alicuius in articulum decumbentis generatio, & similia; quæ secundum eorum substantiam Casus, vel Symptomata nominata, quatenus subitam mutationem ostendunt, *Indicatoria signa* appellantur; ita enim morbum iudicant, ut cocto morbo futuram sanitatem; crudo au-

tem,

tem, vel perniciem, vel morbi longitudinem decernant, 1. aphor. 12. uide *Decretorius*.

Iudicium, siue *Indicatio*, uide *Crisis*.

Iugale os, uide *Zygoma*.

Iugulares vena, *Σαγγίτις ἐξίη*, sunt duo rami magni venæ cavæ à gibbis hepatis exortæ, qui postquam ad dextram Cordis aurem sanguinem tulerint, ab eo, tanquam ab initio progressi, ad collum recto tramite festinant: In quo sunt duæ magnæ, & insignes venæ, quæ ob id *Iugulares* vocantur, 2. acut. 10. & libr. de ven. & art. diss. c. 7. Dicuntur etiam *Externa*, *Superficialia*, *Αποπλεττικά*, *Guidæ*, *Manifesta*, a quibus quippe superficialiæ ferè omnes colli, & capitis, partes nutriuntur, 2. acut. 10. Interna Iugularis gracilior secundum latus asperæ arteriæ ascendit ad fauces, & inde in cranium, venulis exilibus obiter missis in asperam arteriam, & membranas vicinas, & nervos sexti quidem paris in collo, septimi verò in faucibus. Vbi autem cranium attingit, bipartita maiore ramo per craniibasim reflexo, ubi surculum dedit musculo colli interni longo, per foramen paris sexti cum minore carotide arteria sibi coniuge cranium ingressa coit in vas commune. Minore autem ramo, ubi ramulum auditus organo dimisit per foramen transversum sibi commune, & portioni nervi quintæ coniugationis crotaphiten petenti, cranium intrat per foramen sæpè geminum, sed exiguum propè latus externum foraminis tertiæ & quartæ coniugationis, in crassam meningem ramosè ablutitur. *Externa* verò Iugularis sæpè simplex, interdum etiam diuisa multipliciter, idque nunc initio sui, nunc in collo medio ascendit sub colli latus, sub cute & musculo lato, surculis obiter in vicinos mulculos, cutim, membranas, dimissis. Est autem notandum, externas Iugulares nullas habere

habere adiunctas arterias , etiamſi quandoque motu aliquo pulſui cuidam non diſſimili agitari videantur , vt aſe obſervatum eſſe, Gal. prodidit .

Inguis, vide *Claves* .

Inlep, vide *Zulapium* .

Iuxtaſquina, idelt, *Cynanche*, 1. aph. 12.

Ixia, *Varices*, ſic dicuntur ab Ariſtotele, οἱ κίρτοι ; ſunt tamen qui differre putent , vocantes κίρτις venas omnes dilatatas, in quacunq; corporis parte ; ἰξίαις vero, eas modo , quæ in cruribus habentur : ſed quærimus nullum cenſendum eſt .

L.

LABOR, ab Hippocrate ſæpius conſuevit ſumi pro *exercitatione*, interdum pro *dolore*, aut abſolute pro *qualibet noxa & læſione*, comment. 5. in 6. de morb. vulg. 10.

Labrum, ſive *Labium*, χείρ, eſt oris extremitas muſculola, ipſu viciffim claudens, & aperiens, quod in labiis prominet πρὸς χείλον dicitur, 11. de vñ par.

Labyrinthus, vide *Cæcum foramen* .

Lactes, apud Hermoſiaum Barbarum , & Plinium . , ſignificant potiſſimum molliora inteſtina , & ſunt in homine, & oue , per quæ cibus & chyſus labitur , ſed apud Ariſtotelem, Gazam, Budæum, & Galenum , 5. de loc. aſſe cap. 7. *Lactes* ſunt, & ſignificant omentum retiſcupario ſimile, ſeu pingue illud, quod inteſtina ſuperiora ambit; quod noſtrates in piſcibus *lactantias* & *lactimas* vocant .

Lacuna, vide *Choana* .

Leues arterie, *Arteria venoſa*, & *Vena arterioſa*, per pulmonum ſubſtantiam propagatæ , & diſperſæ pro
pages

pagines sunt, quas omnes natura per anastomofin, ad vnum principium applicuit, sinistro cordis ventriculo, in quo quidem natiui caloris est principium, vt per eas refrigeratio continua cordi compareretur, 7. de vlu part. cap. 9. vide *Arteria*.

Leuitas intestinorum, quæ *λεαντερία* dicitur, quasi *λεϊότης* ἢ *ἁγέρων*, est velox, & sine vlla omnino transmutatione, ciborum deiectio, eueniens, aut propter exulcerationem in superficie ventriculi: & intestinorum, aut propter potentiae retentricis eorundem imbecillitatem; quorum primum ex mordacibus substantiam tenuem habentibus humoribus fit, quæ in pueris etiam Græco vocabulo *Ἄφθαι*, idest, *oris ulcera*, nominantur; alterum verò, ex magna ventriculi, atque intestinorum prouenit intemperie, 3. aph. 22. Ex quacumque autem causa lienteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & in cachexiam incidunt, cruda assidue excernunt, colore subalbida, inequalia, atque aquosissima, nullo prorsus sanguine, aut bile perfusa. Ardor præterea tota præcordia occupat, cibique fastidium consequitur. Vide *Intestinorum difficultas*.

Lagochilos, vide *Lagophthalmos*.

Lagonas, vide *Ile*.

Lagophthalmos, idest, *Leporinus oculus*, est, cum superior gena adeò retrahitur, vt oculum, dum clauditur, totum non contegat, estque effectus in partibus instrumentalibus, non magnitudine, sed defectu, non vt superuacaneum, sed veluti deficiens, cuiusmodi mutila, & curta omnia, sicut in labris, sic & in oculis cernitur; sic etiam *Lagochilos* dicitur, qui leporina habet labia, libr. Introd. cap. 3. & lib. finit. Id vitij aliquando naturaliter prouenit: aliquando à causa præter naturam, vt vssione, cicatrice, sutura latiore, & malefacta: interdum etiam

etiam senectute. Idem si inferiori palpebræ contingat;
ἐντροπίον appellatur.

Lambdoeides, sutura capitis posterior est, & trans-
 uersa, qua occiput incipit, quæ a *Lambda* literæ Græcæ
 similitudine ita nominatur, lib. de ossib. cap. 1. Sunt au-
 tem huius saturæ extremæ partes, quæ propter occi-
 pitij humilia non amplius exactam saturæ compa-
 gem exprimunt, & versus capitis basim protendun-
 tur, sensimque sibi inuicem appropinquant. Cæterum,
λambδοειδής futuram Galenus deesse scribit, quibus emi-
 nentia occipitis nulla est. *Λωλοδοειδής* etiam appellatur
 ab Actuario diuisio venæ cauæ inferioris, qua in duo
 crura abit paulò supra initium ossis sacri, non dubium
 quin à forma literæ λ. Eandem diuisionem Galenus lib.
 de anat. venarum elemento v comparat.

Lambdoeides os, vide *Hyoieides*.

Laminas, communi vocabulo Anatomici appellare
 consueverunt, instrumenta ad secanda corpora accom-
 modata, cuiusmodi etiam sunt Scalpella, Spathomelæ
 Amphilmelæ, Spicilla, Oricularia, Melatidæ, quæ &
 ex ligno densiori, & aliquando ex buxo, confici solent,
 6. de anat. adm. cap. 10.

Lana succida, id est, non lota, quæ & *Oesypus* dicitur,
 14. method. c. 7. *ῥιτυνός*, propriè dicitur ouium sordes
 earum lanis adhæscientes: deinde verò pro ipsa etiam
 lana adhuc sordida, & illota dici cœpit. Sordes autem
 eæ, pēcudum ex sudore foeminum & alarum colligun-
 tur, adhærentque lanis, quæ quò *ῥιτυπὸν* habeant;
ῥιτυπῆραι, *ῥυτῆραι*; & ab Hippocrate *πινώσσαι* & *πινώδες*
 appellantur: Est enim *πίνω* idem quod *ρύπτω* - Latini,
Sordidas & *Succidas* vocant, quod tales sint, quales
 ubi primum succisæ detonsæque sunt. De *Oesypo* sic scri-
 psit Ouidius:

*Oſſa quid redolent, quamuis mittantur Athenis,
Demptus ab immunda vellere succus ouis?*

Dioscor. *Oesypon* appellauit succidarum lanarum pinguetudinem, eiusque extrahendi parandique rationem lib. 2. explicauit. Ex eo conſtitit *Pharmacum* à *Pau.* & deſcriptum, lib. 7. & ab *Actio*, lib. 15. quod Græci alias *δισυπον φάρμακον*, alias *δισυπον κηρωτήν*, alias *δισυπον κηρόν* ποείν, alias *δισυπον ὑγρόν* nuncupant, eiudem prorsus cum ipſo *O* *ypo* facultatis, aded vt promiscuus fit amborum vſus, vt tradidit *Galen.* 14. method. medic. Habet autem vim non ſimplicem, ſed miſtam ex contrariis qualitatibus ac viribus aſtringendi ſcilicet, & modice calefaciendi. Ex quo conſtit, vim illi ineſſe leniendi, digerendi, & repellendi. Dicitur non tantum *δισυπον*, gener. maſc. ſed etiam *δισυπον*, & *δισυπν*.

Laparon, Græcis, molle & vacuum; *Hypolaparon* autem *ſubnacuum* & *ſubmolle* ſignificat, 3. de diff. reſp. cap. 12. Sumitur & pro ventris dolore, com. 3. in 6. de morb. 32. vide *Ile*.

Lapideum os, vide *Lithoeides*.

Lapis in veſica, propria paſſio eſt fere puerorum, qui ob edacitatem non paucos crudos humores coaceruant; ex quibus pars craſſior, vna cum vrinis ad veſicam perueniens, fit lapidum generationis materia: aceruatur verò hic crudus humor ſæpè ob edacitatem, & ingluuiem, ut in pueris, ſæpè etiam ob potentiæ concoquentis imbecillitatem, vt in ſenibus, 3. aph. 26.

Lapis ſpecularis, uide *Diaphanes*.

Larynx, ſiue *Guttur*, eſt ſuperior bronchij terminus, ſeu bronchij caput, prima aſperæ arteriæ pars, primum vocis inſtrumentum, ſummo ori continua, lib. de voc. inſtrum. diſſect. c. 2. ex cartilaginibus, muſculis, neruis, & ſubſtantia membrana conſtans, cap. 4. quæ *Larynx* in

in collo extare apparet, tangentibusque dura sentitur, sursumque nobis transglutientibus fertur, 7. de usu part. c. 5. *Ἀρτυρῆς* Græcè. Componitur ex tribus cartilaginibus: Una *ὑπερσθενής* dicitur, quæ anterior veluti scutum quoddam alijs præposita est, alia *ἀρυτάνοειδής* ori vasis olearii, adsimilis cartilagine tamen duas sortita: tertia verò, innominata, infima os œnophori (quod *Bronchum* Galli vocant) referens: harum autem *ἀρυτάνοειδής* καὶ *ὑπερσθενής* mobiles sunt, sola autem innominata immobilis est. Ob eam causam in ea firmantur aliorum duarum muscoli. Nam cum duodecim sint muscoli Laryngis proprii, duo quidem prodeunt a Thyreoideæ mediæ interna in anteriorem Arytænoeideam quam claudunt: duoque similiter ab Arytænoeidis posteriore basi in eundem basin anteriorem quam comprimunt: reliqui verò octo omnes ab innominata, partim anteriore, partim posteriore parte, partim etiam lateribus. Ceterum horum musculorum beneficio, totus Larynx præcipuum vocis organum est, quam tamè acutam vel gracilem præcipue facit. Arytænoeides, adiuta cartilagine epiglottide, Arytænoeideam magis ininulue claudente, laxati, aut contractis ductibus musculis ipsam releuantibus, adiuta quoque gargareone, vocem ipsam plectri ritu modulante.

Lassitudines, *Κόπες*, Græci homines vocant affectus, ex multo, vehementiue motu corporibus, vel totis, vel particulis, quæ amplius laborarunt, oboriri soliti; unde *Ἀποκα. medicamenta*, quæ talem lassitudinem tollunt, appellantur, 7. de compol. med. per gener. cap. 11. Cuius lassitudinis species tres sunt, *ἐλαχίστη*, *τὸν ὀνδρῆ*, *πλεοναδής*, *υλκερὸς* et *ἐν σφύρα*, inflammatoria, quæ notis & signis propriis distinguuntur: in *υλκερὸς*, partes lassitudinis, ulceris sensus, cum mouentur enim, se exhibet,

in *tensiva*, incendi, tendique sibi videntur, qui laborant;
in *inflammatoria*: accensa, inflammata, contulaque ap-
parent membra.

Lateralis morbus, vide *Pleuritis*.

Latum os, vide *Dorsum*.

Latus musculus, siue musculosa natura, vel substantia,
μυῶδες πλάτυσμα, apud Galenum, libr. de muscul. diff.
cap. i. est lacus ille musculus, qui sub cute in collo ha-
betur. Incipit in priori quidem parte ex labiorum, ac
buccarum; in posteriori verò, ex spinæ regionibus toti
cuti, quæ circa collum est, in orbem subtensus, & mem-
branosus, vt interdum membrana potius, quam muscu-
lus videatur.

Latus pulsus est, qui pulsa naturali, in latitudine maior
est, *longus*, qui in longitudine *altus*, qui in profunditate;
è contrà, *angustus*, *brenis*, *humilis*; de puls. ad Tyron. c. 2

Laxius intestinum, id est, *Colon*. 2. aph. 40.

Lea, seu *Lenia medicamenta*, sunt, quæ partes aspe-
ras leniunt; de Dynam. in proœmio, *Λείον*, *lene*, id di-
citur, quod continuum est, nullaque ex parte diuulsum,
sed sibi vndique cohærens æquabili superficie: Contra-
rium est τῷ τραχεῖ, hoc est, *aspero*. *Λείον* etiam apud Hip-
poc. Galenus interpretatur ὑπρίχον.

Lemmata, sunt propositiones per se credibiles, quas
vocare consuevit Aristoteles, *dignitates*, vel *prologia*,
vel *postulata*, 2. acut. 20.

Leno, siue *Linon*, Græcè *Ληνός*, est regio in summo
vertice cerebri, vbi duæ venæ inuicem congregiuntur;
à torcularis similitudine propter tenuem membranam.
Est & aliter *Leno*, id est, exilium in superficie venarum
sibi incumbentium congressus, propter crassam mem-
branam, similiter factus, 9. de anatom. adm. cap. i. vide
Torcular.

Lepidocides futura, *Λεπίδες*, vel *conglutinationes*, (quas *Galenus futurae iuxta aures* vocat) sunt duæ lineæ a media sagittali quæ recta in longitudinem fertur, æquè distantes, per capitis longitudinem à posteriore in priorem partem, super aures feruntur, quæ in ossibus ad squamæ similitudinem fructis, habentur, quæ sunt duobus inter se ossibus cohærentibus, non per futuram quidem, sicuti *Coronalis*, & *Lambdoidea*, sed paulatimincipiti os, instar squamæ attenuatum descendit, atque id os, quòd infra ab auribus ascendit; subintrat, lib. de ossib. cap. 2. quæ & *squamosa agglutinationes* nuncupantur, 9. de vlu part. cap. 28. *Mendosa* adhuc, & *Temporales* dicuntur.

Leporinus. vide *Lagophthalmos*.

Lepra, *Λεπρά*, est cutis mutatio, in habitum qui præter naturam est, cum asperitate, & pruritis, & doloribus, nonnunquam & squamis decidentibus, interdum, secus, pluresque corporis partes depascuntur, lib. finit. *Lepra*, & *Psora*, seu *Scabies*, affectus sunt valdè affines & congeneres, ita vt non aliud *Psora* sit, quàm mitior *Lepra*: est enim *Psora* ad *Lepram* quædam quasi via, vt *Lepra* ad *Elephantiasin*, si magis humor vratur, malignior euadat, & morbus diutius protrahatur. Vterque affectus pruritem habet inseparabilem, sed in *Lepra* tantus est, vt æger etiam vehementissimè scalpendo nullo modo iuuetur, sed omnis potius generis vlcera, phlegmonas accerlat, quòd cutem exasperet, & subiectam illi carnem, multò quam in *Psora* profundius depascatur: Vnde & squamulas procreat, quales in *Psora* non generantur, quæ furfuracea tantum corpora ex se remittit, vt quæ a minori gignatur intemperie, & humore minùs crasso, terrestri assato, & maligno. Dicitur *Λεπρά*, ab his squamulis, quasi *Λεπίδα*, idest, *squamosa*,

Ab Auicenna dicitur *Albaras nigra*, & *Impetigo excori-
catina*, quod cutis in cortices quasi squamæque delol-
uatur. *Lepram* hanc Celsus vocat *Impetiginem*, non eam
quidem quam superius nos *Λύχλω* appellauimus, sed
quam ipse declarat lib. 3. quæ in quatuor species distin-
git, quæ a superiori *Impetigine* plurimum distat. Eius
causa melancholicus humor est multus, viscosus, crassus,
sed tamen acris & immotus sub cute, & subiecta carne
latens, sensumque eum doloris excitans, qui *Pruritus*
dicitur.

Lethargus, Græcè *Ληθαργία* & *Ληθαργία*, passio est
Phrenitidi contraria, si quidem in ea inexpugnabilis dor-
miendi necessitas adest, perinde vt perennes vigilæ
phreneticos infestant. Dicta autem *Lethargus*, quod ea
correptis omnium rerum obliuio accadat. *Somnus*, siqui-
dem si in longius producat, difficilemque habuerit
expergesationem, *Coma* dicitur: Si verò ipso tempore
naturæ modum conuenientem excellerit, & non habue-
rit difficilem expergesationem, *somnus longus* rectè
nominatur; qui sit refrigerata prima parte sensitiua,
hoc est, Cerebro ipso; quæ refrigeratio cum fortis fue-
rit, mista quidem humiditati, facit *lethargicas passiones*;
cum siccitate verò eas, quæ Græco vocabulo *κατάληψις*
id est, *Deprehensiones*, vocantur, 2. aph. 3. *Lethargicorum*
alij vnam continuamque habent lethargi accessionem,
alij per circuitus quosdam in somnum ruunt, & rursus
reuocantur, vt excitati audiant, moxque in somnum re-
labantur. Sunt autem, omnes obliuiosi, stupidi, mente
capti, crebro oscitant & hiant, ac sæpè hiant ore per-
sistunt, velut os claudere obliui. Urinam reddunt iumen-
torum lotio similem, ac sæpè in manus sumpta matula,
eam se tenere non meminerunt.

Leuco, *λευκόν* id est, *Alba viridigo*, 2. method. 2. seu
cor-

corporis, & pilorum in album calorem mutatio præter naturam, lib. finit. & 1. de compos. med. loc. 1. Neque verò ad solam cutem, sed ad subditam quoque eius carnem, vitium hoc pertinet. Fit porro cutis, & caro alba, & pituitosa, qualem Polypodes, & locustæ, cæteraque crustacea, exangui, & alba carne prædita obtinent. Inq; malum videtur esse, quod nostrates *Lepram albam*, Avicenna, *Alburam Albam* nuncuparunt; Differt a *Lepra*, & *Elephantiasi*, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis: *Leuce* verò, cutem habeat lenem, sine vlla aspredine & rosione. Fit errore facultatis nutritoriæ, sanguinem pituitosum, lentum, & viscosum gignentis. Nam cum tali sanguine caro diutius alta generataque fuerit, facillimè albedo in alta carne contrahitur, talemque habitum accipit, ut omnia facile in album conuertat, & non iam simpliciter caro, sed alba caro sit. Cum enim diutius ea affectio perseverarit, caro quidem adhuc manet, mutatur tamen eius forma, & in alteram speciem vertitur, mediam inter sanguineam carnem, & exanguem, proque naturali habitu cachexia inducitur. Nomen habet *λευκη* vel *ἀπὸ τῆς λευκότητος*, vel a quadam similitudine cum populo arbore, quam itidem *λεύκην* appellant. Ut enim foliis & cortice candida est, sic & cutis eius, quem is morbus occupavit.

Leucoma, *Λεύκωμα*, idest, oculorum albugo, de re-med. part. facult. est cicatrix oculorum altior, magisque profunda; sicuti quæ superficialia est, *νεφελίον* dicitur.

Leucophlegmatia, idest, *Alba pituita*, quædam aquæ inter cutem, species est; sic dicta, quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter missionem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorem, 7. aphor. 29.

quam eandem dicit esse cum ea Hydropis specie, quæ *Hypofarctidis* siue *Anasarca* dicitur, ὁ ὀφθαλμικός φλεγματίας, lib. Introd. cap. 13.

Lichen, Affectio, λεχών, dicitur etiam callus In equorum genibus, & supra ungulas in flexu earum partium duratus, fertur Comitalibus prodesse. Est etiam herbæ species, quam aliqui ἔρπον appellat: saxis enim adhæret, ut muscus. Sunt qui putent esse hepaticam in offic. dictam: Exerit, purgat, siccatur, refrigerat, vide *Impetigo*.

Lien, vide *Splen*.

Lientera, vide *Intestinorum difficultas*.

Ligamentum, quod Græci σύνδεσμον vocant, est corpus nervosum, ex osse quidem omnino ortum habens, insertum in os, aut in musculum, cui nomen ab usu est inditum. 1. de motu musc. cap. 1. quod & *Cupula* dicitur, lib. Tigni, cap. 9.

Ligatio. dicitur de obstructis articulis, & difficilibus artuum morbus, quos Græci *Ancylas* vocant, 7. de comp. med. per gest. cap. 6. Est & affectus, qui interdum naturaliter accidit, membranis linguam continentibus durioribus, & brevioribus statim a primo ortu factis; Interdum ex acquisitio, ob cicatricem quampiam duriores ex ulcere contractam; quam Græci ἀγκυλόγλωσσον vocant. Qui hoc malo laborant, tardè sermonem explicare incipiunt; atque ob id, hoc vitij genus, Latinis, *ligatio lingua* dici potest.

Lingula, vide *Epiglottis*.

Linon, vide *Leno*, & *Torcular*.

Linon spernon, id est, *semen lini*, 1. de alim. fac. 32.

Lipodermus, defectus est pelliculæ, tegentis glandem Colis, aded, ut distrahi amplius non possit; lib. finit λειπόδερμοι dicuntur, quibus præputium ex morbo vel sectione deest, aut ita contractum est, ut glandem amplius

amplius tegere non possit. Romani, *Apellas* & *Recutitos* vocarunt.

Lipopsychia, id est, *animi deliquium*, idem quod *Lipothymia*, *Λιποψυχία*, & *Λιποθυμία*, solo differunt gradu, quod ex ipso nominis etymoliquet. *Lipothymia*, vitalis facultatis defectum, *Lipopsychia*, animalis facultatis exolutionem significat; at tamen utriusque facultatis defectu omnium virtutum exolutio contingit ut sensu, motuque destituantur ægri, non minùs quam animo, quale aduenit iis, qui nisi frequentius nuttiantur, resoluuntur, 12. meth. cap. 5.

Lipothymia, vide *Lipopsychia*.

Lippitudo dura, vide *Sclerophthalmia*.

Lippitudo oculi est, cum album rubescit. & palpebræ attolluntur, cum dolore conuiuent, & ægrè manus admotas ferunt; lib. Introd. c. 15. vide *Ophthalmia*.

Lipyrria febris, vide *Febris lipyrria*.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis contactu colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, velut aqua aceto, vino, constant. Igne liquefcit propolis, cera, rasina, ladanum, seuum, galbanum; *Aceto* solo liquefcunt citra ignem, Ammoniacum, Sagapenum, Opopanacum, 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida albus, in qua liquida deficiuntur, com. 2. in 2. prorrh. 3.

Lithiasis, id est, *calculi morbus*, renibus & venaicæ familiaris, in quibus ut plurimum calculi generentur, lib. de reum aff. digno. cap. 2. Dicitur & *Λιθίασις* oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in qua alba quædam & crassa, callis, aut lapillis similia apparent, oculum pungentia.

Lithoeides os, *Λιθοειδές*, id est, *lapideum*, *petrosum*, 9. de usu part. cap. 10. est, quod utrimque ad aures positum,

fitum, petrae speciem referens, lambdoeides futurae finibus terminatur, in quo inest processus columnae similis ad acus, styliue similitudinem: unde *Styloeides*, *Belenoeides*, & *Graphioeides*, *στυλοειδής*, *βελονοειδής*, & *γραφοειδής* appellatur, sub quo aucto. ius meatus coniungitur, lib. de ossib. cap. 1.

Liuidum, *λευκόν*, dicitur color inter planè nigrum & rubrum, aut aliquem alium ex floridis colorem medius: fit autem vel ex ipsis floridis in nigrum abeuntibus, vel ex nigro in album cedente, ut apparet in suppurationibus, in quibus quod nigrum erat, liuescere incipit, & ex liuido ad colorem ignis tendere, & paulatim candidius fieri proximè accedit ad fuscum. Contrahitur in corporibus à sanguinis, & caloris natui defectu: frigus enim liuidum & nigrum colorem inducit. Designat & humorem, veluti viridis, praua qualitate praeditum, uti rubidus sanguinis copiam.

Lobi, *ὄβη*, *Fibrae*, quibus tanquam digitis hepar, ventriculus, & pulmo cor ad vnguem complectitur, 4. de usu part. c. 8. & lib. 7. c. 10, & 7. de anat. adm. c. 11. Dicitur & *Lobus*, ima & carnosa aurium pars.

Localia medicamenta, quae *Topica* dicuntur, medicamenta sunt, quae extrinsecus applicantur corporis partibus, quibus non prius utendum, quam totum corpus purgaueris, venamue incideris, si redundantia in toto corpore subest; alioquin, implebis potius corpus, quam vacuabis, 13. meth. 22.

Lochia, *λόχεια*, dicuntur omnia, quae à puerpera post exclusum foetum & secundas exeunt, quae Aristoteles vocat *purgamenta*; sunt autem reuera *τὰ καταμήνια*, à quibus etiam sola ratione differunt, quod haec ante partum, ille post partum, sic appellentur, lib. de atra bile, c. 8.

Locus, a recentioribus Medicis, corporis particula, quae-

quælibet p.n. affecta appellatur, i. de loc. aff. i.

Longaon, siue *Longitudinæ intestinum*, vide *Rectum*.

Longitudinalis sutura est, quæ a medio posterioris Caluarie, per capitis longitudinem, ad mediam usque anteriorem, extenditur, vnde Græcis *ἡ μέση*, idest, *recta* vulgo *sagittalis*, & *longitudinalis* appellatur, a *Lambda* dicitur ad Coronalem finiens, lib. de ossib. cap. i.

Longus pulsus, vide *Latus*.

Lopidoeides sutura, quæ & *Lepidoeides* dicuntur, vide *Lepidoeides*.

Lordosis, idest, Excauatio, facta per vertebrarum luxationem, ad internis corporis partes, 4. se loc. affect. Vide *Cyphosis*. *Doctus*, vitium spinæ, cum eius vertebræ loco suo motæ sunt, & in priorem siue anteriorem partem conuertæ. Vel inclinatio seu incuruatio in anteriorem, cum homo vitiosa dorsi spina semper capite pronus est, & cernuo.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis excrementum attraxerint, vtilem, qui in eo est, sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur; excrementum verò ipsum serosum a facultate segregatrice, seu inutile expellitur per vretres in vesicam; sed quandiu in venis atque arterijs hoc cum sanguine currit, *excrementum serosum*, & *serositas* vocatur: vbi, cum segregatum est, *lotium* & *urina* dicitur, lib. de ren. aff. dign. cap. i.

Luctuosa respiratio, est interrupta inspiratio, & quasi duplicata geminataque aeris reuocatio, stante interim thorace, deinde rursus in, quod deest adiacente, qualis infantibus accidit, quo tempore plorant, veluti superinspirantibus, 6. aph. 54.

Lumbi, *ὀστέα*, propriè pars est totius spinæ infra dorsum, siue thoracem, quinque vertebri omnium crassissimis, maximisque compacta, inter dorsum, & os sacrum

et in mediis. Breuius alij aiunt, *Lumbi* sunt dorsi ea pars, qua cingimur. vide *Dorsum*.

Lumbrici, vide *Elmiathes*.

Lupus, seu *Strangulator*, Græcè *λυκοειδής*, dicitur affectus iis eueniens, qui sperma diu præter naturam retinuerint; quod veneni naturam induens in venis & arteriis, dum nequit ei eici, anginosam generat passionem in faucibus, & quandam quasi suffocationem, lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo effectū, qui *Nyctalops* dicitur, vexatur, 10. de simpl. Medic. is dicitur, qui a primo ortu, non nisi oculis propius admota videt, eademque prope oculis contingit, & limis semiclusis oculis aspicit, etiam si parua sint; remota verò, quamuis magna, videre non potest. Vitium oculorum est congenitum ab imbecillitate visuæ virtutis animalis; & spiritus visuī, eamque ob causam incurabile; differt à *Nyctalope*, quippe qui non natura, sed ex morbo talis euasit *Μωπας* Græci vocant, Latini *Lusciosos*, & *Luscitiosos*, appellant, ipsa verò affectio *μωπία*, & *μωπίασις* appellatur.

Lutea bilis, id est, *Vnellina*, de placit. 4. vide *Bilis pallida*.

Luxationes, quas ossium ex cavitatibus suis excidentias, *exarticulationes*, & *exarticulata* interdum vocat Hippocrat. sunt ossium a propria sede excessus, sine fractio-
ne eorundem facti, 1. de fract. 1.

Lychantropia, Græcè *Λυχαντροπία*, *Λυχαντροπία*; *Ευανδροπία*, *Κυνανδροπία*, *Λυκάων*: Arabicè; *Catrab*, *Cutubut*; Latine, *Lupina*, vel *Canina insania*, species est melancholiæ, ut testantur Aetius & Paulus, quæ ægri imprimis mense Februario, quo præsertim humor melancholicus redundat, noctu domo egressi, vitem circumuehant, quadrupedum more incedentes, tu-
ros

posimitantur ululantes, donec dies illucescat, defun-
ctorum monumenta quæritant, adaperiunt, cadaue-
rum frustra arripientes; sæcumque collo gestantes, fu-
giuntque die viuos homines, nocte insequentes mor-
tuos. Sunt autem eorum notæ; facies pallida, oculi
sicci & caui, vilus hebes, lingua siccissima, saliuâ in ore
nulla, sitis immodica, tibiarum perpetuo exulceratarum pro-
pter frequentes casus: atque vt canes mordent, ex quo
arbitror morbus ipsum etiam *κυνανθρωπία* vocatum,
fuisse à Veteribus.

Licoeides, vide *Lupus*.

Lyberia, id est, solutoria signa, quæ magni, & ve-
hementis morbi solutionem firmam solent præcedere,
1. de diebus decret. cap. 1.

M

MADAROSIS, *Μαδάρωσις* & *Μαδασώσις*, id est, *Gla-
bries*, *Caluitium*, capillorum deluuium est, à
cacohymia, & vitiosis humoribus, proueniens, quales
affectus sunt *Ophiasis*, & *Alopecia*; quæ omnes passio-
nes sanabiles sunt, vitiosis humoribus, qui ad radices
capillorum hærebant, vel resolutis, uel aliò translatis
& vacuatis, 6. aph. 34.

Madorem, & *Pladorem*, id est, superfluentes humi-
ditates appellare consuevit Hippocrates, siue tenues,
siue crassiores, cuiusmodi & pus est, 3. de fract. 19.

Magma, in specie, mirrobalanorum sæcem vocant,
7. de comp. med. p. & gen. cap. 7. Aliqui verò omnem vn-
guenti sæcem, quæ expressa reliqua liqui diori materia
utili relinquitur, *μάγμα* vocant; extenditur quoque no-
men hoc ad omne vngentum spissum pauco liquore
subactum.

Magna

Magna arteria, vide *Arteria aorta*.

Magna febris, vide *Febris magna*.

Magnus morbus, vide *Affectus gravis*.

Magnus pulsus est, qui naturalem pulsum omnibus tribus dimensionibus superat: qui verò iisdem dimensionibus è naturali superatur, *parvus* dicitur, de puls. ad Tyron. cap. 2.

Mala, carneæ partes sunt, quæ inter nasum, & aures iacent, quæ a priscis *Genæ* dicuntur, lib. Introd. cap. 20. sic distæ, quod rubentes ad mali similitudinem: sub oculis leniter rotundæ promineat, 1. de art. 3.

Malactica medicamenta sunt, quæ induratorum solvunt duritiem; quemadmodum *relaxantia*, quæ tensioni medentur, nuncupantur, 7. de compos. medic. per gen. cap. 9. *Malacticum* autem *emolliens* dicitur eorum corporum, quæ induræse, & in quibus contentus est humor præter naturam, velut cū partes sunt scirrholæ, quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat; quod à congelatione, calefieri, Græcè καλακτική, κάψακα, 5. simpl. 5. Quæ verè emolliunt, calida esse oportet, secundo aut tertio ordine; Nam quæ minùs calida sunt, ea potius in genere pus mouentium habentur: quæ verò sunt calidiora, potius digerendo vacuandoque indurant, quam emolliunt: Ita facultas quoque emplastica in iis inesse debet.

Malagmata, alias *Cataplasmata*, vocant omnia pharmacata, quæ foris secus imponuntur, siue adstringendo, condensent, siue indurent, siue emolliunt, 8. de compos. med. loc. 5. Proprie autem *Malagmata* vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, moderate sunt calida, non tamen exsiccantia, aut humectantia insigniter. Nam cū exactè mollificant, medium quodammodo ordinem inter humectantia, siccantiaque

fortiantur, proin moderato suo calore indurescentium substantiæ, veluti fusionem quandam molliuatur; vbi vero diutius diffusa fuerit, digredientium medicamentorum loco esse possunt, 7. de comp. med. loc. cap. 1. vnde quidam nullum discrimen constituunt inter *Μαλάγματα*, *ἐμπλάσματα*, *τροχίσκους*. Porro *Μαλάγματα*, aut medicis corporis regionibus (quæ propriè *ἐμδέματα*, Paulus appellat) vt ventriculo, iecinori, lieni, cordi imponuntur; aut extremis partibus, vt capiti, & articulis admoventur.

Maligna, vide *Carcœthe*.

Malleoli, sunt linæ ab utroque latere tibiæ, suræ, partes gibbæ, ex parte exteriori, intrinsecus cavæ, carne carentes, extra aliam prominentes, sub quibus vtrunque talus continetur, lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera *interna*, ad interiori tibiæ partem (*Cream* Latini vocant) procedens ac inde ad *Malleolum*, ad ipsum tibiæ extremum peruenit, quæ & *Saphena* corrupto vocabulo, pro *Saphæa*, id est, *manifesta*, dicitur, altera, *externa*, & *superficiaria*, per exteriorē alterius ossis tibiæ, quod *περὶ πλυν* vocant Græci, producit, ad pedis pertingens articulum, vnde *externa malleoli*, & *Ischiadica vena* aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, id est, *mollissimum*, quo genere Hipp. omne medicamen vocat, quod connatam humiditatem habet, qualis in pinguibus est singulisque oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera. 4. de compos. medic. per gen. c. 9. *Μαλθακόδη ράμμανα*. *Μάλθα*, ceram significat, eam præsertim, quæ mollis est.

Malum Granatum, & *Malum Punicum*, vide *Cartilago ensisiformis*.

Mamma (*Μασὶς* & *τιτθὺς* Græce) est carnosus in pectore,

store, ad utrumque latus eminentia glandulosa, semicircularis, in cuius medio papilla (Græcè *θηλὴ*) extuberat, quam ambit circulus quidam subniger, qui *cor* dicitur gignendi lactis vim à natura habens, 1. de sanit. tuend. Verùm glandulosa illa substantia admodum varia est. Viris namque (in quibus propriè *μαστὶς* dicitur, ut *μαστὶς*, siue *μαστὶς* in mulieribus) calidioribus scilicet & siccioribus penè nulla est, eademque arida, ut etiam admodum puellis. Iuenculis verò compactior est & duriuscula, vetulis verò flaccida. Eam autem multæ sed parvæ glandulæ constituunt, sibi mutuò incumbentes, & inter se commixtæ, adipis & fibrarum interuentu, quæ ex carnea membrana in cutem pertinent. Semicircularis illi est forma, non tam quò minùs pateret iniuriis, quàm quo plus lactis contineret: Est enim rotundum omnium capacissimum. Sic quidem condita mamma aptissimum fit gignendi continend que lactis organum, quòd quia è sanguine gignitur, idcirco natura venas & frequentes mammis largita est; alias quidem externas à ramo venæ cavæ axillam iam petentis, descendentes; alias verò internas à vena cava pariter descendentes ex iugulo summoque sterno. Hæ parim absorbuntur in mammas & musculos pectoris internos, partim verò ad Xiphoidem cartilagineam, & musculos rectos delapsæ, inque eos & vicinas partes distributæ, paulò suprà umbilicum, surculis aliquot suis occurrunt surculis totidem venarum epigastrij: indeque fit consensus ille mammarum cum vtero. Habent & hæ venæ arterias aliquot comites, sed per paucas & graciles.

Mammillaris, Mascendens, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, firmis; Extuberat, & cavus est, quo aer in ampla, & anfractuosa eius cavitare conclusus, magis resonet auribus.

bus. Dicuntur & à quibuldam *uteri cornua*, *Κεραία* dicta, *μασσοειδὲς ἀπορροή*, propter similitudinem, quam habent cum mammis.

Mancum, & *Mancinitatem*, alias *Cyllon*, & *Cyllofin*, nonnulli, de omni longorum membrorum distortionem intelligendum censent, generaleque ei attribuunt significatum; alij, eam tantummodò distortionem significare asserunt; in qua ad interiorem partem membrum inclinatur; quòd cum accidit, necesse est, ut summum eius, E. G. pes intrò contortus, quasi mancus & mutilus appareat, 3. de art. 87. vide *Cyllum*.

Mandibularij, *Manducatorij*, *Manforij*, *Maseteres musculi*, Græcè *μασσητήριος μῦς*, alij sunt a temporali-
bus, quos *Crotaphitas* vocant: nam posteriores Anatomici; eos *temporales*, seu *temporines* nominant, qui ex ossibus temporum capitis exoriuntur, quos, cum intenduntur, committere, ac claudere os, manifestè conspicimus, alios verò, qui latis inferioris maxillæ partibus superjecti sunt, vtrinque alter, propter eà quòd in manducando, maxillam, circumagunt, *Manducatorios* vocant, cum illi, qui è superiori parte deferuntur, efficere id minimè valeant, attrahunt enim sorsum eam tantummodò, non traducere etiam hac illac queunt: Unde in committendò quoque ore, ipsorum auxilio indigemus, 2. de artic. 5. à mandendo sic dicti, quos etiam *mandibularios*, *manforios*, & *masficatorios* vocant, 4. de anat. adm. cap. 4.

Mania, *Furor*, *Insania*, *Mania*, species delirij vehementioris, 2. de caus. sympt. ut enim τῆς παραπνοίας, seu delirij est citra febre insanire, & mente alienari, ita si huic insanix adiungatur magnitudo, & vehementia symptomatum, ut, cum ægri calcitrant, mordicus imdetunt vel ingredienti, vel quocumque obuios, fe-

rarum more discerpunt) *Mania* dicetur, ex affata, vel atra, vel flaua bile procedens, 3. de loc. affect. c. 7. Quod si à sanguinis copia non putante originem ducat, erit quidem *Mania*, sed cum risu, hilari vultu, & perpetuo cantu. Aliquando Hippoc. *Mania* nomine pro melancholia morbo proprie dicto usurpauit, vt testatur Gal. 6. aph. 21. Cerebro accidit vel per se, uel per consensum affecto. Nunquam pituitosus humor eam parit, sed cum acrem & mordacem esse oportet. Quod autem delirium paruum mitèque est, Hipp. *ἄσπευ* appellare consuevit.

Manifesta vena, ramus est venæ à corde ad furculas ascendens, quæ per faciem, oculos, caput, & nares diuiditur, vt omnia membra nutriet, quæ inde *Manifesta* vocatur, lib. de anat. vii.

Maniodes paraphrosyna, sunt vehementes insanæ; propter atræ bilis malignitatem, cum flaua bilis Cerebrum apprehenderit, febrisque vehementia affatum hunc succum melancholicum reddiderit, comm. 1. in 1. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, vel aerium dici potest; Mellis species est non ignota veteribus, Galeno, Plinio, Dioscoridi; sed mellis nomine, & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamque putet; sic enim de ea scriptum reliquit Galen. *In folijs*, inquit, *stirpium* adnascitur quippiam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nec tamen continenter, neque copiose pronasci soleat. Nec me praterit, per astatem, in arborum, fruticum, herbarumque folijs plurimum fuisse inuentum, sicut à ludentibus rusticis, Iupiter diceretur melle pluuisse, praecesserat tamen nox frigidior, pridie calida, siccaque colla constitutio diluxerat; quapropter inter rerum natura perit eos conueniebant halitus, quos terra, vel aqua expirasset.

exte.

extenuatos, & excultos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra, rarius euenit, in Libano monte quotannis, adeo ut extensis pellibus arbores succutiant, receptoque quod profluit, ollas & scilicet compleant: prius quoque nomine vocant *Spocimeli*, id est, roscidum mel, & etiam *ἀρπόμελι*, id est, mel aerium. Hæc Galenus 3. de alim. fac. cap. 39. de melle. Cuique igitur patere debet, notam Galeno, *Mannam*, quæ gustu prorsus mellea sentitur. Concrefcit maxime Vergiliarum exortu, vel sydere Syrio splendente. Vim habet modicam ciendi aluum, & flauam bilem pellendi, tutoq; pueris, & foeminis vterum gestantibus exhiberi potest. Dicitur item & *Manna thuris*, (quæ & *Suocussio* & *Pollen* nuncupatur, 3. de art. 44.) id est, Thuris micæ, concussu elixæ, corticis parum participes, adstringendi vim totam, & qualitatem possidentes, 5. de comp. med. per gen. cap. 2. Videturque aliquibus *Mannam Thuris* nihil à *Thure trito*, ac *lanigato* differre; *Mannam* enim propriè appellant id, quod excussum est a Thure, circa magna onera confracto; auferuntur enim ab ipso fragmenta quædam parua corticis thuris, 4. de compos. med. loc. 4. & 13. meth. cap. 5.

Mansorij musculi, vide *Mandibularij*.

Manus (quas homo pro corporis nuditate, quod armis nudum sortitus est, armorum loco obtinuit, sunt iuxta Aristot. organum ante omnia organa; cum nullum sint eorum, quæ particularia organa sunt, sed quodlibet eorum possint recipere, 1. de usu part. c. 4. *Manus* autem nunc totum artum superiorem, brachium scil. cubitum & manum significat; nunc extremam manum tantum, 2. de usu part. cap. 2.

Manus dolor, Græcè *χερᾶρρα*, arthritidis species est, quæ manuum articulos occupauit, ut *Gonagra*, quæ

genu, & *Podagra*, quæ pedes. Nec verò morbus ipse sic appellatur, cum viget & dolorem facit, sed ipsa etiam articulorum contortio, & imbecillitas post morbum relicta. Tophis enim articuli manent intercepti. Id enim significat ἡ ἄγρᾱ τῆς χειρὸς, hoc est, manus cap-tura, quumvis alij χειράγρᾱν, quasi χειράλγᾱν, hoc est, manus dolorem, ἀπὸ τῆς ἀλγῆς, deriuari malint.

Marasmus, siue ex morbo senium, est frigidum, & sic-cum corporis temperamentum, non natura, vel anno-rum multitudinis ratione comparatum; sed febrili mor-bo: quod non in animalibus modò, vt in hominibus etiam in stir-pibus supra modum arefactis visitur, 5. de sanit. tuend. c.9. *Marasmus* itaque idem est, quod *Tabes*, quæ non idē est, ac *febris marasmodēs*, siue *tabida*; *Marasmus* enim abs-que febre in decrepita ætate solet accidere, extincto na-tiuo calore, & superueniente morte, quæ sine sensu do-loris, ac secundum naturam ex siccitate contingit; sicuti his, qui præter naturam tabescunt; altera aduenit /pe-cies, quæ ex agritudine senectus vocatur, inquam non so-lum senes, sed etiam pueros vidimus incidisse quamplu-rimos. *Tabida* verò *febris*, non tantum sicca, sed calida est, 1. de diff. feb. c.8. Facile hic morbus innotescit, oculo-rum ingenti cauitate veluti in foveis quibusdam recō-ditorum, & vniuersi corporis squalore, caloris vitalis flore destituti, cutis circa frontem siccitate & tensione, palpebris instantibus, & tanquam somno grauatis ab impotentia quadam vigilandi: sunt & tempora collapsa atque caua. Breuiter, totus homo non aliud est, quàm ossa, atque cutis. In ventre nulla intestina, nulla viscera in-esse credas: adeò contracta sunt præcordia, & consumpti ventris muscoli, vt nihil ex iis præter fibras & cutem super sit. Hæc autē symptomata, aut adhuc fieri intel-liguntur, aut iam planè facta absolutaq; esse. Inde duplex

marasmi differentia existit, vnus quidem nondum perfecti, sed adhuc ad maiorem consumptionem tendentis: alterius verò iam planè consummati. Hic prorsus immedicabilis est, illi remedia quædam possunt adhiberi. Verus autem marasmus est, per quē omnes corporis solidæ partes similiter marcescunt, initio ab ipso corde factò: non verus autē, qui in certa quadā parte consistit, ut in ventriculo, & iecinore, in quib. Gal. magna ex parte heclicas marasmodesque febres se contemplatum esse scribit. Superueniunt aliquando & pulmōi, sed rarius, tum propter eius humiditatem, tum quod spirando refrigeretur. Incidunt, & pectori & mesaræo, & ieiuno, & colo, interim verò & vtero & renibus. In septo autem transuerso marasum, se nunquam vidisse Galen. scripto testatus est, sed heclicam sanè febrem vidisse, & hanc semel quidem planè absolutam, sæpè verò citius interimentem quam planè esset completa, quòd eam & spirandi difficultas & delirium excipiat.

Marcer, Marcor frigidus, torridus, vide Febris marcidæ, & Ex agitudine senectus.

Marisca, venulæ sedis sunt, quæ aliquando foris extuberant, ore hiantes, & statò tempore sanguinem melancholicum excernentes, aliàs, *hemorrhoides* dicuntur, quibus plus iusto fluentibus, aqua inter cutem sublequitur; interdum superius delitescunt, & cæcæ *αιμορροΐδες* appellantur, vide *Sicosis*.

Marmarype, idest, oculorum hallucinationes, 3. cris. 11. & c. 7. *Μαρμαρυγαι* apud Hipp. splendore crebri, & veluti fulgura frequentia, subita & ardentia. Sunt autem nihil aliud quam splendores oculis obuersantes.

Masseteres, vide *Mandibularij*.

Mater dura, & pia, vide *Membrana dura*.

Matrix, *Μίτρα*, idest, *Vulua*, * foris nervosa, intus

carinosior, vas foetus gestandi, quæ à Græcis *Μυσέπε* quoque appellatur, quod omnium partium sit postrema, lib. finit.

Maxilla, sunt illæ faciei partes, quæ genis subiectæ ad mentum vsque descendunt, & hac in mucronem desinunt, lib. Introd.

Maxillares dentes, vide *Dentes*, *Tomi*, *Incisoriij*.

Meatum, siue *Porum*, simpliciter Herophilus appellat, Nervum opticum, qui à cerebro ad oculum pertinet, sensibilis spiritus via, quod eius solius foramen clare cernitur, i. de sympt. caus. cap. 2.

Meatus auditorius est, qui in osse lapidoso est, satis involutus & anfractuosus, ne quid eorum, quæ extrinsecus incidunt, ipsi nocere, ipsasque aures facile offenceret, proinde in medio situs extrinsecus quidem conuexarum, intrinsecus autem cauarum, i. de usu part. cap. 12. Constituitur autem in medio nerui quintæ coniugationis, qui vnâ cum dura cerebri membrana, involuero velut suo, in auditus foramen incidit. Dicitur autem & hic meatus *cæcum foramen*, propterea quod anfractum illum, per quem nervus foras post aures excidit, haud possunt dissecutores perfectè perforare, lib. de neru. diss. cap. 6. vide *Cæcum foramen*.

Meatus genitalis est, qui genituram à testibus hauritam, ad Colis radicem deferret, qui meatus iuxta radicem vesicæ varicosior conspicitur; unde ei nomen inditum est, *Varicosus assistens*, i. de sem. cap. 15.

Meatus varicosus, vide *Meatus genitalis*.

Meconium, excrementum est, ex toto foetus nutrimento, in utero, in urinaculo congeri solitum, toto uteri gestationis tempore, lib. quod animal sit id. cap. 5. Est quoque *Μηκόνιον*, papaueris succus concretus, qui & *ἰσχυρὸν* appellatur 3. simplic. 20. Sunt tamen qui ea distin-

guant;

uant. Plinium secuti, qui lib. 20. c. 18. scriptum reliquit cum capita ipsa & folia papaueris decoquuntur, succum meconium vocari multò Opio ignatiorem.

Media seu Mediana cubiti vena, est, quæ communis est ei, quæ *humeralis* nominatur, & ei quæ per axillam fertur, 3. de loc. affect. c. 7. quæ & *purpura* & *nigra* vocatur, lib. de anat. viii. vide *Communis vena*.

Medianum, seu Mediastinum, sunt duæ membranæ, vtraque parte singulæ totum thoracem διαπάροντες, idest, *Intersepientes*, quæ posteriore parte spinæ, vertebris, anteriore verò, ossi medio pectoris inunguntur, sursumque ad clauas, & deorsum ad ensiformem cartilaginem porriguntur, in duas partes totum thoracem diuidentes; vnde vulgò *Mediastinum*, siue *Medianum* vocant; his enim medius thorax dirimitur, 6. de usu part. & 5. de anatom. adm. quæ membranæ non aliter differunt, nisi quod in costis, διασπάροντες, idest, *Succingentes*, appellantur; vbi verò rectæ ac clauas feruntur διαπάροντες, idest, *Intersepientes*, 5. de anat. adm. vide *Diaphrattrontes*.

Medicamentum, omne id dicimus, quod nostram naturam alterare potest, 1. simpl. cap. 1.

Medicari, generaliter loquendo, idem est, quod *mederi*, propriè est idem quod *purgare*: neque de omnis medicamento exhibitione intelligit Hippocr. sed de eorum tantum quæ purgant, 2. de fract. 29.

Medulla spinalis, (quæ & *Dorsi medulla*, ραχίτης σπονδυλός, & vulgò *Nucha* nominatur) est, quæ omnibus & singulis vertebris inest, 8. de usu part. capit. 4. estque Cerebro, velut principio suo, continua, cui idem cum eo generis, & naturæ, nisi quod ipso multo est durior & compactior, potissimum in infernis spinæ finibus; eam tamen perperam *medullam* appellarunt;

cùm *medulla* ipsa, non modò spinali hac, verùm etiam Cerebro ipso sit humidior, mollior, & pinguior; quòd verò in spinæ ossibus contineatur, coloremque habeat *medullæ* assimilem, ob id ipsam *medullam* nominant, quo modo etiam quidam ipsum Cerebrum vocitarunt, 3. de anim. facul. c. 10. Communiter eam *spinalem* vocant *medullam*, addita scilicet *medullæ* appellatione; interdum verò sine additione simpliciter *spinam* nuncupant, 3. loc. aff. et. 10. vide *Myelos*. Oritur ex cerebri totius basi, eique corporis substantia similis est, & eiusdem cum eo generis, nervosque ut & cerebrum producit, donec velut efflata, desinat in finem breuem, acutum simplicem cum coccyce. Nerui autem hi subiectas cerebro partes mouent, & sentientes efficiunt. Ut planè constet *spinalem medullam* partibus capiti subiectis tanquam cerebrum esse, & multa cum cerebro habere communia, substantiæ similitudinem, principium nervorum, sentiendi vim propè parem, & præterea meningas duas, vnā tenuem a tenui meninge cerebri ortam, quæ vasa ipsam nutritura colligat, & substantiam eius admodum mollem, cerebro tamen non paulò duriorē constringit; alteram crassam, a crassa similiter cerebri meninge prodeuntem, quæ tenuem ambit & munit contra spondylorum dūritiem. Nec tamen propterea medullam hanc cum cerebro eandem esse, censendum est: habet enim vtrumque quædam propria & discrepantia. Nam cùm cerebrum pulset atque moueatur, quanquam esse immobili contineatur, medulla tamen non mouetur, tametsi à spondylis mobilibus continetur, nullumque habet medium interualum, ut cerebrum, sed præter meningas duas, tertiam, qua cerebrum caret, tunicam nervosam, validam, crassam, asperam, humore circumfusam viscoso. Hæc non
modo

modo duas illas meningas, sed etiam spondylos & totam rachitidem vestit, & contra motus violentos, & iniurias alias omnes, tum internas, tum externas tuto communit. Nascitur autem ab osse occipitis, quò loco spondylis committitur, & ad imam vsque spinam, sicut & ipse meninges, excurrit.

Megalosplanchnos, vocat Hippocr. non eos duntaxat, quibus magna ex natura ipsa sunt viscera, sed quibus ea, ex affectu aliquo, intumuerunt, siue Scirrhum, siue Phlegmonem, siue Oedema, nacta sint, 3. acut. nono *Μεγάλος πλάγχθος* dicitur etiam ο *δινος*, hoc est, Vinum, apud Hippocr. quòd Gal. interpretatur viscera in molem attollens, seu magna viscera faciens: Id quod ipse imprimis tribuit vino dulci.

Melancholia morbus, est delirii species, ab humore melancholico, (a quo etiam nomen sortitus est) in ipso Cerebri corpore p.n. contento proueniens, qui ipse humor si affetur, maniam facit, & furorem, 3. loc. aff. 7.

Melancholia flatuosa, siue *hypochondriaca affectio*, morbus est, ex terttia melancholiæ specie, indicante nomine humorem, qui ipsius causa est. Cum circa ventriculum prima incæperint accidentia, ipsiisque auctis melancholica sequetur affectio, deinde alui deiectione, vomitu, proba actione, ructibusque leuatur is, qui laborat, Hypochondriacum, flatuosumque morbum ipsum nominabimus, 3. de loc. affect. 7. *Μελαγχολία* est delipientia sine febre, timorem & mœstitiam sine causa inducens: Species est *της παρὰ φροσύνης*. Habet enim deprauatam facultatis imaginatricis & ratiocinatricis motionem, multa vana animo voluens quæ metuatur, magnamque inde mœrorem concipiens. Sunt enim timor & mœstitia duo perpetua communiaque omnium melancholia laborantium symptomata, ut ait Hippoc.

Hippoc. aphor. 22. lib. 6. Humor autem melancholicus gignitur, & abundat vel in cerebro solo, vel solis hypochondriis, sed maxime sinistra, unde humor atque vapor cerebrum petunt, vel in vniuerso corpore. Hypochondriaca autem omnium mitissima esse solet, secundum eam, quæ totius corporis vitio provenit. Pessima verò, & ferè incurabilis, quæ ex priuato cerebri affectu oritur. Cum verò duæ sint potissimum humoris melancholici differentia, vnus frigidus & siccus, vinorum sæci respondens, alter calidior, acrior, & vitione redditus ferocior, qui μέλαινα χολη proprie appellatur, ille morbum de quo agimus, parit, ideoque febrem non habet: qui verò ab illo fit, non simpliciter μελαγχολία, sed μελαγχολικὴ ἐκείσε, hoc est, σφοδρὰ καὶ πυρετώδης nuncupatur, febremque habet adiunctam, tanquam phrenitidis & inflammationis cuiusdam particeps.

Melancholicam ecstasim vocat Hippocr. motionem mentis, aberrationemque vehementem & ferinam, quæ irrigante Cerebrum, affata fua bile, oritur, & quæ in nigram permutari solet, 1. prorrh. 14.

Melancholicus humor, duplex; alter est, qui proprie melancholicus succus, siue melancholicus sanguis a Galieno dicitur, estque veluti sæx sanguinis, satis crassus, sæcibus vini non absimilis, qui in terram effusus, non inducit fermentationem, nisi fortè in ardenti febre affletur, neque vilius acidæ qualitatis est particeps qui in meatus Cerebri conuentus, Comitialem morbum, in corpore Cerebri melancholiam morbum generat, vide *Nigra bilis*. Alter est tenuior, gustu acidus, qui terram radit, attollit, fermentat, ampullasque excitat, qui *amara bilis* appellari potest, qua præ affata nascuntur ferina deliramenta, modo cum febre, modo sine febre, 3. loc. aff. cap. 7. & 2. de diff. feb. 9.

Meliceris, Μελικρίς, humorem melli similem, membrana conclusum habens, species est apostematis, vt & *αἴμαμα*, *σεάτωμα*, quorum hoc ab adipe, illud a pulcicula intra membranam conclusa, nomen habet, Meliceride dissecta, inibi contentus humor non aliter, quam mel è fauis diffluit. Sed dicitur eodem etiam nomine, aliud vlceris genus, quod propriè *κρίον* appellatum est, vt testatur Aetius, lib. 6. cap. 68. vide *Atheromata*.

Melicratum, siue *Aqua mulla*, aut *Hydromel*, est mellis & aquæ compositio, vel ex aqua vtriusque portione (vt viam vrinæ paret, & ad distributionem agat) vel altera alteram superante facta, tertio acut. 13. licet quidam velint, *μυλκράτον*, ἀπὸ τοῦ ὑδρομέλιτος vetustate differre; quod *Melicratum* sit aqua mulla subita & recens, hoc est, ex tempore comparata; *Hydromel* autem, inueterata, & recondita. Quoniam aqua melle mista, non admodum utilis est iis, qui amaram bilem coaceruant & faciliè in iis vertitur in bilem, nisi prius per intestina, aut vesicam transeat, eiusmodi naturis dilutior dari debet, vt nec sitim adferat, nec bilem gignat. Similiter iis, quibus viscera scirrho aut phlegmone, aut œtemate tentantur, aut aliquo morbo acuto laborant. Nam cum mel in iis, tum propter moram, quam in obstructis visceribus trahit, tum propter eorum ardorem protinus in bilem vertatur, eamque ob causam noceat, aqua autem tarde penetret, & nimis diu moretur in hypochondriis, ex vtriusque mixtum Melicratum idoneum redditur ita temperatum. melle, & aqua, vt & faciliè distribuatur in corpus, & bilem non gignat, nec sitim. Meracius verò exhibere conuenit, si alui deiectionem molimur. Paratur autem vtrumque duobus modis: vnum crudum est, alterum, decoquitur. Crudo vtimur, cum aluum

deicere

deiciere, aut vomitionem incitare volumus. Probe autem coctum, valentiùs alit. Coquitur autem; ad hunc modum: Primum multũ aquæ melli indimus (Paulus, li. i. in octo partes aquæ vnâ mellis miscet) deinde tantisper coquimus, quoad spumare desinat. Spumam autem cum primum emergit, tollere ab eo oportet. Conuenit microphyetis, tuſſientibus, peripneumoniciſ, & iis, qui immodico ſudore digeruntur.

Milon, eſt tertius modus egreſſionis vucæ oculi, cum tantum egreditur, vt palpebræ minùs præualeant, & pili palpebrarum pungentes, clauſis oculis dolorem inferant, lib. de ocul. part. 4. cap. 11. Sic dicta ea eſt prociſſa, quòd ita protuberet oculus, vt malum exertum appareat. *Μῆλον* enim etiam, ideſt, quod Galli Pomum vocant, cuius flores, folia, & germina adſtringunt; dicitur etiam *μῆλον*, *mala*, gena, pars faciei inter naſum & aurem ſub oculo leuiter eminens. Ea pilis nuda eſt, non modò propter os ſubiectum, ſed etiam ad ornatum & decorem vultus, quoque naturam voluerit eam eſſe ſedem pudoris, ibique maximè oſtendi ruborem. Sic dicta eſt a Mali ſimilitudine, ſiue rubeum mali colorem ſpectemus, ſiue rotunditatem, quam illi natura donauit, vt ſic oculum ab externis iniuriis infra tutaretur. Pollux etiam Author eſt, *μῆλα* vocari tonſillas duas penitiores, in intimo ore poſitas ad radicem linguæ.

Membrana, quam Græci nunc *ὑψία*, nunc *χιτώνα*, nunc *μυώγνα* vocant, eſt pars ſimplex, alba, neruoſa, lata, *πῆμα*, valida, tenuis, facileque dilatabilis. Cum partem aliquam veſtit, *χιτὼν*: cum cerebrum foris integit. *μυώγξ*; alias *ὑμὴν* dicitur; vide *Tunicarum*.

Membrana Adelos, *ἀδελος*, quaſi minus apparens, eſt quarta oculi tunica, a nonnullis inueſta, quam Amphibloſtrocides tunica, quaſi in ſummo excipit, *membrana minima*

minima simul, & tenuissima, quam Hippocrates non cognouit, lib. Introd. cap. 11.

Membrana dura, inuiolata, crassa, cuticularis, (idem enim significant) est, quæ primum caluariæ ossibus exemptis, aut saltem apertis, Cerebrum in eo sem con- tegens apparet, quæ vulgò *Dura mater* appellatur,) cui altera *tenuis mollisque* subnectitur, quæ *Pia mater* nominatur, 9. de anat. adm. cap. 1. Vtramque *meningem* vocant, solis Cerebri membranis nuncupatione hac reseruata; cum Veteres non has solum *Membranas*, sed omnes etiam, *Meningas* vocarent; ibi, cap. 2. quas etiam *Vaginas* vocant, 3. de art. 33.

Membrana Pericardios, quæ & *Tunica*, & *Domicilium*, *Theca*, item & *Vagina*, & *securum Vallum cordi circumiectum* dicitur, est Membrana, in cuius medio Cor est suspensum, quæ ex capite seu basi ipsius ampla valde exorta, post autem paulatim coarctat sese, eo plane modo, quo Cor ipsum, in quandam Coni acutiem definit, ossi pectoris annexa, 16. de usu part. cap. decimoexto, quæ *Capsula Cordis*, & *Cordis inuolucrum* vulgò appellatur.

Membrana Periostios, est inuolucrum tenue, & fibrosum: velut indumentum ossium, à natura condita, lib. finit. per quam ossa sentiunt, (si mo id quid sentiunt,) generaleque quidem nomen est, habetque pro varietate partium, specialia quædam nomina, in Cranio enim *expansio*, in Costis, *ὀστεὸν* dicitur, vide *Periostios*.

Membrana pinguis, idest, *Mesaraon*, & *Mesenterium*, 19. method. 8.

Membrana secundi formis, vide *Chorooides*.

Membrana Sigmoeides, sunt tres illæ membranæ in vena arteriosa, à qua Pulmo alitur, intus ortæ foras pectantes, quas à figura literæ Sigma, *Sigmoeides* appellarunt,

appellarunt, 6. de vſu part. cap. 14. Dicitur etiam *συνμοειδής* *αγγειον*, processus vnus Omoblalæ, quod inſtat antiquæ Græcorum literæ C cauus ſit. Idem *αγκυρ* *ρσειδής* & *κορυκοειδής* appellatur. Dicitur & hoc nomine, Sinus, ſeu Cavitastemicircularis in cubito, inter duas cubiti apophyſes comprehenſa, in quam brachij extremum, Trochleæ ſimile inſeritur. Refert etiam figuram C, vnde *συμοειδής*, vel *συματωειδής* appellatur. Dicuntur & *χόνδροι* *συμοειδείς*, cartilignes quibus aſpera arteria contextitur, quod ſemicirculares ſint inſtat C.

Membrana ſubcingentes, vide *Hypezocotes*, *Cingentes*, *Diaphrattontes*; & *Medianum*.

Membrana Triglochina, ſunt membranæ arteriæ venoſæ; (quæ in pulmonem diſtribuitur) foris intro petinentes, quas *Triglochinas* appellarunt, non à figura aliqua, ſed à mutua inter ſe ipſarum compoſitione, quæ culpidum telorum eminentiis, atque angulis, quos *glochinas* vocant, penitus eſt ſimilis, 6. de vſu part. cap. 14.

Membra ſpiritualia, ſunt Pulmo, Cor, Thorax, & duplex arteriarum genus, læue & aſperum. 7. de anatom. adm. cap. 1.

Membrum ſimplex eſt, cuius quamcumque partem ſenſibilem aſſumpleris, erit illa toti communicans in nomine eſſentia & definitione, vt caro, & os, oppoſitum illi eſt *membrum compoſitum*, lib. de anat. viii.

Mendosa coſta, vide *Illegitima*.

Mendosa futura, vide *Lepidoeides*.

Meningophylax, ideſt, *membrana cuſtos*, lamina ænea eſt firma, paulum reſina, ab exteriori parte læuis, qua Chirurghi in vulneribus capitis vtuntur, quoties excidendum, & attollendum eſt os, metuſque imminet,
ne

ne in ipso opere Cerebri membrana, negligentius & ultra quam res expostulat, præmendo, lædatur, & contundatur, ex quo sopores, & graues inflammationes cum mortis periculo oriuntur; propterea quod membranam aurationis iniuriis & grauiori obliatione tuebatur, *μηνυφόρα* appellata est, 4. loc. affe. 2. Huic autem simile, quoddam ferramentum habent Chirurghi nostri, inquit Gorr. quod *Πέτερον* dicunt, cum eo attollant os, quod ferme totum excisum est, & iam labat, non secus quam grandiores lapides vectibus impelluntur, quamquam eodem ferramento cerebri membranam custodiant. Est enim lamina ferrea angustior ab ea parte qua os tangit aspera, ab altera læuis, non recta, sed media duobus locis recuruata.

Meninx, Græce *μηνυξ*, vide *Membrana dura*.

Menses, id est, menstruæ mulierum purgationes, quæ per vterum singulis mensibus fiunt, lib. de atrabile, cap. 8. quæ & *muliebri fluxus*, & *uteri rheuma* appellatur, 2. de caus. sympt. cap. 4. Vnde *menses* mouentia medicamenta sunt, quæ in pessis, aut fomentis, aut quouis alio modo vuluæ admota, non habent vim familiarium succorum attractricem, sed hoc solo nomine bibuntur, vt sanguinem extenuent, & meatus vteri, obstructione liberent. 5. simpl. 20.

Mentagra, vide *Impetigo*.

Menti eruptiones, sunt affectiones vlcerosæ & asperæ, in *Mento* sua sponte nascentes, quæ & *Menti papula*, & *Mentagra* appellantur, 5. de com. med. loc. c. 6. & 7.

Mentum, quod Græci *χένειον* dicunt, id omne est, quod labro inferiori, longa & orbiculari figura subiacet lib. introd. cap. 10.

Meri, Arabibus, *Gula*, Latinis, Græcis propriè *στόμαχος* dicitur, communiter *στόμαχος*; omni enim ventri,

ventri, collum præpositum, instar Isthmi cuiusdam angustum, nominatur Stomachus. Meri autem communis quædam via est, quæ ab ore cibos & potum fert ad ventriculum, inter hunc, & fauces media, 4. de usu part. & 13. method. cap. 4.

Mesaraica venæ, vide Mesenterium.

Mesenterium, (quod & *Mesaraon* dicitur) utroque nomine ab accidentibus ipsi indito; *Mesenterio* quidem à situ: *Mesaraa* autem à peculiari substantia; nam corpus membranosum medium inter intestina situm est, & omnes venas ex iecore in ipsum descendentes, (quæ ob id *Mesaraica* dicuntur) una cum vicinis arteriis & nervis in orbem complectitur, quemadmodum etiam in intestina singula, 6. de anatom. adm. cap. 6. Est autem illi gemina tunica, quarum utraque à Peritonæo iuxta lumbos exoritur & connascitur, nisi qua venas & arterias continent, aut qua adeps multus intercessit, aut qua ipsa intestina conuestiunt. Nam Ecphysis à Peritonæo, Colon, qua fundum ventriculi superuehitur, ab Epiploa posteriore vestitur. Illis autem in partibus intetcedentia vasa, adeps & intestina, tunicas mesaræi connasci prohibent. Cæterum, per eas venæ dispersæ sunt propè infinitæ, quibus tanquam manibus iecur succum ad se trahit, quem in sanguinem vertat, easque tunicæ illæ fulciant, ne dum homo salit aut cadit, vehementius feritur, contundantur, aut disrumpantur. Nec verò *Mesenterium* venas modo continet, sed & arterias à magnæ trunco, quæ secundum lumbos fertur: eas enim omnes simul amplectitur; conuestit, & tuetur. Nec tamen eo contenta natura, ad maiorem eorum vasorum munitionem adipem multum *mesenterio* indidit, præterque adipem glandulosum corpus, quod *πάχυνσας* vocant, machinata est, coque medias eorum vasorum scissuras

scissuras communiuit, ne propter infirmitatem motionibus violentis læderentur.

Mesenterij appendiculum nominant, illud vnum principium, in quo Mesenterii venæ, ac arteriæ (quæ veluti radices in arboribus, in concavam anfractuum partem, inferuntur) inuicem cœunt, & (in quo totum *Mesenterium* cum intestinis continetur) ligamenti natura præditum, sursum tendens, adiacentes sibi habens venas, ad iecoris portas; arterias autem ad eam spinæ partem, quæ in septum transversum, & renes versum tendit, 6. de anat. adm. cap. 6.

Mesopleurin, idest, *Intercostalia loca*, lib. de musc. diff. cap. 23. vide *Intercostales muscoli*.

Metacarpium, vide *Brachiale*.

Metalepticus, idest, *transumptiuus*, vel *translatiuus motus*, quem natura musculis quibusdam conciliauit, 7. de usu cap. 14. vide *Transumptiuus*, & *Euhyporos*.

Metaphrenum, idest, *dorsum*, media est scapuloꝝ pars cui stomachus intus subiacer, lib. Introduc. cap. 10. cui Thorax configitur, tanquam ad carinam naui. lib. tegni, cap. 19. Verisimile est ex ipso etymo, eam Dorsi partem significare, quæ ad septum transversum sita est, quasi τὸ μετὰ τὰς σπένυς. Sic enim Veteres, Septum transversum appellarunt. Rufus vocat partem inter Dorsum & Lumbos mediam, qua Renes adiacent. Nec tamen inter partes spinæ numeratur, quam Veteres totam diuiserunt in Ceuicem, Dorsum, Lumbos, & Os sacrum, vide *Spina*, & *Dorsum*.

Metaporopæsis, est exiguorum meatuum flatulque morbidimutatio, ad naturalem statum; nomen est, idem planè potestate significans, quod μετασύντασις, à quo μεταποροπώσις, nihil differt, 14. method. capit. 4. Vnde *Metasyncriticum medicamentum*, quod a dolore tollen-

do, etiam *Anodynon* sæpe nominatur; Confirmatorium est, & perlatuat, lib. de Dynam. in procem. & 7. de comp. med. per gen. cap. 11. & alioquin & humores euocat ac transfert, 1. de comp. loc. cap. 8.

Metastasis, transitus est, siue transmutatio alicuius morbi, vel febris in aliam speciem, vt, si ex acuto fiat non acutus, tunc inorbus acutus ἐκ τῆς μεταστάσεως fieri dicitur.

Metastasis morbi propriè appellatur, cum ex parte vna, in alteram, malum (morbus vide. causaq; morbida) inigrat; per abusionem autem ipsius etiam morbi solutio, ita nominatur; 5. aphor 7.

Metasynchysis, vide *Metaporopæsis*.

Metopon, μέτωπον; pars faciei supra oculos sita, & ad tempora vsque protensa, ex substantia musculosa, & osse subiecto constans. Aliis, *frons* tantum dicitur, quantum inter supercilia, & capillos patet, pilis nudum. Alij, totum id spatium, quod ab oculis, ad coronalem vsque suturam extenditur, *frontem* & *frontis os* appellant.

Metrenchita, i. e. vteri clysteres, instrumenta sunt per quæ in vterum medicamenta idonea immittimus; perinde vt *otenchta*, i. e. *auricularij clysteres*, per quos in aures, & *recti syphones* (quos *Catheteras* vocant) instrumenta sunt, quibus in vesicam aliquid infunditur, 5. met. 11.

Methodica medicina est, quæ communitatibus, & similibus speculationi vnice intenta, omnes particulares affectus, ad generales duos reducit, astrictum, & fluxum, quos *communitates* vocant, lib. Intro. c. 3. *Methodicis* Medici methodicæ sectæ addicti, quam illi definebant esse cognitionem apparentium communitatum ad sanitatis finem spectantium. Statuebant autem ad curationis indicationem nihil conferre cognitionem loci, affecti,

affecti, causæ, ætatis, regionis, anni, temporis, considerationem virium ægrotantis, aut naturæ, aut habitudinis ipsius, neque consuetudinem, sed à solo morbo, conuenientis remedii indicationem sumendam censabant, neque ab eo secundum speciem; sed ab eius communi & vniuersali notioni, quam quidē appellabant κοινότητα, hoc est, *Communitatem*, vt quæ in singulis particularibus spectaretur. Constituebant autem in vniuersum tres κοινότητες: *adstrictam, fluentem, & mixtam ex utraque*. Atque in *adstricta* quidem relaxandi; in *fluente* verò, comprimendi indicationem sumebant in *mixtis* verò, quod magis vrgeret: Præter hæc tria nihil Medico considerandum iudicabant, quòd ad remedij inuentionem pertinere videretur. Ecquid enim, aiunt, iuuat, refrigerationes, æstus, ebrietates, cruditates, plenitudines, defectus, lassitudines, otia, ciborum qualitates consuetudinum mutationes tam anxie rimari; Easæ, contemptis illis, qui in corpore sunt affectibus, sananda suscipimus, quorum nullum prorsus superest: Nam illa quidem abeunt, quod autem ab illis excitatum est, in corpore manet; id ipsum curare oportet. Hoc enim morbus est. Considerandum est igitur qualisnam ille sit: Si namq; adstrictus est, laxari: si fluidus est, reprimere oportet quacunque tandem ex causa vterque originem duxerit. Quid ergo iam causa valet, cum nec quòd fluidum est, laxari, nec quòd adstrictum est, adstringi nunquam debeat? Atque vt reliqua similiter expendamus, proponatur phlegmone, in qua cum adstrictionis vitium sit, non si æstate acciderit, relaxantia remedia postulat: hyeme autem alia, sed vtroque anni tempore iisdem percuratur: nec puerili ætate relaxantibus, senili verò reprimentibus: nec in Ægypto quidem laxatoriis, Athenis autem comprimentibus. Similiter si phlegmonæ contraria fluida

da affectio statuatur, ea nunquam relaxantibus, sed perpetuò adstrictoriis remediis medicāda est, hyeme, vere, æstate, autumno pueris ætate florentibus, senibus, siue Thraciam siue Scythiam, siue Æthiopiā incolant. Itaq; si nihil horum ad curationē conducit, frustra in his omnibus studium ponitur. Quid verò corporis partes? nonne & hæ superuacaneæ sunt ad indicationē curationis? vel audeat aliquis dicere phlegmonem in parte quidem nervosa relaxandā, sed in arteriosa aut venosa, aut adiposa, aut carnosa adstringendam esse; vel si aliqua sit in corporis quadam parte adstricta affectio, audeat dicere eam non esse comprimendam vel quòd fluidum dissolutumq; est constringendum non esse; quamobrem si partis natura non immutat curationis modum, sed auxiliorum inuentio ex ipso affectionis genere dependet in vanum partis ipsius ratio habetur. Ab ea methodo nimium cōpendiaria *μυσθo-σιναι* dicti fuere quorum Princeps proditur Themison Laodic. Syrus, qui ab Asclep. *rationali* institutus, ac Methodicæ sectæ inuētionem se contulit. Hinc est, quòd illum Gal. multis in locis *communitarum repertorem* nominet. Eam postea Thessalus Trall. absoluit, contra quem Gal. tam acriter sæpe debacchatur.

Milphosis, *Μιλφαί ἢ μίλφωσις*, idem est, ac *Madorosis*, pilorum defluuium est ex palpebris, ab acri fluxione, vide *Μαδoρωσις*.

Μνᾶ, siue *Mina Attica*, & *Ægyptia*, habet vncias sexdecim (hoc est, drach. 128. *Romana*, vnc. 20. lib. de pond. & mens. c. 3. Dicitur etiam *Mina*, Cordis capsula, & glandula, lib. de anat. viii. Plin. autem li. 2. i. cap. vlt. *Μίνα*, inquit, quam nostri *Minam* vocant, pendet drach. Atticas centum. Quin etiam Fannius: *Μnam* vocitant, nostriq; *Minam* dixere priores, centum hæ sunt drach.

Mochlia, *τραδύκτιο* est ossum ad naturalem locum, ab

ab eo, qui præter naturam, lib. finit.

Modus morbi, vide *Morbi mos*.

Mola, *Μόλη*, est os latum & rotundum, toti genu suprapositum, ob figuræ similitudinem sic dictum. Siquidem vt *Mola piltrinenfis* & rotundum est, & ab anteriore parte lateribusque asperum, a quibusdam *pattella, rotula*, & *ἐπιγονατίς* dicitur. Est adhuc *Mola*, caro informis, & inutilis, in muliebri vtero concepta; quem conceptum inutilem in vtero concretum, si subdurus sit, *μύλον*, siue *μύλλω* Græci appellant, id est, *Scirrhum*. Ea interdum rudimentum cuiusdam formæ obtinet, sed inchoatum duntaxat. Certe vel membranis obducitur, inus venis abundat compluribus, sine ossibus, sine intestinis, sine vîlceribus. Fit à semine imperfecto atque infœcundo, vt cui calor desit, quantum adesse expedit ad fœtus conformationem, non tamen planè frigido, humidoque: siquidem ex eo nihil omnino effici potest. Quo fit. vt mulier sola citra viri congressum *Molam* non gignat, quoniam eius semen frigidius atque humidius sit, sed semen viri præterea accedere oportet, naturali tamen frigidius, atque ob id infœcundum, nec eo usque progredi valens, vt hominis formam effigiet: id enim vegeti caloris natiui spiritusque opus est. Sed non sic gallinæ: solæ namque, sine coitu oua *ὀρνίθια*, id est, subuentanea concipiunt; planè muliebri molæ respondent. In causa est siccior volucrum temperatura humoris frigidi redundantiam in semine absumens: Atamen *Mola* quamuis prorsus inutilis concepti fœtus speciem per initia exhibet, menses sistit, nausæas & vomitiones excitat, vterum attollit: Postea verò naturam proritat ad sui excretionem: Id quod sæpè quadragesimo die, interdum autem tertio mense contingit, vel multo etiam scriùs,

adeò vt pleræque nouemdecimve menses, aliæ toto etiam vitæ spatio etiam in vtero gestauerint. Alimentum namque per uenas vteri non aliter quàm fœtus attrahit, eoque nutritur & augetur, vita perinde atque planta prædita Ab excretionē verò puerperia ci antur, quæ *λόγια* vocant, lac in mammis colligitur, cæteraq; contingunt vt in legitimo partu.

Molares dentes, vide *Dentes*, & *Tomi*.

Mollicinum emplastrum, vide *Malthacode*.

Mollis pulsus est, in quo arteria quali carnosior diutius contrectata apparet: *durus*, vbi sicciior, rigidiorque in modum Corij, de pull. ad Tyron. c. 3. *mollitudo* autem & *durities*, sunt tunicæ arteriarum qualitates. ibi 1.

Mollities oculorum (quæ & *Paralysis oculorum* dicitur) morbus est, cùm illorum voluntarius motus omnino aufertur; quatenus cùm minuitur, *tremor*, & *tillatio* dicitur: cùm verò deprauatur, ipsiusque lacerti contorquentur, & non ut decet, mouentur, *Spasmus* nuncupatur, lib. de ocul. part. 4. c. 7. vide *Paralysis*.

Monoculum, vide *Cæcum intestinum*.

Monohemera collyria sunt, quæ vnus diei opera, lipitudines apta sunt curare, 4. de compos. medic. loc. cap. 2. *Μονήμερα* dicta, quòd intra diem vnum curationem abiciant, sunt collyria, quæ cum oui candido, aut muliebri lacte, aliquando verò etiam aqua simplici illita, oculis inflammatione laborantibus eam statim mitigant. Constant magna ex parte iis, quæ mediocriter adstringunt, concoquunt, & discutunt; cuiusmodi sunt acacia (quam quidem quæ habent collyria *τρογιδν*, hoc est, fæculenta, appellantur) æris squama, æs vitum, Crocus, Myrrha, Lycium Indicum, Castorium, Thus. Verùm in quibus astringentia prædominantur, plurimo oui candido diluenda sunt, præsertim

si quid

si quid ex metallicis complectantur . In quibus autem Crocus, Myrrha, Castorium, Thus, Lycium prævalent, in his parcius cui can didum commiscendum . Cæterum vitari oportet vsum τῶν μονομερέων χοληρίων, in plenitudine totius corporis; Nam quia facultate frigida sunt, obstruunt, densantq; meatus, ac si copia humoris in oculis fuerit, in caula sunt plerumque vt tunica καταπέδι sumptur.

Moram, idest, *Triuon*, siue *Attritionem*, Hippocrates appellat, callo obduratam sedem, quæ ex diuturna capitis brachij immoratione efficitur, in ea carnis circumiectæ parte, in quam id prima prolapsione incubuerat, 1. de art. 21.

Morbidus rigor, corporis concussio est, sanis eueniēs, à nulla exteriori causa violenta, sed ex ipsa dispositione corporis intrinseca; at cum aqua frigida corpori affusa, rigor excitatur, non est morbidus rigor, vti cum ex ipsa corporis dispositione suscitatur, libr. de trem. conu. cap. 6.

Morbi mos quem etiam *modum* vocant, vt si morbus benignus, vel malignus sit, tum ex propria sua specie, tum ex superuenientibus ei symptomatibus spectatur, 1. de cris. cap. 3.

Morbosum (νοσώδες) dicitur, vt corpus, vt causa, vt signū, nam corpora, quæ morbos continent; causa, quæ hoc efficiunt; & signa, quæ ipsos indicant, νοσώδῃ Græcis, nobis morbosa dicuntur Gal. in init. artis parua.

Morbus, νόσος, est dispositio præter naturam lædens operationes, 2. cris. cap. 2. primò per se, & non per accidens, lib. de sympt. diff. c. 1. *Præter naturam*, & *contra naturam*, idem sunt; vtrumque enim vno verbo παρὰ φύσιν Græci dicunt; nam & sedus lètericorum color, & lentigo, & alius quiuis etiam leuissimus affectus, contra natura

naturam est, nec tamen morbus dicitur, si propter sui exiguitatē & obscuritatem, summā actionē non lædat.

Morbus Herculeus, vide *Comitialis*.

Morbus magnus, vide *Comitialis*.

Morbus puerilis, siue *Comitialis affectus*, à Cerebri intemperie prouenit iis, quibus humidum natura est Cerebrum, teste Hippoc. lib. de aere, aqua, & locis, ubi dicit, pueris accidere conuulsiones & suspiria, quæ putant puerulum efficere, & sacrum morbum esse: ubi per *puerulum* intelligit affectum comitiale, com. 1. in 6. de morb. vulg. 5. vide *Comitialis*.

Morbus Regius, qui *Arquatus*, *Aurigo*, & *Itēros* dicitur, est bilis flauæ refusio in cutem, & corporis superficiem, quæ proinde etiam hic tingitur, luteaque fit: albæ quoque ventris deiectiones fiunt eo morbo affectis; lib. finit. vide *Itēros*.

Morbus sacer, vide *Comitialis*.

Moria, & *Morosis*, est imminuta functio ratiocinatricis facultatis, quæ etiam *fatuitas* dicitur, Græce *μωρία*, *μωψωσις*, de sympt. differ. cap. 3. vide *Fatuitas*.

Mortifera facies test, de qua in Prognostico dixit, nasus acutus, oculi concaui, collapso tempora, 3. acut. 54. vide *Facies Hippocratica*.

Morōs, *Morōs*. Linamentum, seu Linteum carptum, quod vulneribus, vlceribus, apertionibus corporis seu sicum, seu medicamentis, (quæ ob id *ἐμματα* vocantur) oblitum inditur; vel ad sistendum sanguinem, vel ad detergendum, siccandum, exedendum: Præterea *Mietos*, Linamenta vocant, & Medicamenta, quibus foris impositis, vel eschara vlceribus inducitur, vel meatus obstruuntur, uel carnosæ partes, quæ circa vlcus sunt, exeduntur, & consumuntur, 5. method. 3. Sunt 7 *μορών*, quinque differentiae: Tortile, Rasile, Concerptum,

cerptum, Ellychnio pudendoque simile. Indita sunt
 his differentiis nomina partim a formis ac figuris qui-
 bus effinguntur, partim a materia ex qua constant.
 σπειπὴν, hoc est, Tortile, a forma nomen habet: ξυστὴν καὶ
 τήλητον, hoc est, Rasile, Concerptumque, ab ipsa linteol-
 orum materia; hoc quidem concerpta, illud uerò de-
 rasa: quare etiam aliquando simpliciter ξυστὴν ἢ τήλητον
 ἐξορίον, hoc est, rasura aut vulsura linteolorum; appel-
 lon ut: ἐλλοχνητὸν verò dictum est, non quòd ad lychni-
 seu funiculi lucernarum similitudinem contorqueretur,
 sed quòd ex ellychnio fieret; id quòd ex Gal. apparet,
 lib. 13. meth. vbi ait: extrinsecus autem conuenit linea-
 mentum vel siccum, vel ex vino, præsertim autem
 quòd ex molli ellychnio est, eiusmodi sunt tarsica. Subdit
 autem eiusmodi lineamēta etiam vim quandam
 habere ad superexcrecentem ulcerum carnem consu-
 mendam. Περιπριστικὸν eutem vocatum fuit à pudendi
 umani similitudine. Verùm præter hæc quinque alia
 etiam apud Veteres leguntur, ut apud Celsum, λιμνίστα
 καὶ, quòd ille in longitudinem implicitum linamen-
 tum interpretatur, & aliquando linamentum inuolu-
 tum: & oblongum: & apud Aetium σφινίσκος, quòd li-
 namentum significat ad cunei parui similitudinem in-
 tortum, uel quòd cunei modo ea quæ coniunguntur &
 adhærescunt, saparet, uide *Emmota*.

Motus naturalis, uel secundum naturam est, qui uo-
 luntatis imperium sequitur, sicuti qui inuoluntariè in
 corpore fiunt, præter naturam sunt; ad Thrasio. c. 26.
 Motus enim sensibiles, in animantium corporibus cum
 sana sunt duplices genere apparent; alii quidem ex ar-
 bitrio sanè, ac uoluntate & impetu fientes, qui neruo-
 rum musculorumque ministerio fiunt; atque has Me-
 dici voluntarias actiones appellare solent; alii uerò mo-

tus in animantium corporibus existunt, qui arteriarum, & cordis officio obeuntur, quos *vitales* nuncupant. Ac aliud quoddam tertium motuum genus, in venis habetur, quod & *naturale* dicitur, & sensibus non percipitur lib. de trem. palp. cap. 2. vnde *motus naturalis*, & genus, & species motus est.

Mox apparentia symptomata, vide *Affidentia*, vel *Assistentia*.

Mucor, vide *Coxendrix*.

Mucosum humorem, eum consuevit appellare Hipp. qui lentore quodam, & albedine præditus, ad exanguies partes, hoc est, ossa, & cartilagine cogi cōsuevit, cū imbecilla, ita natura est, vt bene conficere alimentū in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum quid relinquat: Non secus atque in oculis membranae relinquunt, & prominent de sese mucorem quendam, cū lippitudine laborant. Euadit autem natura imbecillior, aut ex propria intemperatura, aut ex multitudine humoris, qui ad partes confluit, vt in præternaturalibus tumorib. 3. de art. 65.

Macro, est interna cordis pars, quæ tantum protenditur, quantum cordis magnitudo occupat spatium, 2. de placit. 4. vide *Basis cordis*.

Mucronata cartilago, vide *Cartilago ensiformis*.

Mucus, siue *Mucor*, est excrementum pituitosum, quod a capite distillat, in grauedine, coryza, & aliis catharris, 2. natur. fac. 9. *Mucus*, siue *Blena*; est crassior pituita, 2. de sem. c. 6. Erasistratus, *Mucum* vocat *Phlegma frigidum & humidum albi coloris*, de natur. fac. 9. Hipp. 4. de art. 42. vide *Coryza*, *Blena*, & *Phlegma*.

Muliebris fluxus, est humorum vitiorum ex toto corpore vacuatio, & delatio per vterum, ad multum tempus perdurans, quam eius facit excretio, lib. finit. Vnde *muliebria* sæpè notant mensiuarum purgationum.

num vacationem, quæ per circuitum repetitur, 3. prorrh. 50. 5 aphor. 28. vide *Menses*.

Mulsa, vide *Meliceratum*.

Multitudinis (quæ & *Plenitudo* dicitur) notæ sunt, vasorum distentio, grauitas vniuersi corporis, pigritia ad motiones & distentiones membrorum, vlcerosa, & laududinaria sensio, traducta in otio prior vita, non sine ciborum, ac potuum largiore ingestione, & solitarum excretionum suppressione, lib. de mult. c. 1. & lib. de cur. rat. per san. c. 4. Est autem *multitudo*, omnium humorum æquabilis redundantia, vel solius sanguinis, non qui sinister sit, & aliis humoribus impermixtus, sed cum iis naturæ modo confusus; qui, cum in hominum corporibus exuperat, eius excessus *πληθώρα* vocatur; Ea autem duplex est, vna *πρὸς ἀγγεία*, vel, ut alij vocant, *χρὶ τὸ ἔγχυμα*, hoc est, *quoad vasa*, quoniam humoribus per vasa infusis consistit, quæ & *vasorum plenitudo* dicitur, cum venæ tunicæ in tumorem impletæ supra naturalem cuique modum se attollunt, iisdemque tensio accidit, de mult. c. 10. Altera, *πρὸς τὴν δύναμιν*, id est, *quoad vires*, cum ægri, qui consuetæ etiam inuim munia obeunt, sentire sese graues, pigros, legnes, atque ægrè mobiles, referunt, lib. de cur. rat. per san. cap. 4. illa propriè *Plethora* dicitur, qualis athletarum est.

Musculus lacerus, *Μὺς*, neruosum corpus est, permixta huic carne, ad partium corporis motum voluntarium procreatus, libr. finit. estque proprium instrumentum motus voluntarij in animalibus, 16. de vfu part. cap. 2. cuius substantia duobus constat, carne, & fibris, positu simplicibus, & secundum longitudinem vt plurimum exporrectis: cuius tres sunt partes; *caput*, quod & *principium* appellant, in quod neruus, & ligamentum inseri solent; *venter*, carnosus magis, &

mus-

musculum præcipuè circumscribens; & *finis*, ex quo *Tendo*, & *Apeunorosis* oritur, atque in partes mouendas inferitur, 1. de motu musc. & 12. de usu part. Quæ ad musculos vasa perueniunt, velut riuus quidam sunt, qui non eorum substantiam complent, sed iis alimentum subministrant, vt nutriantur & viuant. Musculo propè omni aduersus alter musculus, contrariæ actionis author attributus est, vt flexori tensor, adductori abductor, leuatori depressor, clausori apertor. Pauci enim omnino sunt, qui Antagonista careant, vt Sphincteres, & Diaphragma. Nec tamen numero, aut magnitudine, aut robore pares semper sunt *Musculi* actionum contrariarum effectores, pro partis mouendæ pondere; aut actionis vehementia. Sunt autem *Musculorum* differentiarum plures: aliquæ ab ipsorum substantia carnosæ, nervosæ, magis membranosa: aliæ, à magnitudine, magnus, longus, latus: aliæ, a numero partium, biceps, triceps, siue gemelli, & trigemini: aliæ, à figura, deltoeides, rhomboeides, scalenus: aliæ à partibus corporis, crotaphitæ, rachitæ & aliæ, a situ, anteriores, posteriores, interni, recti, transuersi, obliqui: aliæ verò, ab actione, vt sphincter, & masseter. Cæterum, dictus est *Musculus*, vel quod excoriatum murem forma imitetur, vel quod pisces, (quod mihi videtur probabilius) quem *Musculum* appellant, similis sit. Dicitur alio nomine *Lacertus*, à quo lacertosa musculosa significat.

Musculi carnosæ, sunt musculi recti, quibus nulla caro subest; vnde ambientibus musculis candidiores sunt, 5. de anat. adm. cap. 7.

Musculi cremastæres, id est *suspensores*, sunt duo graciles musculi, in vtrumque testem peruenientes, quorum alter à pubis, alter ab ilium oile, per membranosum ligamentum tenue exoritur, atque illinc per meatus,

tum, qui ad testem deuenit, perferuntur, qui testem
 sursum attollunt, lib. de musc. diff. cap. 27

Musculi masticatorii, vide *Mandibularij*,

Musculi rhachytæ, id est, *spinales*, lib. de musc. diff.
 cap. 24.

Musculi temporales, vide *Crotaphitæ*, & *mandibularij*.

Musculus cuticulosus, vel *carnosa cutis*, quæ extremis
 cutis ledis partibus, admiscetur, lib. de musc. diff. c. 30.

Musculus latus, Μυῶδης πλατύς, vide *Latus musc.*

Musculus maximus, qui *Psoa* dicitur, est qui ab unis
 regionibus exortum habens, ad humeri dearticulationem
 ascendit, lib. de musc. diff. cap. 1. vide *Psoa*.

Mydesis, commune nomen est partium, quæ ex pu-
 trefactione corrumpuntur, ἀπὸ τοῦ μυδᾶν; quod Gram-
 matici, & σήπεδς, δυνῡγραίνεδς interpretantur: Adeo vt
 τῆς μυδῆσεως nomen iis competat, quæ putrefacta lique-
 cunt, & stillant. Ac quanquam omnibus, sicut αἱ τῆς
 εἰσαγωγῆς habetur, partibus communis sit, ἢ μύδης, in
 oculis tamen ante omnia vsurpatur, eorumque præser-
 tim palpebris, quæ adipe tumentes humorem assiduè
 remittunt, lib. Introd. cap. 15.

Mydriasis dicitur, cùm pupilla quidem, nihil colore
 variat: dilatatur autem magis, quam natura poscat, vt
 Iridis circulo fiat proxima, & visioni noceat; & proin-
 de est pupillæ nimia dilatatio, 3. meth. 2. & lib. Introd.
 c. 15. Eo malo visus, quandoque in totum adimitur, non-
 nunquam impeditur, vt omnia minora quam sint, esse
 videantur, diffuso scilicet eo spiritu per quem videtur.
 Causa huius est humorum influxus, siue paulatim factus,
 siue repente coaceruatus, à quibus tunica ὑπαρχοειδης di-
 stenditur, & pupilla effunditur, atque dilatatur, aciesq;
 eius hebescit. Non multum à pupillæ resolutione mor-
 bus hic distat, & non nisi difficiliter editur. Cum enim
 tunica

tunica ἢ φαγοειδὴς membranosa sit, vbi semel distenta fuerit, induratur, neq; facile postea contrahi potest. Accidit præsertim pueris propter tunicarum mollitiem & imbecillitatē Sed & qui natura nigros oculos habent, magnis sunt pupillis, Idcoque in hanc affectionem propte incidunt: Eadem verò et ἀμυδρία, hoc est, *pupilla dilatatio*, appellatur. Κατ- rum, μυδρίασις dicta est, vel ἀπὸ τῆ ἀμυδρίας εἶναι, visu obscuriore, quasi ἀμυδρίας: vel ἀπὸ τῆ μυδαν, πωτέαν ὑγραινέσθαι, quod pupilla superfluo redundet humore.

Myelos, quasi *Medulla* μυελός, familiare ossis nutrimentum est, 2. de vsu part. 16. substantia simplex est, humida, pinguis, alba, sensu expers, in cauis ossium contenta, exanguis quidem, sed ex sanguine in ipsas cauitates per venas illabente; ortum habens. Equadit autem candida, & ueluti spermatica, quod ab ossibus eiusmodi mutationem accipiat. Sic maminae lac generant candidum, & adenes humorem dealbant, quem intra se continent, testesque ūmiliter, quæ substantia in cerebro consistens; dicitur μυελός ἐγκεφαλίτης, id est, *medulla cerebralis*, & *spinalis*, vel τῷ σπινῷ, vel διαυχένῳ, vel σπίνῳ, ad alterius differentiam.

Myle, uide *Patella*.

Mylpha, appellantur defluuia palpebrarum, 4. de comp. medic. loc 5. Sunt quæque pharmaca arida; quæ scabris palpebris conueniunt, & ad palpebrarum defluuia conducunt, & obtuse cernentibus, siue per ætatem, siue ob crassitudinem, aut frigiditatem humorum in oculis, aut denique propter flatus caliginos redundantiam id accidat, ibid.

Myocephalon, id est, *musca caput*, est exigua vixæ tunica porrectio, in nigro oculi, muscæ capitis similis per ulcerationē facta, lib. fin. species est τῆς περιπλώσεως, id est, pro

prociſcentia oculi. Cùm vlcera; quæ eroſa vel rupta cornea tunica acciſſit, profunda cuaſerint, portio vueæ excidit, quodque prolapſum eſt, nigrum aut cæruleum apparet; in circuitu verò circa fundum eius partis quæ prociſit, labra eroſæ ruptæve corneæ candida apparent, eoque magis ſi quod prolapſum eſt, induruerit, & corneæ tunicæ labra callum contraxerint. Cæterum, prolabente vuea, pupilla omnino diuellitur, adeò vt vel nullo modo appareat, vel alio prorſus ſitu & figura. Et his quidem notis τὸ μυκέφαλον ἀπὲ τῆς φλυκταίνης diſtinguitur.

Myodes plaiſma, vide *Latras muſculus*.

Myopiaſis, eſt diſpoſitio ab ortu contracta; quā propinqua & propè oculis admota, limis ſemiciuſiſq; oculis cernimus, remota vel parum, vel omnino nihil; li. ſin. *Μυωπία*; affectio; λῶψ; qui afficitur; differt à *Nyſtalopè* qui non natura, ſed morbo talis euafit; vide *Lufcioſus*.

Myracopa medicamenta ſunt; quæ laſſitudines tollunt, cùm quadam odoris ſuauitate, 6. de compoſ. med. per gen. cap. 11. *μυράκοπα* Græcè. Id ſicut acopo liquidiuſ, ita vnguento cratiuſ eſt: recipit enim aut ceram; aut reſinam; aut aliquid eiuiſmodi, quorum nullum in vnguenta admittitur.

Myrmecia *Μυρμηκία* ἢ ἀκροχόρδων, vtrumque malum, cutis exigua cui exerceſcentia canora, & magna ex parte rotunda. Sed *myrmecia* latiore baſi & ſeſilis eſt, ac in ſcalpendo & attritu mordentis formicæ ſenſum efficit, ideoque Latinis *formica* appellatur. *Acrochordon* autem baſim anguſtiorem obinet, vt cordæ nexu ſuſpenſa eſſe videatur, Latini *Verrucam* vocant ſimpliciter, aut cum adiectione *Penſilem*, 2. meth 2. quas *Clauos*, *Callos*, & *Τύλας* vocant, quas aceto acri, macerantes corticem ſaliciſ combuſtu m, tollunt, 6. ſimplic. vide *Formica*.

Myſis,

Myfis, idest, *meatuum conuentionia*, vide *Stegnosis*.

Mistax, *Μόραξ*, pars est faciei, quæ supra labra est, & infra nares: Sed & barba ibi exoricens, eodem nomine dicitur.

Myrtus pulsus, siue *Soricis cauda*, est, qui soricis, murisve caudam imitatur, quæ in acutum terminatur, ut, cum secundus ictus primo est paulò minor, tertius secundo, quartus tertio, i. de diff. puls. cap. 11. A figuris nomen, quæ in acutum terminat, mutuant hoc Medici, ibid. Adhuc *Myrti pulsus* dicuntur, qui ex maiori adaucto, fiunt minores, ex frequenti rariores, ex celeritardiores, libr. finit. *Μυρίζων σφυγμός* Græcè *Pulsus Μυρίζων*, hoc est, decrescens, duplex est differentia. Nam vel non cessat decrescere atque minui, donec omnino aboleatur: & desinat prorsus moueri, qui *ἐκλείπων μύρξων* appellatur: vel cessat decrescere, & minui, qui etiam duas habet differentias: alius enim in qua desit paruitate, hac perpetuo seruat; alius verò rursus augefcit, quem *μύρξων παλινθρομύρξα* vocat, & redit ad aliquam magnitudinem, eamque vel priori parem, vel maiorem, vel etiam minorem: ac nonnulli quidem quæ ante proportionem sunt imminuti, eadem rursus augentur, alij verò maioribus vel minoribus vel accessionibus vtuntur. Pulsus omnis *μύρξων*, prouenit ab imbecillitate facultatis pulsificæ, quæ tanta est, ut ei oneri sint admoti arteriæ digiti. Verùm ea imbecillitas in eo qui *μύρξων ἐκλείπων* dicitur, maxima est, neque enim se recipit & recolligit, postea in eo qui in qua desit paruitate hanc seruat; minor verò, ubi magnitudinem recuperat.

Myxa, Græcè *Μύξα*, est humor pituitosus ex naribus fluens; Latinis, *mucus*, & *pituita narium* dicitur. Is humor pituitosus, lentus & albus in partibus exanguibus, ossibus & cartilaginibus colligi consuevit, cum ad eam

imbecillitatem peruenierint, vt alimentum suum ne-
queant concoquere: sic enim veluti semi coctum quid
relinquitur, non secus atque in oculis membranę labo-
rantes, sordem eam reponunt, quam *λίμν* appellant.
Nec tamen, is humor qui *μύξα* dicitur, perpetuò contra
naturam est. Siquidem in omnibus articulis mucosum
quendam humorem videre licet, ut inde & motio prom-
ptior, & articulus iniuriis minùs esset obnoxius, quod
quæ sicca sunt, abrumpi in motionibus facillè soleant;
eamque ob causam vertebrarum vincula *μύξωδι* Hipp. l.
de art. appellauit. Sed contra naturam in iuncturis ple-
rumque ille succrescit, de quo scriptum est aph. penult.
sect. 6. atque etiam in vtero; vnde abortus sequitur; vt
aph. 45. sect. 5. scriptum est. *Μύξα τῆς* idem quo *μυκτῆρ*,
à *mucò* arbitror, qui per nares exit, Et nares, Sophocles
etiam *μύξας* appellauit.

N

NARCOTICA, quæ & *Hipnotica*, *Stupefacientia*
Somnifera, Græcè, *Ναρκοτικά φάρμακα* (*Colica*
etiam, 5. de comp. medic. loc. cap. 9. & lib. 7. cap. 5.) nun-
cupantur, hoc est, somnum conciliantia medica-
menta, quæ temperiem sortiuntur, summè aduersam iis,
quæ reuera sunt *anodyna*; refrigerant siquidem omnia
corpus, & sensum eò vsque obstupefaciunt, vt, si paulò
liberaliùs ebibantur, mortem afferant, 5. simplic. 19.
vide *Anodyna*, *Colica*, *Hypnotica*.

Nares, *μυκτῆρ*, propriè dicuntur concauæ nasi par-
tes vtrinque positiuæ, quæ meatum præbent spiritui &
odoribus, veruntamen quandoque totum; etiam id
membrum *μυκτῆρ* à Medicis appellatur, qui Latine *Na-*
sus dicitur, odoratus instrumentum; quippe si occlusis

naribus, spiritum ore adducimus, odorem nullum sentimus; sin autem spiritum apertis naribus attrahimus, odor sensum protinus mouet, in medio oculorum prominens, libr. de instrum. odor. cap. 1. Nasus verò in se septum quoddam cartilaginem per media loca diductum habet, duoque foramina satis conspicua; hæc, inquam, quæ cernuntur, & in singulis naribus singula sunt, *Nares* dicitur, ibid. cap. 2.

Narium ala, vide *Ala narium*.

Nasus, vide *Nares*.

Nates, quas *πυγᾶς*, & *γλατῆς* Græci vocant, sunt inferiores corporis partes posticæ ad animalis factæ quietem & sessionem, quamobrem Natibus carnosæ corpora substrata sunt, quarum gibbæ partes, quod orbiculares sint, *sphæromata*, ceu modo orbium factæ, à Græcis appellantur, lib. Introd. cap. 10.

Nates cerebri, vide *Glutia*.

Natiuus calor, (quem & *Calidum innatum* vocant, cuius vi omnia animantia viuunt & vigent) apud Galenum est aut anima, aut primum & præcipuum animæ instrumentum, quo omnia quæ sunt ad vitam necessaria, administrantur. In siti caloris præsentia, *vita* est, vt absentia, *mors*; inæqualiter in singulis corporis partibus dispersus; In corde flagrantissimus; in ventriculo & præcordiis moderatior; in capite, & cerebro, adhuc minor, in ossibus perexiguus; prout natura vnicuique particulæ expedire, & conuenire adjudicauit. Hic *fixus*, *insitusque* dicitur, hoc est, à natura, in prima conformatione singulis partibus certa mensura & debita proportionem inditus; cui *calor fluxus* & *aduentitiuus* opponitur, quem natura in corde tanquam in quodam penu collocauit, vnde per arterias cum spiritu & sanguine, suis velut vehiculis & pabulis continenter

depromitur, ferturque in singulas partes, vt earum calorem natium, fixum, infitumque foueat, atque instauret. Idem ille cor influens, in mœrore, metu, verecundiæ initio, frigore, accessionum principiis, & somno, intrò cum sanguine & spiritu ad cor recurrit, & ob id per eos affectus, & cutis, & subditæ illi partes frigent, & pallent; contrà in gaudio, verecundia iam vigente, statu accessionum, ac vigilia, calor ad cutim copiosior effunditur, cum spiritu & sâguine, & pronus calor, rubor, tumor & calor; hic partibus inducitur.

Natura nomine, *temperamentum* intellexisse Hippocreat, atque id esse præcipuum, & maxime proprium *Natura* significatum, ab ipsa naturæ substantia desumptum, cum sæpius, è, tum libro toto de *Natura humana*, Galenus testatur, 3. aphor. 2. vbi naturarum has dicit, æstare, has hyeme, malè benève se habere.

Naturales facultates, quæ in *duo* sunt, à Galeno in arte parua distinguuntur; in primas, seu principes & in secundarias, siue ministras: *Prima* statuuntur tres; *generatrix, auctrix, nutritrix*. His omnibus singulis, aliæ quatuor seruiunt, *attractrix, retentrix, concoctrix, expultrix*, quæ non in tectore modo, sed in omnibus vel minimis corporis partibus, à primo statim ortu insunt.

Naturalis motus, vide *Motus naturalis*.

Nauforme os, vide *Scaphocides*.

Nausea, vide *Vomitus*.

Nauseationes in venis, id est, *varicosities* appellat Hippocreat, quas prius vocauerat *exuccationes*, hoc est, *sugillationes* cum venæ (more eorum, qui nauseam patiuntur, & euomunt) sanguinem expuunt, ac quasi euomunt, tum ex propria imbecillitate virtutis retentricis, quam ex inflammatione contraxerunt, cum ex ipsius sanguinis copia, & prauitate, 2. de fract. 24.

Nebula, Græce νεφέλη, sunt vtriusque oculi membranae ex aliquo ulcere tenues, & superficialiæ albedines quasi & caligines; nam si crassiores sint, & profundum petant, Δανώματα, & *albugines* dicuntur, lib. de re med. part. fac. cap. 12.

Nephritis dicitur renum affectus, siue is similis sit, vt *intemperies*; siue instrumentalis, vt *calculus*, siue communis, vt *ulcus inflammatum*; propriè tamen *Lithiasis*, id est, calculi morbus, *Nephritis* appellatur, lib. de ren. affect. dign. c. 2. Omnes verò homines, qui subinde difficulter meiunt, aut etiam suppressam urinam omninò habent, vbi circa lumbos dolent, ac arenosam meiunt, *Nephriticos* dicunt, quo calculo emicto, eorum protinùs dolor, & urinæ suppressio desinit; 1. de plac. c. 13. vnde *nephriticas, antidotes, & compositiones* appellant, quas renibus affectis accomodant, vt ex ipsa appellatione manifestum est; *nephritice* enim aliud, quam renales sonant, 10. de compos. med. loc. cap. 1. Est autem duplex earum differentia generalissima: quædam enim calculos renes iuuant; quædam verò inflammatos & ulceratos, quæ etiam ad vesicam similiter affectam conueniunt. Habent autem contrarias inter se facultates: quæ enim inflammationibus, & ulceribus conueniunt, mitigatiora esse oportet, coniuncta tamen diureticis: quæ verò calculosis medentur, vnicam facultatem sortuntur, quæ secare, & extirgere potest cum manifesta caliditate, sunt autem talia omnia ferè amara.

Nervum, quidam appellant omnia similarium corporum genera in animalibus, & quæ & ex sanguine sunt, & sensu carent, vt, quæ ex ossibus oborta, ab Hippocr. *copula & ligamenta* vocantur. Insuper, quæ ex cerebro & dorsali medulla prodeuntia, ab eodem propriè *Nervi*, & *Toni* dicuntur. Denique ex musculis qui proueniunt,

iunt, *Tendones* quoque sic vocitant. Quidam igitur omnia hæc *Nervos* appellantes, primum, ipsorum genus *colligatorium* esse aiunt; secundum autem, *sensibile*, & *electorium*; tertium, *apemorosim*, hoc est, *nervorum propaginem*, cognominant, comm. i. in 6. de morb. ulg. *νεῦρον* autem ἀπὸ τῆς νῦνεν, Græcis dictum est, quod *vincere*, & *flectere* significat, ut docet Galenus, initio libri de motu muscul. vide *Tonos*.

Nervum colligantem, Medici vocant *νεῦρον σπαστερικόν*, quem Hippocrates vocat *ligamentum*, seu *σπαστεσµὸν*, *copulam*; ex ossibus ortum dicit. vide *Nervum*.

Nervi duri, & *molles*, & eiusdem quidem substantiæ, at non uniusmodi sunt usus: *molles* enim ad sensum; *duri*, ad motum sunt destinati; non quidem quod duri non sentiant, sed à duris hebetior & obusior sit sensus quam à mollibus: mollium principium est *cerebrum*; durorum, *spinalis medulla*; ab hoc principio, singuli in suas sedes, à natura mittantur, *molles* quidem, in organa sensuum; *duri* in musculos: dicuntur autem *molles*, vel *duri*, sibi inuicem simul, & ad cerebrum, collati.

Nervi optici, seu *visui*, vide *Nervos sensificos*.

Nervi recurrentes, *Νεῦρα παλινδροµήντα*, sunt rami duorum nervorum sextæ coniugationis a Cerebro prodeuntium, quorum dexter circum arteriam, quæ axillam, adit; sinister verò, circum magnum arteriæ descendentis truncum obvolutus, sursum reuertitur, & recurrit quasi in laryngem, ad vocem efformandam; quare Galenus, 4. loc. aff. *φωνητικὸς*, maluit appellare, id est, *vocales*; ita enim sunt necessarij ad vocem, ut secti, vel intercepti, vocem prorsus aboleant; refrigerati verò, tantisper vocem impediunt, donec calefacti, naturalem temperiem recuperaverint, i. loc. aff. 6.

Nervi vocales, sunt nervi gutturis, qui ad instrumen-

ta vocem concinnantia propriè pertinent, quos Galenus & inuenit; & eo nomine donauit,) quibus vel incisis vel laqueo interceptis, vox perit; non differunt à nervis apud arterias existentibus, quos *recurrentes* nominant: ipsorum enim essentia pars sunt, & vtrique vocem efformant, i. loc. aff. 6.

Nervi voluntarij dicuntur, qui ex cerebro, dorisque medulla ortum ducunt: sicuti *Nervi*, qui ex musculis *tendones*, & qui ex ossibus proueniunt, *ligamenta* appellantur. lib. de ossibus in proœmio.

Nervorum coniugatio dicitur, quoniam nervus non vnus, simplex, aut *ἁπλῆς* a suo principio proficiscitur; sed omnes coniugati ieruntur, ideoque ab Anatomicis *nervorum paria* appellantur, ac septem quidem paria à cerebro, triginta verò à spinali medulla proficiscuntur.

Nervos sensifcos in genere vocant, qui ad sensuum instrumenta mittuntur, aliis quidem, qui mouent membrum, molliores; 7. de plac. 4. Proprie autem *sensifcos* vocant *Nervos*, siue *Poros*, nervos a cerebro ad oculos. descendentes, qui soli sunt conspicuæ, & sensibiles viæ spiritus, 10. de usu part. 12. & proinde eosdem *Optricos* vocant, 16. usu part. c. 3. atque etiam *Visuos*, ab actione nomen imponentes, lib. de neru. diff. cap. 2.

Nervosa discriminationes, sunt fines membranarum, quæ officiis cor lis adiacent, i. de placit. 10.

Nervosum, *νευρώδες*, corpus spermaticum, & exanguè; ad nervi naturam, & similitudinem accedens; licet enim Galenus tria nervorum genera dicat initio, lib. 15. de usu part. & comm. i. in 6. τὰ ἐνδύμια, præter illa tamen tria genera, sedes, vterus, vesica, & pudendum virile, *nervosa* dicuntur, cum tamen nullo prædictorum generum contineantur, aut componantur, sed quòd nervolorum corporum similitudinem gerant;

contrahi enim in angustam & extendi in latum possunt quæ corpori carnoso & pingui non conueniunt : vnde quidam Penis colem', *neruum cauernosum* appellant, ab eoque Penem & ipsum, totum *cauernosum* vocant, quos arrigi, flaccescere, item contrahi, extendique possit, com. I. in 6. de morb. vulg. 2.

Nervus cauernosus, vide *Nervosum*.

Nectis vñis, *intestinum*, vide *Enterā*, & *Ieiunum*.

Neurotonus dicitur is, qui in nervis vel tendonibus, sine discrimine, vulneratus est. 3. de compos. medic. per gener. 2.

Nentrum corpus est, vel quod neutrius extremæ dispositionis est particeps, uel quod vtriusque, vel quod nunc huius, nunc illius particeps, salubre nunc, nunc insalubre est, lib. regn. cap. 6.

Nigrabilis, est humor melancholicus, qui dum animal naturaliter se habet, quotidie gignitur, & proinde omnino alia est ab ea, quæ ex vñione, ac velut assatione conflat, 14. method. cap. 9.

Nigra vena, vide *Communis*, & *Media*.

Nigritia, & *Nigror*, vide *Contusio*, & *Effusa*.

Nodi, sunt extrema pars post brachialis, a quibus digiti incipiunt, quos *Condylus* Græci vocant, lib. Introd. cap. 10.

Nomas appellare Medicis mos est, putrescentia vlcera, ἀπὸ τῆς νέμεως, id est, a *pascendo*, quod putredo depascatur membra, & ad vicinas partes serpat, adeoque vna cum parte primùm vitiata, & ipsas finitimas sedes corrumpat, 9. simpl. Putredinem autem acquirit vel diuturnitate temporis, quo omnia, quanquam initio *εὐήγη*, sint; tandem *κακώγη* redduntur, vel statim a principio, vt quod a venenatis animalibus factum est. Progreßu quidem temporis, & *Aphæ*, & *Dysenteriae* in

Nomas transeunt, teste Galen. Sunt autem omnia eiusmodi vlcera ægrè sanabilia, & vehementissimis proflus medicamentis opus habent; adeò vt citra vltionem sanari non possunt. vide *Phagedanas*.

Notha costa, vide *Illegitima*.

Nothon, vide *Tergum*.

Notyæos myelos, vide *Myelos*.

Nubis nomen, solent Medici, ab aere, ad vrinas transferre, pro aliena eorum, quæ in vrinarum superficie pendent specie, vel euaporatione. Vt ergò in aere interim tempestas fit, vbi nubibus condensatus, ater, & nubilosus dicitur, videnturque nubes quædam per eum disiectæ; quo quidem tempore nubium cernimus colorem non exquisitè atrum, nec lucidum, sed inter hos medium: haud aliter, *nubes in vrina* (quam vocat etiam Hippocrates *nebulosam suspensionem*) alia alba, alia nigra, alia media, oritur ex euaporationibus, ad vrinæ summâ parte delatis, com. 1. in 3. de morb. vulg. 4. quæ etiam dicitur, *Nebula*, *Nubecula*, *Sublimamentum*, ἐναέριον εἰς πρηνέρελον. Cæterum, id omne crudum esse, & a flatuoso spiritu in altum efferri, Galenus docuit; quod verò perfectè concoctum, secretum, æquale, simile reque est, id certè quoniam nihil flatus habet, in fundum vasis vrinarij descendit, ac vocatur *Hypostasis*.

Nucha, vulgò appellatur *spinalis medulla initium*, Græcè νωτιαῖον μυελόν, *Medulla spinalis*.

Nutritum est, quicquid substantiam nostri corporis conseruare, & augere, & in eadem conuerti, aptum est, 1. simpl. cap. 1.

Nutritio, est continuò effluentis substantiæ redintegratio; vnuinquodque verò, ea ipsa substantia, quam primum genitum est; ali etiam perpetuò consuevit; 1. de sem. c. 16. vide *Posthesis*. Vocantur autem omnis illa alteratio,

alteratio, quæ alimenti in substantiam partis, quæ nutritur, transmutationem præcedit, *concoctio*, ubi verò iam parti apponitur, *nutritio*, 8. de compos. med. loc. c. 6.

Nyctalops, νυκτάλωψ, *Lusciosus*, is est, qui die videt obtusius, Solo occiduo acrius, nocte magis adhuc; vel contra, die parum, vespere, aut nocte prorsus nihil, vnde *nocturna oculorum cæcitas* appellatur, 2. method. 2. 4. de compos. med. loc. 8. lib. de Introd. Accidit propter capitis imbecillitatem, & maxime spiritus visui crassitudinem, itemque reliquorum oculi humorum, ac tunicarum. Cæterum, νυκτάλωψ dicitur non ille modo, qui ita laborat, sed ipsius etiam affectionis nomen est. Sic autem dicitur quab' ο τῆς νυκτὸς ἀλαΐς, hoc est, *noctui cæcus*: λαλεῖν enim *videre* significat. vide *Lusciosus*.

Nympha, vide *Colliculum*.

O

O Bauditus, siue *Obauditio*, est vitiata actio auditricis facultatis, proportionem respondens vitioso visui, veluti cum oculis, colore, figura, magnitudine, vel situ mutata videntur, differens à *Baricoia*, quæ est audiendi difficultas, grauis auditus, seu diminuta audiendi actio; vt surditas, est ablata audiendi actio. Aufertur autem, minuitur, vel deprauatur auditus, aut læsa aliqua aurium particula, aut nervo, qui in has à cerebro pertingit, aut cerebri ea parte, quæ is nervus exoritur, 1. de sympt. caus. cap. 3. 4. 5. vide *Baricoia*.

Obelaa sutura, est cranii commissura recta, quæ a media sincipitis sutura ad mediam suturam occipitis secundum longitudinem extenditur; Græcè dicitur ὀβελία ἢ παρὰ τοῦ ὀβελίου. Vtrumque nomen inditum est,

est, quodd veru, aut sagittæ, aut virgæ instar rectâ incedit, Latini proinde *rectam*, & *sagittalem* vocant, 9. de usu part. cap. 17. & lib. de ossibus in præmio.

Obliquatus pulsus est, qui oritur non constituta in rectum arteria: seu, qui editur cum arteriæ situs obliquus est, lib. finit med.

Oblongum & depressum dicunt ossis caput, ad ceruicem & sinum, cui inseritur, id ipsum referentes, lib. de ossibus in præmio.

Observatio, Τήνωσις, Empiricorum vox est, qui quicquid observassent fieri in morbis, τήνωσις vocabant: quorum; cum magnam haberent copiam, eam omnem ἀσπίδα nuncupabant: & ab observatione quidem memoriam, à memoria verò, experientiam manare dicebant, & ab ea proximè artem constitui, dum meminimus quid cum quo, quid ante quod, quid post quod observauimus, atque id quidem vel semper, vel plerumque, vel utrouis modo: semper, ut vulnerato corde mortem sequi: plerumque, ut scammonia ventrem purgari: utrouis modo, ut percussa superiori membrana cerebri mortem sequi: raro, ut vulnerata cerebri substantia salutem contingere.

Obstipitas, est distortio spinæ, ad laterale corporis partem, 3. art. 2. quam *Scoliosin* Græci vocant vide *Cyphosis*.

Obstructio, vide *Compressio*.

Obstruentia corpora (quæ Græcè *Stegnotica*, quæque generaliore nomine *contrahentia*, *occludentia* & *constringentia* dicuntur) sunt, quæ ora vasorum occludunt, & sensibiles excretiones cohibent, *Corpus enim stegnoticum* quodd claudit, & continere in se, nec quicquam quodd sensu queat percipi, ex sese emittit, Græcè στεγνόν nuncupatur. Differunt à *condensantibus*, quodd hæc poros & meatus corporis contrahant; *obstruentia* autem

& *oppilantia*, vasorum corpora claudant, 5. *simpl. 14.*
 illa *στυρωτικά*, hæc *πυρωτικά* Græci vocant.

Obstupeſcentia est, cum æger iacens, neque aliquid dicit, neque agit, sed apertis oculis quietus manet, similis iis, qui ex timore sunt attoniti, 7. *aph. 14.*

Occiput, *ὀπίς*, ea est capitis pars, quæ a vertice tanquam à centro circuli, vnde capillorum proventus incipit, ad posteriorem capitis partem, vsque ad Tendones & Nucham descendit, lib. *Introd. cap. 10.*

Ochema, *ὄχημα*, id est *vehiculum nutrimenti*, simul cum appellat one, vsum ostendens, quod Hippocrates vocat *serosum recrementum*; est aquola & tenuis sanguinis humiditas, ad crassam substantiam Chymi, per arctas venas in totum corpus ferendam, à natura comparata, 4. *de vlu part. cap. 5.*

Ochthode, *ὀχθὴν ὕλην* *ulcera*; id est *verrucosa*, quæ non maligna & contumacia sunt, sed solum labra callosa, & dura habent, 4. *de comp. med. per gen. cap. 5.* vide *Dura ulcera* *ὀχθὴν*, tumores verrucosi, tuberolique, quales in Elephanticiis apparent.

Ocrea, vide *Tibia*.

Odaxismus, *ὀδαξισμὸς*, est pruritus is, qui conceptis iam intra gingivas dentibus, & erumperosestantibus, sentitur, quo solent infantes relatis ad os digitis, identidem eos mordere, & ipsi gingivas suas confricare. Aliud autem est *ὀδαξισμὸς*, quam *ὀδοντίασις*: hæc enim dentis iam concreti eruptio extra gingivam, (alio nomine *ὀδοντοπύα*) ille verò dentis ipsius concretio, & conformatio intra gingivam, seu dolor ex eiusmodi concretionem exoriente. Herimolaus Barb. apud Dioscoridem gingivarum commersionem vertit. Reperitur & *ὀδαξισμὸς*, ab *ὀδαξέω*.

Odonalgia, id est, *Dentium dolor*, 2. *meth. 2.*

Odon-

Odontoeides, vide *Dentem*.

Odontophya, puerorum est dentitio, ubi scilicet è gingivis prorumpunt dentes.

Odoratum, nominant non solum odoris sensum, sed etiam vim ipsam, cuius odorandi officium est, lib. de Instrum. odor. c. 1. ὀσπρῆσις Græcè. Sic & γεύσις non modò saporis sensum, sed ipsam etiam facultatem significat, per quam gustamus. Huius autem tum sensus, tum facultatis instrumentum intra calvariā conditum est, siue id sint ventriculi cerebri anteriores, seu potius continuæ cum iis propagines, similiter cavæ, prope ossum ethmoidicū in initium desinentes. De eo namque dubitare Galenus videtur, modò hoc, modò illud asserens.

Oedema, οἰδῆμα, videtur Hippocrat. omnes præter naturam tumores, nominare, siue dolore careant, durique sint, quos *scirrhus* Græci appellant, siue dolorem inferant, quos *phlegmonas*, id est, *inflammationes*, propriè vocant; siue absque dolore laxi, atque molles sint; quos solos in specie οἰδῆματᾶ, Græci nominant; com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Et proin *Oedema* est tumor præter naturam, qui dolore caret, & digitis cedit: aliquando tamen apud Hippocratem significat, *durum & dolentem tumorem*, 1. prognost. 29.

Oenodes vinum, id est, *vinum vinosum*, quod multam sustinet aquæ missionem, & imbecilles vires ferit; quod & *Polyphorum* & *Multiferum* appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam: Contrario autem modo, *Olyphoron*, siue *Panciferum*, quod ut bibatur, minima eget aquæ missione, 3. acut. 20. & 7. method. 6. vide *Hydatodes*.

Oesophagum, Veteres nominant eam partē, quæ inter fauces, & os ventriculi superius, intermedia est; Aristoteles, & qui post eius sæculum scripserunt, *Stomachum*,

nos *Gulam* appellamus : via est eorum , quæ tum deno-
rantur , tum vomitione deficiuntur , 5. loc. affe. 5. *Gula*,
Arabibus *Meri* dicitur . *Οισοφάγος* dictus est , quod ea fe-
rat quæ eduntur; est enim via cibi. Habet duas proprias
tunicas, quarum interna oris tunicæ continua est, & ibi
crassior atque durior, ubiq; autem nervosa; externa ve-
rò carnosa. Vtraq; fibris contexta est; interna rectis, ex-
terna transversis; sed utrisque quidem deglutitionem
accelerantibus, & vomitum, dum illi trahunt, hi expel-
lunt. Incumbit septem spondylis colli, & quatuor meta-
phreni, nonnihil in dextrum latus a quorum interim
spondylorum ligamenti ortam habet tertiam tunicam
qua illa obligatus fertur in ventriculum, nonnihil in
dextrum latus abscedens, ut cedat aortæ descendentī.
Ad nonum denique spondylium ligamenti valentibus
ab eo natis in altum lenatus arteriamque præteruectus;
iam sinister pertuso diaphragmate cum duobus nervis
insignib. i sexto pari demissis ventriculo vnitur *Οισοφάγος*
etiam ab Hippocrate dici os ventriculi, Galenus in lin-
guarum interpretatione explicavit.

Ocypus, id est, *Lana succida*, siue *non leta*, 14. method.
7. vide *Lana succida*.

Olecranos, quartus est musculus, qui per profunda adic-
cubitum, in medio gibberi interioris, inferiorisque
brachii, 3. de anat. adm. cap. 4. a quo & *Cubitus*, & *Cubito*
os, *Olecranos* appellantur, vide *Ancon*

Oligophoron, vide *Oenodes*.

Oligotrophia, id est, *parcior nutritio*, 2. sanit. tuend. c. 8.

Omentum, *ἐπίπλουν*, ἢ *ἐπίπλυν*, est corpus membra-
nosum ex duplici peritonæo, ceu plexu & adiposa sub-
stantia compositum, medium inter vasa, quæ in ipso
continentur, quibusdam aut multò infra quam umbi-
licus consistens, quibusdam ad pubis ossa descendens;
cum

cum in pronum, ceu ad umbilicum parvæ, magnorum vasorum soboles, ex alto deferuntur, 6. de anat. adm. 5. ex duabus tunicis densis, & subtilibus sibi incumben-
tibus, quam plurimis arteriis, & venis, pinguedine non pauca conflatum, gratia calefaciendi, & ventricu-
lum roborandi factum, 4. de usu part. 9. quod *Epiploon*, siue *Epiplun*, Arabibus *Zirbus*, Antiquis *Rete*, quod ita adipe instructum Omentum, reti non sit absimile, indeque γαστράμων, & σαγών, a plerisque dictum fuit, lib. de nerv. & art. diff. cap. i. Id secto peritonæo pri-
mum in conspectum venit: Dorso ad undecimam tho-
racis vertebra, & iecinoris cauo, & ventriculi fun-
do, & duodeno intestino, & lieni, & colo ligamentis adhæret, reliquis autem intestinis prætenditur, & quo-
dammodo ἐπιπλέει, hoc est, *innatat*, unde & nomen habet. Usus eius maximus est, ut ventriculum, cuius fundo incumbit, foueat, innatumque calorem etiam per inediam tueatur; deinde verò, ut venæ portæ rā-
mos quoquo versus protensos, sibi que implexos fulciat, & arterias pariter nervosque proximis ipsi partibus inferendos tutò deducat.

Omiæa vena, ὀμιαία, id est, *humeralis*, ramus est venæ cauæ claviculæ supergressæ, per Omoplātā in bra-
chium descendens, quam Gal. interdum *externam* vo-
cat, ad differentiam axillaris, quam *internam* nominat: Vulgus nunc *Cephalicā* appellat, quod ad capitis mor-
bos magna utilitate soleat secari. vide *Humeraria*.

Omotribes, siue *Omphacinum oleum*, id est, *crudum oleum*, ex Olivis immaturis expressum, 8. method. 3. ὀμοτριβὲς ἔλαιον. etiam ὀμφάκιον vocatur, hoc est, acer-
bum; refrigerat & astringit.

Omoplate (quæ & *Homoplate* dicuntur, & *Scoptula*, 8. method. 8.) id est, *Scapula*, quæ humeri articulum

constituunt ; est enim in extremo scapularum insculpta capacitas , tanta magnitudine , quanta capiti ipsius brachij dearticulando , cui inferitur , esset aptissima , 13. de usu part. cap. 10. Sunt ossa duo (vtrunque videlicet singula) post thoracem in dorso sita , clauibus & brachio inarticulata. Sunt autem hæc ossa , vt scribit Galenus , admodum inæqualia , & omnibus suis partibus dissimilia Foris enim gibba , intus sima existunt : item ima basi tenuia ac longa superno sine crassa , & parua . Vtraque autem *Homoplata* duobus ossibus in articulatur , summa quidem sua spina acromio clauis per Synarthrosim , cavitatem autem suæ ceruicis ipsi brachio per Diarthrosim .

Omos, humerus, propriè dicitur id totum , quòd in articulatione brachij , cum Omoplata apparet , adeoque reuera ipse articulus brachij , cum Omoplata sic vocatur. Rufus *καρπὸν τῆς βραχίωνος* , hoc est , *caput brachij* appellauit . Apud Aristotelem ferè pro *humeri articulo* accipitur , quem Celsus *Scapulam* vocat .

Oncos , apud Hipp. idem est ac *tumor* , significatque omne id , quòd est supra naturalem constitutionem , incrementum ; lib. de tumorib. c. 1. *Oncos* verò & *Poros* , quidam nostri , *corporis meatus* vocant , 1. simpl. c. 1.

Onyx idem quòd *ὄνυξ* , lib. finit. est puris collectio in nigro oculi , cum phlegmone , iuxta Iridem vnguis similis , Græcè *ὄνυξ* , *unguis* ; qui propriè dicitur pars digitorum extrema , lata duraque qua ipsi firmantur . Sunt autem qui vngues partis nomine non dignentur , vt nec pilos , quòd nulla sit eorum propria actio , vt qui facultate omni carere dicantur , à qua omnis actio primario proficitur . Nullam enim , inquit Galen. gubernationem habent , sed ortum tantummodo . Vsum tamen aliquem atque vtilitatem asserunt , quòd iis extremi digiti

fir-

firmiores sint, & melius apprehendant. Ex recre-
mentis autem orti sunt vngues ad eundem mo-
lum quo & pili crescunt, alio atque alio subinde excremento
ad vnguium radices expulso; & imæ eorum parti adhe-
rente, eamque ut clauus clauum trudit, pellente. Sunt
autem duri, quod ex solidis corporibus solida quoque
duraque excrementa prodeant. Est etiam *onyx* lapis,
qui & *ὄνυχις* dicitur, quod illi candor sit vnguis hu-
mani.

Ophiasis, est affectus capitis, quo capilli primùm ex-
tenuantur; deinde decidunt in certis spatiis & capitis
sedibus, in Serpentis similitudinem; Idem reuera-
cum *Alopecia* malum est, solaque figura ab eo differt.
vide *Caluities*, & *Madarosis*.

Ophthalmia, hoc est *Lippitudo*, frequentissima ocu-
lorum affectio, est inflammatio tunicæ, seu pelliculæ,
os capitis, & Caluariam ambientis, quam & *membra-
nam agnatam, adnatam coniunctiuam*, vocant, propterea
quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis,
forinsecus adnata sit; ligamentum insuper totius ocu-
li ad circumfita ossa, & ob id omnia, quæ circumcirca
oculos sita sunt, vsque ad malas, quandoque in vehе-
menti lippitudine attollens & colligans, 4. de compos.
med. loc. cap. 2.

Opium, est papaueris lacryma & succus, 2. de antid. 7
Eius parandi rationem hanc Dioscorides prodidit :
*Cum ros in papauere exaruerit, cultro decussatum in stel-
las, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam-
cutem incidere oportet, lacrymam excurrentem digito in
concham abstergere, nec multo post redire, ut concreta in-
ueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur,
in utero pilæ teri debet, & in pastillos cogi.* Id *Opium* dici
testatur Scribonius Largus, in descriptione Collyrii,
quod

quod Diaglaucion vocat: *Opium*, inquit, quod ex lacte ipso syluatici papaueris capitum sit, non ex succo foliorum eius, ut pigmentarij institores eius rei compendij causa faciunt. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Dioscorides ab aliquibus capita ipsa & folia tundi, & prælo exprimi, terique in mortario, & digeri in pastillos, scribit: vocari autem *μικρόν*, multum *Opio* ignauus Galenus *Opium* interdum Hispanicum, interdum Lybicum, & album commendat. Aetius aliquando Asianum, aliquoties Achaicum, Officinæ nostræ vno ore Thebaicum, prædicant, emuntque à Mercatoribus alicundo comparatum; sed vbi & quomodo paratum sit, prorsus ignorant. Optimum habetur, inquit Dioscorides, graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facilè aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coeat, & in Sole diffundatur, dein admotum lucernis non atra luceat flamma, extinctum denique odoris vim conseruet. Adulteratur autem multis modis, vt glaucio gummi aut syluestris lactucæ succo: Vnde *opiat* a medicamenta somnifera sunt, quibus *Opium* admiscetur, quæ Arabes vocant *Asfahiar*.

Opisthotonos, vide *Distentio*.

Opopanacem vocant Panacis guttam, & liquorem, 2. de comp. med. per gen. cap. 5. Excipitur lachryma caulo vel radice incisa, cum recens eruperit caulis: ea redditur candida vbi adaruerit: Croci exterius præfert colorem. Probaturn amarissimus, interne candidus & subrufus, extralenis, pinguis, friabilis, tener, facilè tabelcens, odore graui. Damnatur niger ac mollis. Excalfacit ordine tertio, tenuat, emollit; siccatur secundo.

Oppilatio, vide *Compressio*, & *Obstruentia*.

Optici nervi, sunt primum neruorum par, quod cum utroque Cerebri panniculo, ad oculos descendit, secum visibilem spiritum ducens, lib. de ocul. par. 2. cap. 3. vide *Nervos sensifscos*.

Ordinans pulsus est, quando ictus pari semper numero, paribus partibus, & statis procedunt circuitibus, de pul. ad Tyron. cap. 6.

Orexis, ὀρεξις, *appetitus*, siue *appetentia*, est concupiscentia cibi & potus, quam Hippocrates λιμὸν, hoc est, *famem*, appellauit, eo aphorismo, quo scripsit, *famem meripotione solui*, vt in Commento Galenus annotauit: Ea autem a jecinore principium habet. Est enim totum hoc opus naturalis facultatis, quam non φυσικῶν modo, sed & ἐπιθυμητικὴν, & ὀρεκτικὴν. Veteres appellarunt. Sed aduertendum est appetentiæ nomen ambiguum esse. Vna enim significatione dicitur naturalis quædam inclinatio, qua singulæ corporis partes alimentum desiderant, quod in vacuatæ substantiæ locum succedat: & hæc quidem naturalis appetentia est. Altera varò significatione appetentia dicitur desiderium cibi & potus, quo ventriculus exugi se sentiens tenetur: Et hæc quidem animalis appetentia est: siquidem naturalibus animalibus non item stirpibus vacuationis & penuriæ sensum dedit, quo scilicet ad cibum potionemque proritata sese impleri appetant. Fit autem is penuriæ sensus, cum venæ ex ipso ventriculo ueluti emulgentes, sugentesq; aliud trahunt: non ferens enim eum suctum uentriculus, sed ueluti diuulsus, offensæ eius medelam cibum desiderat.

Oriularia. vide *Laminas*.

Orobœides urina, quæ habet hypostasim similem. *Orobis*, eaque fit à colliuatione, & dissolutione carnis, lib. de Urinis, cap. 26.

Oros dicitur à quibusdam *ὀρόδιον*, hoc est, pars tota pedis superior, quam alij *παλόςθεν* appellant, idest, mul-
torum ossium. *Orrus* vero, tum *serum lactis* significat,
tum *Peritonaon*, tum etiam *sacri ossis extremum*, ad cau-
dam vique protentum.

Orthocolon, *ὀρθόκωλον* quasi *rectus articulus*, est articu-
li vitium, quando ob durum aliquem tumorem, muscoli
partem aliquam inflectentes, non sequuntur, sed perpe-
tuo articulus tenditur, nec inflecti potest, 3. de art.

Orthopnea, *ὀρθόπνοια*, quali rectam spirationem dixe-
ris, est magna spirandi difficultas, vt non aliter ea fieri
possit, quam rēta cruce, & thorace elato; quod etiam
lis accidit, qui velociter concurrerunt: qui sic affecti,
dicuntur *ὀρθόπνοιοι*. Cum aspera arteria, vt scribit Gal.
principium a gutture habens, in pulmonem diuidatur;
quoties quidem thoracem cum collo recte extendimus,
arteriam ipsam dilatari contingit, atque etiam quæ ex
ea in pulmones distribuuntur propagines omnes, atque
interim regionem augeri eis internam: hæc quidem
causa est, cur recti spirare affectent. Idem malum ab
alio symptomate, *Asthma* nuncupatur; a viscosis, &
crassis humoribus, circa asperas in pulmone arterias,
sine febre congregatis, de diff. resp. c. 11. & com. 4. in 6.
de morb. vulg. 4. vide *Anhelosi*.

Os, Στόμα, duobus modis dicitur; primum, quantum
duducta labra patent; secundo & proprie, totum id spa-
tium, quod dictis labris, ad imas vsque fauces interia-
cet, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsil-
lae duæ continentur, quarum omnium partium vna tu-
nica est, etiam naribus communis; à peritonaeo progna-
ta, 3. de vsu part. cap. 3.

Os balliste, vide *Astragalus*.

Os cartilagineum est, quod ad caput cordis inuenitur,

ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur, quoddam alij *Cartilaginem osscam* nominant, 7 de anat. adin.

Os cubiforme, vide *Os cyboeides*.

Os cyboeides, idest, *cubiforme*, est, quod ab externis Tarsi partibus est locatum, firmumque in terra constituitur, 3. de usu part. cap. 7. & de articulatione cavitati calcanei, ad finem adiacenti, ibid. cap. 8. *Os cubicum*, est unum ex quatuor tarsi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus. Id calci articulatur, ipsamque excipit, cum reliqua tria tarsi ossa scaphoeidi coniuncta sint. Sic dictum est, quod Cubo simile sit: Verum lateribus omnibus est admodum inæqualibus, & ferè asperis, ut vix quicquam aliud quod latera sex habeat cum Cubo communia: Sed & internum eius latus geminum apparet.

Os frontis, quod vulgus *Coronale* vocat, vide *Coronale os*.

Os humeri, quod Arabes *Os adiutorij* vocant, vide *Adiutorij os*.

Os iugale, vide *Zygoma*.

Os latum, vide *Spina*.

Os magnum, vide *Spina*.

Os naviforme, vide *Os scaphoeides*.

Os palati, vide *Sphenois os*.

Os petrosum, Λιθοειδὲς ὄσυν, ossis nomen, sic dicitur pars ossis temporalis, protensis futuræ lambdoeideæ finibus terminata; sic dicta, quod petrae, vel rupi videatur similis duritie & soliditate. In eo osse apophysis est *σουλωνίς*, quam Gal. *βελονοειδῆ*, & *γροφιοειδῆ* appellat, & alia præterea quæ meatum auditorium concernunt.

Os sacrum, ὀσυν ἱερὸν, duobus modis à Galeno sumitur: primum, latius, ut Coccycem etiam comprehendat,

dat; vt 12. de vſu part. ſcribit, Os ſacrum conſtare oſſibus quatuor, tribus ſcilicet propriis, & Coccyge; hæc enim oſſa ſibi vnita per ſymphyiſim, efficiunt vnum os, quod parte ſuperna vocatur ſacrum, inferna Coccyx. Sicut ipſe humerus qua parte a nobis ſpectatur. *ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς*, parte ſpinæ ſuæ ſumma *ἀπὸ τοῖς αἰσχροῖς*, parte lata *ἐπὶ τῇ πλάτῃ* vocatur, atque ſimiliter Os ſacri ipſius oſſis lateribus annexum, Os illud, ad cotylen Iſchion, antica verò parte Os pubis. Deinde, ſumitur pro ea tantum parte, quæ reuera ſacra eſt, id eſt, magna, & lata, qua parte hoc os, cum oſſe illo per ſynarthroſin iungitur. Hac enim ſola parte reuera *ῥηδὸν* eſt, id eſt, magnum & latum, tuncque eitis reliquum gracileſcens temper ac tenuatum, in tres cartilagineſ acutiſſimas deſinit, quas Coccygem vocant, libr. de oſſibus cap. 12. & 3. de artic. 104.

Os ſcapheides, vide Scaphaeides os.

Oſſe, ὀστέον, partes humani corporis duriffimæ, ſeciffimæ, maximèque terreſtres & frigidaſ ſunt, quæ lemutuò, & alias partes omnes, tanquam fundamenta ſuſtinent, & firmant, atque ad vniuerſam corporis ſubſtantiam ſuſtentandam, & geſtandam factæ, quibus proin omnia adnalcuntur, & ſtabiliuntur. libr. de oſſibus in proœmio. Eorum differentiaſ ſunt permultæ ab apophyſibus, epiphyſibus, cartilaginibus, cœuicibus, capitibus, ſoliditate, cavitatibus; harum quorundam ſuperſtitiis, medulla, & aliis quibuſdam ipſorum particulis, & a conſiſtentia, magnitudine, numero, figura, ſitu, & aliis ſubſtantiam neceſſariò conſequentibus, in ſcleris viſu tactuque obſeruandæ. *Ὀστέον*, Inſtrumentum chirurgicum, quo oſſa, vel attolluntur, vel deprimuntur, vel omnino loco mouentur.

Oſſa alata, vide Pterigocidea.

Ossa cauernosa, vide *Ossa Isthmoidea*.

Ossa colatoria, siue *Colo similia*, vide *ossa Isthmoidea*.

Ossa foraminulenta, vide *ossa Isthmoidea*.

Ossa Isthmoidea, sunt ossa quædam foraminulenta, & cauernosa, ad radicem & principium narum in meatu olfactorio posita, quæ natura variè pertusa, velut spongiam & cribrum formauit, ne aliud corpus durum extrinsecus insuper incidat: in illa ne viribus integris ac frigidus inspirantibus nobis, recta in cerebri ventriculos sese insinuet, quin &, vt vapor odorem secum ferens; per ea foramina a cerebro recipiatur; simul, vt cerebrum vacuaret repente, si quando vitus inciderit, excrementorum copiam; quæ quoniam ad cribri & Spongiæ similitudinem perforata sunt, *Isthmoidea* & *Spongocidea* dicuntur, 8. de usu part. c. 6 & 7. quæ ossa Gal. 3. loc. aff. 10. *Colatoria*, vel *Colo similia* vocat, quod per illa crassum cerebri excrementum purgetur, & percoletur; quod Aristot. vocat *Peritroma*, tenuiora autem excrementa, & quæ vaporis similia sunt, in sublime lata per caluariæ futuras excernuntur; crassiora autem pronaferruntur, quorum altera pars in eas vias, quæ ad os pertinent, influit, & per creatum eicitur; altera, quæ *mucus* dicitur, in nares, & per efflatum vehementem, excernitur, lib. de inst. o. loc. c. 2.

Ossa spongocidea, vide *ossa Isthmoidea*.

Oscitatio, & *Pandiculatio*, sunt mediocres motus virtutis expultricis cerebri, 2. de sympt. caus. c. 6. per quæ contenta in musculis (per quæ quoque voluntarii sunt motus) humida, flatulenta, vel spiritus flatuosi expurgantur, 7. aph. 56. Per *oscitationem* tamen quid solis maxillæ inferioris musculis accidit, quale in *pendiculatione* in omnibus musculis symptoma est; vtraque enim euacuandorum in musculis habituosorum excrementorum causa fit,

fit, com. 1. in 6. de morb. vulg. 4. & 7. aph. 56. *χάσμη* illa; hæc, *συνδίσμια*, vel *συνδισμὸς* Græcè.

Osculum apertioquæ, cum in arteriis & venis fit per resiliantiam, & dicitur *Anastomosis*, siue *Exanastomosis*, cum in vlceribus & vulneribus, quæ sinuosa sunt, fistulosa, & angusti orificij, cum scilicet hæc descedunt, 6. de comp. med. loc. cap. 2.

Ostroco, idest, *ossium dolores* nominantur, cum membranae, quæ ossibus adiacent, dolores, & profundi sunt (idest, in intimo corpore sensum excitantes,) & ossium ipsorum veluti dolentium inducunt imaginem, qui magna ex parte ab exercitationibus euenire solent, interdum etiam a frigore, & plenitudine, quin & ab humorum cacoethia in lue venerea, 2. loc. aff. 8. qui sic laborant, ne minimum quidem motum sustinent, sed omnem formidant. Sentiant autem manifestum calorem, vna cum demorsu & tensione, vitioso humore in totam corporis molem largè effuso.

Ostracoderna, animal omne est, cui pro cute testa est, lib. 1. de aliment. fac. 1.

Otalgia, & *otaxyla*, aurium dolor, est is cum primis, qui ad profundum auditorij meatum pertinet, 2. meth. 2.

Ottenchite instrumenta sunt chirurgica, quibus aliquid in aures infunditur. *Aurifusoria specilla* ab aliquibus, à Cello *Strigiles*, aliter *Auriculares clysteres* appellantur.

Oxelæum, & *œxelaion*, idest, compositio ex aceto, & oleo lue compos. med. per gen. cap. 7.

Oxycraten, idest, compositio ex aqua, & aceto, 1. simpl. 29. *Οξύκρατον*, *Posca*, vel *Pasca* dicitur. Miscendi autem ratio nunquam certa fuit: variè namque temperari potest. Sed, ut author est Aetius, si simplici ratione construatur, refrigerat, & humectat: si con-

diatur, & calorem, & siccitatem adseiscit. Inter Vere-
res, vt idem inquit, omnes ferè conuenit, noxium pa-
rere succum, neruis officere, fluctuosos spiritus creare,
capitis dolores concitare, contra sacrum morbum pro-
desse, vini crapulam mitigare, sanguinis acrimoniam
lenire. Consuluntque ea potione abstinendum; quòd
facile putrilaginem concipiat, qui ex eo contrahitur
humor, item propter noxam, quam neruis infert. Græ-
corum iuniores imitatione Latinorum, etiam *ὀξύκαι* id
genus potionis appellarunt.

Oxydercica facultas est; quæ oculos, (vbi nullum
insit illis sensibile pathema) malè tamen munere suo
fungentes, corrigit, & in integrum restituit, ac nimi-
rum & in auribus & in naribus, aliisque sensoriis cun-
ctis id ipsum præstat, & proin in auribus, E. gr. *Oxycoos*
dicitur, 5. simpl. 23.

Oxygala, idest, *acidum lac*, 3. alim. 16. Lac quòd acuit,
seu coacuit, sit certa quadam lactis præparatione, per
quam sola caseosa substantia relinquitur, eaqua ipsa non
eiuldem omnino naturæ cuius ac initio fuit verum mul-
to frigidior, vt ægerrimè, nec nisi à ventriculo valdè
calido concoquatur. Neque enim calidam & aerem feri
qualitatem retinet, neque pinguem & calidam, butyri,
sed sola crassiore substantia constat, quæ in caseum abit
ὀξύγα-λάκτινον applleatum. Id genus hodie Galli viden-
tur *Iunceam* appellare: Est autem vehementer frigi-
dum, crassum, & concoctu difficilè.

Oxymel, non ex aceti, mellisque missione tantum
compositio est, verum ex mulsâ, paulum aceti accipi-
ente, 3. acut. 24. & 4. san. tuend. c. 6. Acetum mulsûm, vel
Mulsûm acetosum, *ὀξύμελις*, potio vetustissima certa, vt
quæ etiam ante Hip. seculum in sanitatis vsum venerit.
Huius duæ sunt summæ differentię, alia simplex est,
alia

alia composita. Nec verò etiam simplicis ratio vna est: quidam enim ita præparant; Mellis optimo super carbones despumato additur aceti tantum, vnde gustanti nec acidum nimis, nec dulce videatur: ac denuo super prunas coquitur, donec planè vnitàe amborum qualitates sint, nec appareat gustanti acetum adhuc crudum: hinc ab igni deponitur; cumque eo vtendum est, aqua mista ita remperatur vt vinum, nimirum ex lumentis gustu. Id eam vt lucundissimum est, ita etiam vtile: & contrà, vt iniucundum, ita aduersissimum. Alij verò, tum mellis, tum aceti modum definiunt, vini aceti parti mellis, à quo detracta spuma sit, duplum miscentes, deinde ambo leni igni coquentes, donec eorum qualitates in vnum coierint. Alij autem cum aqua statim ipsum faciunt, melli quadruplum optimæ aquæ miscentes, deinde coquentes modico igni, quoad spumare desinat: post verò dimidio aceti adjecto, rursus coquentes, donec qualitatum omnino sit vnitas, nec acetum crudum etiam appareat. Oxymeli omne extergit viscosos humores & crassos attenuat, quapropter viscerum omnium obstructiones dissolvit, siue in febribus, siue citrà febrem datur; verum aquæ multæ mitione vires eius exsoluuntur. Tussim autem mouere, quæ non est, & intestina radere oxymeli Hipp. & Gal. scripsere, non in corporibus quidem crassis & glutinoso humore redundantibus, sed puris ab excrementis, aut iis quæ tenui & acri fluxione vexantur, quæq; nervosas partes valdè sensu exquisitissimo præditas habent: Oxymeli compositum est σκαλατικόν & σπολυγερόν, item χαθυρτικόν, &c.

Oxyregmia, id est, *acidus ruetus*, qui sine aliqua pituita, quandoque in ventriculo frigidior, & in quibusdam læuitatibus intestinorum, quæ ex frigidityte ortum habent, fiunt, 6. aphor. 1. non vbi nulla prorsus facta est cibo;

ciborum alteratio, acidi rufus excitantur, vti nec vbi optimè concocti fuerint, sed tātūm vbi modicam a ventriculi colore alterationē perpeſſi fuerint, nec perfectā adipiſci potuerint. Fiunt etiam propter frigidam pituitam in ventriculo aceruatam, & frigidam fluxionem in ipſum decumbentem, adhæc ciborum tum frigiditatem, tum copiam: his enim omnibus cauſis commune eſt, calorem ventriculi ingentū vincia cibis, non eos vincere.

Oxyrrhodium, quod & *Rhodium* dicunt, eſt frontis linimentum, ex aceto, oleo, & roſacea placenta capiti phreneticorum, aut quacunque intemperie calide laborantium permixtum, 13. method. 11. Sed cum varius poſſit eſſe vtriuſque modus, qui temperatiſſimus, recipit olei roſacei partes quatuor, aceti vnam, vt ait Gal ſic enim me liccriter refrigerat: Quod verò plus aceti habet, vehementius refrigerat, vt contrā minùs, quod minùs habet aceti: Habet etiam vim repellendi Itaque in morborum principiis magna vtilitate illinitur, præſertim ſi calidus morbus eſt. Sed & in œdematis, atque iſſis etiam lethargicis, Galen in lib. method. med. ad-mouet, quo humor quilibet fuerit iſ, a parte affecta repellatur. Tanta adeò vis eſt *Oxyrrhodini*, in frigidis etiam morbis, ſive per ſe, ſive cum ſale, aut thymo, aut alio exhibiti, ne frigiditate nocere poſſit.

Oxys, id eſt, *acutus*, a quo *ὀξείας πυρετός*, *acutas febres*, *ὀξείαν νόσον*, & *ὀξύ νόσημα* dicunt. Conſiſtunt autem acuti morbi eſſentia, non in celeri tantūm motu, ſed cum primis in magnitudine, & periculo, 2. aphor. 23.

Ozena, eſt vlceraſio in naribus profunda tetri odoris halitus emittens, lib. finit. & 3. de comp. med. loc. cap. 3. vnde ex vlceraſum genere eſt, eoque à Polypo differt, quippe qui in tumorū tantūm genere eſt, non vlceraſum: naſcitur ex iafluxu humorū acrium, & putreſcibilem,

scibulum, à cerebro in nares facto, vnde, vel earum
alæ, vel interstitium, vel aliæ ipsarum partes exulce-
rantur; Et humoris quidem acrimonia difficilem admo-
dum eius curationem reddit; putrilago verò granulen-
tiam & foetorem inducit; vnde in orbo nomen Veteres
indidere. Quando, inquit Celsus, vlcera circa nares
sunt, pluresque crustas & odorem foetum habent, id
genus Græci *ῥανία* appellant. Id mali genus nobis
multò frequentius est, quam Antiquis fuerit, vt quod
lucem veneream læpissime consequatur.

P

PÆDOTROPICA, est medicinæ pars, de pue-
rorum sanitate, & regimine, lib. de part. art. med.
cap. 5.

Palatum, partem illam in ore altioris sedis cauiam vo-
cant, quæ super foramina è naribus in ipsum pertinen-
tia, sublimis est, com. 1. in 6. de morb. vulg. 3.

Palimbolus, *παλιμβολός*, homo dolosus est, qui aliud
oquitur, aliud tenet, & qui facile sententiam mutat :
huiusmodi quoque morbus appellatur, qui speciem qui-
lem & spem facit leuotionis, sed tamen intus malignus
est, com. 1. in 6. de morb. vulg. 6.

Pallida bilis, vide *Bilis pallida*, & *amara*.

Palmæ, est ea pars manus, quæ *Metacarpium*, & *Post-*
trachiale dicitur, 1. de muscul. cap. 21.

Palmos, vide *palpitatio*.

Palpitatio, quæ & *Subsultio*; & *Παλμός* Græcè dici-
tur, similiter atque *Tremor*, motus est, quo partes pal-
pitantes, citra voluntatem nostram, nobisque inuitis
contolluntur, & deorsum aguntur, a crasso & vaporoso
pituita, quærente exitum; differunt verò *palpitatio* à
trem-

tremore, quod nemo, qui artus mouere non instituerit, tremas: palpitantes autem particulæ, etiam si in quiete fuerint, nullusque illis motus sit indultus, palpitent: Etenim supercilium, palpebræ, & oculus subindè citra omnem voluntatem attolluntur; tremor autem totius integri membri motus est, ut totius manus, brachij, capitis; palpitat verò pars membri, vt vel sola cutis, vel sola arteria, vt censebat Praxagoras, vel solus musculus vt Herophilus. Adhæc quæ tremunt, totum mutant locum; quæ autem palpitant partes, eundem obtinent, sed modò ampliorem, modò minorem; in se ipsas enim concidunt partes palpitantes, dum contrahuntur, aliò autem mouentur, quæ tremunt; lib. de trem. palp. c. 4. & 5. Adhæc, *palpitatio* est contractio quædam præter naturam in illis corporis partibus, in quibus ob substantiæ earum mollitiem, distentio, dilatatio & contractio accidere potest, 2. de symptom. caus. cap. 2. non enim os, vel cartilago palpitant, quòd dilatari non possint. Denique *palpitatio* motus est toto genere præter naturam, *tremor* autem, missus, ex motu secundum naturam, membrum mouente & motu præter naturam, virtutem ad violenter mouendum proripiente & cogente, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Palpebra, sunt externæ oculi partes superciliis subiacentes, supernè, infernèque interiores oculi tunicas contingentes, hæc inferior, illa superior dicitur, libr. Introduct. cap. 10.

Pancoenus, vide *Endemus*.

Pancratium, vide *pancreas*.

Pancreas, & *pancreon*, *Calicreas*, & *Calicreon*, corpus glandulosum, vel caro glandulosa est, in medio mesenterio sita, quam natura quatuor vasis, venæ, arteriæ, peruo, & vesicæ bilis, in orbem subtrauit, diuisioneque

que

que inter se mutuas repleuit, ne vllum ipsorum facile scindatur, propter vehementem motum, sed molli cedente corpore, conquiescat, 7. de usu part. cap. 2. quodd corpus vocatur etiam *pancratium*, 2. de moru mulc. 6. Cum infiniti propè rami venæ portæ per mesenterium dispersi sint, chylum ab intestinis præsertim tenuibus exigentes, & in iecur deferentes, sciens natura eos propter exiguitatem infirmos esse, & iniurijs obnoxios, ventre præsertim sæpè laborante saltu, ictu, compressu, vociferatione, spiritus contentione, & rerum grauium impulsu, glandibus, singulas vasorum scissuras inunivit, securasque reddidit. Qui vsus est non huius modo glandulosi corporis, sed aliarum quoque glandularum, *ad éras* vocant, quæ pluribus aliis corporibus partibus inditæ sunt à natura.

Pandemus, vide *Endemus*:

Pandiculatio, vide *Oscitatio*.

Panus, id est, *Tuberculum immaturum*, quod aliquando & magnum, & durum, & diuturnum exoritur, 3. de art. 2. est tumor non altus, sed latus, in quo quoddam pustulæ simile est, panis similitudinem habens: hinc Latini *panum* etiam appellant. Vide *Phygerhlon*.

Papilla mamina, id est, extremum mammæ mulieris, quod ori infantis inditur, 15. de usu part. cap. 7.

Papula, nomen est illis, quæ spontè extuberant in cute, ex anthematibus conueniens, quæ superfluis constant humoribus, atque qualitate m ulorum etiam non iniuria subsequuntur, cum tennes humores sunt, exulcerationem potius, quam tumores creant; at crassi, in tumorem eam attollunt, com. 3. in 3. de morb. vulg. 51.

Paracenseis, id est, *punctio*, quæ Hydropicis, & Herniosis adhibetur, ad aquam euocandam, 14. method. 13.

& 6. aphor. 27. Paulus non omnibus aquæ intercutis generibus, sed asciti tantum conuenire scripsit: eiusque tres in vniuersum differentias statuit; vnā sectione facta directè sub vmbilico, tribus digitis interpositis, si sitis ab intestinis orta fuerit: aliam eadem facta a sinistro vmbilici parte, si primario iecoris affectui malum feratur acceptum: tertiam autem a dextra eiusdem parte, si aliene vitium traxerit originem. Scapello eiusmodi sectio fieri debet, aut aculeo intra peritonæum adacto; deinde in foramen immissa ænea fistula, per eam humor sensim effundendus pro cuiusque virium ratione, cauendo vbique subitam cumulatamque vacuationem.

Paracmastica, vide *Continua*. Παρά-μαστική ἡλικία, ætas iam vergens & inclinata. Ætas declinans, media est inter iuuentutem & senectutem. Incipit secundum Galenum, à tricesimo quinto anno, duratque ad annum quadagesimum nonum, quod scilicet senectus incipit.

Paracynanche, vide *Cynanche*.

Paralysis, quæ & *Paresis* a Medicis recentioribus dicitur) est neruorum resolutio, cum nerui & corporis partes, omnino sensus, & motus expertes sunt, i. de sympt. caus. cap. 5. fit, cum humorum multitudo indistincte in aliqua corporis parte, non principe, impaeta fuerit, vt & *Epilepsia*, & *Apoplexia*, partis dici possit, 4. acut. 27. *Exquisita* autem *Paralysis* est, in qua nerui & membra lentienti omnino sensum & motum perdiderunt; *imperfecta*, in qua motus quidem perit, seruato sensu; *imperfectior*, in qua incolumi motu, sensus aboletur: est enim *Paralysis*, motus potius, quam sensus affectio, quæ si fiat in vniuerso corpore, *Apoplexia* potius dicenda est, quam vera *Paralysis*. Accidit insuper *Paralysis* oculis, vbi & *mollities* dicitur cum oculis,

vel motu, vel visu, vel utroque priuatur, læso vel cerebro, vel neruo concauo, vel spiritu uisibili, lib. de ocul. part. 4. c. 13. Est *Paralysis* etiam imaginatricis facultatis affectio, qualis & *Caros*, & *Cataleps* nominatur, de sympt. differ. cap. 3. uide *Resolutio*.

Paramesius digitus, id est, *Digitus annularis*, lib. de musc. diff. cap. 22. Παράμεσος δάκτυλος, digitus minimo proximus, *Medicus* a Latinis dictus, quod Medicinæ dicatur eradatur.

Parophimosi, uitium est *Phimosi* contrarium, cum uidelicet ea, quæ naturales meatus concludunt, opercula, & tegumenta, ita diducta sunt, ut reduci nequeant; proprie tamen dicitur de præputio retrorsum adducto, ut glandem tegere nequeat; quod malum ex nerui contractione maxime contingit; fit & ex immodica præputij siccitate; ei contrarium uitium *Phimosi* appellatur, lib. finit.

Paraphrosine, paruus erransque motus uirtutis imaginatricis cerebri est, qui & *delirium* dicitur, de sympt. differ. cap. 3. Differt uero ab *anæ*, & *amentia*, quod illa sit imaginatricis, aut ratiocinatricis, deprauatus vel diminutus motus; hæc uero, earundem facultatum *paralysis* exstat, & *resolutio*.

Paraplegia, παραπληγία, siue ήμιπληγία, est plerarumque alterutro in latere corporis partium immobilitas sensusque priuatio, quam etiam *Apoplexiam* vocat Hip. com. 2. in 1. prorrh. 50. quod utraque a frigidis & pituitosis fiat humoribus. *Paraplegia*, affectio unius partis corporis talis est, qualis *Paraplexia* totius com. 3. in 1. prorrh. 26. Interdum facta absque conuulsione, *Apoplexia*, in partis alicuius resolutione finiens, *Paraplexia* appellatur, 4. acut. 27. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 59. *Apoplexia*, a *Paraplexia*, ut a toto, pars, differt:

Apo;

Apoplectici namque prorsus & Paraplectici sunt; Paraplectici verò, non omninò & Apoplectici. Adde, sanos mente, Paraplecticos, resolutos parte vna corporis, dextra, vel sinistra, Apoplecticos & mente & toto corpore resolutos esse constat lib. finit.

Pararhythmus pulsus est, παραρρυθμός, σπασμὸς, qui [cùm quæque ætas proprium pulsum agnoscat] non conuenit illi ætati, in quo est ille pulsus, sed alterius proximioris; quemadmodum *Heterorhythmus pulsus* vocamus, qui alterius ætatis habet *rhythmus*, lib. finit.

Parosis, est deprauata visus actio, cùm oculis colore, figura, magnitudine, vel situ, mutata videntur, veluti *Amblyopia* est diminuta actio visus, & cæcitas, visioque ablata, i. de sympt. caus. cap. 5.

Parastata, qui & *seminarij mentus* dicuntur & Latine *Astites* nominantur, sunt qui ex uena & arteria consistant, in unam naturam confertis, semen confluentes, & perficientes, lib. finit. Ἀπὸ τῆ παρίστατος adstare. Id enim quadrat utrique corpori quod Veteres παρὰστατον appellarunt. Duo enim eodem nomine appellantur; vnum, παρὰστατος κριστοειδής; alteram, παρὰστατος ἀδενωειδής. Dicitur autem παρὰστατος κριστοειδής, *Varicosus*, corpus id, quod vtrique testis antestat in modum pyramidis efformatum, incipiens paulo supra testem, qua venæ & arteriæ spermaticæ coeunt & commiscentur, deinde post multos gyros, & circumvolutiones varicum in modum parum latescens, & in superiorem testis partem insertum: Itaque vasis spermaticis coalescentibus gignitur, primumque seminis in materiam, seu semen rude & imperfectum excipit, quod postea testiculus absolvit. Ergo, vt facultate cum testiculo conspirat, sic quadam tenus etiam figura conuenit; habet enim parui cuiusdam testis effigiem. Verum παρὰστατος ἀδενωειδής, id est,

Id est, *glandulosus*, dicitur corpus, seu glandula meatui
 urinario supraposita, vasorum semen deferentium inser-
 tionem excipiens. In eam enim deferentia semen vasa
 postquam coire, inferuntur ad securitatem. Est autem
 ad humillimam vesicæ partem sita, media quodam-
 modo inter vesicæ corpus, & eius cervicem. Verum
 hanc aliqui non *σπασάδην*, sed *σπασάδην* appellant, quo
 vitent ambiguitatem. Sunt etiam qui *σπασάδην* vocant
Os iocundæ, quod situm est ad radicem linguae, vide *Glan-
 dulosi assistentes*. *Parasynanche*, vide *Cynanche*.

Paregorica, id est, *mitigatoria medicamenta*, quæ non
 sanant, sed mitigant, ne malum crescat, lib. de Dyna-
 mid. in procemio, *παρηγορικόν* idem prorsus. quod *π
 ρόδυνον*, hoc est, dolorem sedans. Dicitur & *σπασάδην*,
 hoc est, *mitigatorium*.

Paremprosis, (quam & *periprosim*, hoc est, *Inciden-
 tiam*, & *Casum* uocat, lib. 3. *αἵματι*) est intercidentia, siue
 coincidentia; cum E. græca plenitudo, quæ ex ingestio-
 ne eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, in venis gigni-
 tur, à venis in arterias dilabitur, lib. de caus. procatare.
 cap. 3. Atque vniuersum *paremprosis* est quando aliunde
 in aliud vas humor fluit, 7. de anat. adm. cap. 16. spe-
 ciatim, transumptio spirituum, ex arteriis in venas,
paremprosis dicitur, lib. de uenæ sect. contra Erasistrat-
 um, cap. 2. vide *Coincidentia*.

Parentcephalis, quod & *Cerebellum*, & *Encranion* di-
 citur, est posterius Cerebrum, quod à priori anterius
 enim propter sui magnitudinem, nomen totius sibi
 vindicauerat) crassæ meningis duplicatione est direm-
 ptum, 8. de usu part. cap. 1. vide *Cerebrum*.

Parenchymata, Græci uocant carnem illam substan-
 tiam, quæ inter vasorum intercarpedines recipitur, 7. de
 anat. adm. c. 5. ut quæ in uisceribus, in iecinore, renibus,

liene & pulmone uisitur: quam substantiam Galen. non uult uocari carnem; ea enim solum caro dicitur, quæ in musculo est; reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci; sed quæ in uisceribus, ceu iecinore, renibus, liene, & pulmone uisuntur, eas *parenchymata*, (quali *affusiones* dixeris) Græci uocant; quæ uerò in intestinis uentriculo, stomacho, & utero sunt sine nomine, relinquunt, 10. meth. 1. *παρέχυμα* ergo dictum est ab Erasistrato, quod existimaret uiscerum eorum molera ex sanguine è uenis, effulo con- crescere, ut scribit Gal. lib. 2. simpl. med. Qui tamen neglecta Erasistrati opinione, eorum uiscerum propriam substantiam non *παρέχυμα*, sed *carnem* sæpius appellat.

Paresis, idem quali *paralysis*, id est, *resolutio*, uide *paralysis*; propriè contractio artuum, in quam passio colica terminatur.

Parietalia, uide *Bregma*.

Paristhmia, quæ & *Tonsillas*, & *Amygdalas* uocant, sunt locorum ad Isthmum (id est, eam oris regionem, quæ os & gulam interiacet) attinentium inflammationes, 3. aph. 26. *Paristhmia*, *Tonsilla*, & *Vua*, nihil aliud, sunt, quam inflammationes; *Vua*, quidem Gargareonis; *Tonsilla* uerò, adenum, qui in principio faucium inter se oppositi sunt; *Paristhmia*, corporum eorum, quæ in faucibus continentur. lib. de tumor. cap. 17. quo nomine non solum inflammationem, sed etiam faucium partem illam nominant. Sic autem eam appellarunt Græci, quod locus ille, cui adiacent, ueluti Isthmus quispiam angustus est, quum inflammatione tumet, & multò quam antea angustior fiat. Latini *Tonsillas*, diminutiua uoce a *tolles*, hoc est, *tumore faucium*, appellant. Alio nomine etiam *amygdalas* uocant. Vide *Isthmus*.

Para-

Parochetensis, id est, *deriuatio*, est, cum sanguis auertitur, atq; ad alia membra proximiora conuersus deriuatur; si verò sanguis ad contraria reucllitur, *Antispasmi* Græci vocāt, Latini, *reuulsionem*, §. meth. c. 2. Est autem *παροχέτης* curationis genus ad humores pertinens, vt scribit Gal. cum id quòd per palatum vacuatur, per nares trahitur, nobis irritantibus, aut per acria medicamenta prouocantibus, cum quòd fuit ad oculos, aut aures, tum in nares, tum in os trahitur, collutionibus & gargarismatis acris atque aliis eiusdem generis remediis: cum quòd defluit per asperam arteriam, in pulmonem ad stomachum conuertimus, id enim potius oprandum: cum sanguine per sedem profluentem in muliere, per vuluam deriuamus: similiter cum mulieri sanguinē vomenti ex Hip. consilio, menses aucimus. Sed hoc exemplū reuulsionis potius fuerit, quàm deriuationis. Reuulsio enim fit per loca plurimum distantia, eoq; solo a deriuatione differt. Fit deriuatio a dextris ad sinistra, ab anterioribus ad posteriora, & contra, sed breuissima via, alioqui ad reuulsionis naturam magis accedit; estque humoris tum fluentis, tum iam impacti, & in agra parte consistentis; in quo etiam videtur a reuulsione differre, quæ fluenti tantum humori adhibetur.

Paronychia, Abscessus, est, qui ad latera vnguium enascitur, 8. de compos. med. loc. cap. 2. alii maius ut Inflammationem vocare. Non leue prorsus malum est, vt quod dolores & febres aliquando moueat, & tamen Latini reduuiam curare, pro occupari in re minima, prouerbii loco, vsurpant. Ex quo arbitror, reduuiæ nomine non tantum *παρονυχίας* designari, sed cum etiam affectum, in quo ad vnguium latera caruncula, aut cutis portio resoluitur nullo fermè dolore. Inde Latini *reduuiam*, vel *rediniam*, malum hoc nuncuparunt;

redinire enim *resolvere* est, ut scribit Festus; quanquam Herm. Barbar. *reluium* etiam vocet à *reluendo*, hoc est, *resolviendo*: Arabes *Panaritium* vocant.

Paratides, vide *Eparmata*.

Paroxysmus, vide *Accessio*.

Partes inanes corporis sunt, quæcunque inter extremam thoracis costam, & femoris ossa continentur, 2. progn. 1.

Partus τὰς, actio est partim vteri ipsius, adaucti foetus gravitate, & excrementorum redundantia onerati & distenti, vi propria expultrice, foetum eiicientis; partim eiusdem foetus grandioris effecti, & maiori alimento, quàm quòd in vtero recipere possit, indigentis; atque ex vteri angustia, adaucto nativo calore ad suffocationis imminenti periculum auersandum festinantis, & (quum nò sufficiat illi amplius spiritus maternus, quem illa per arterias subministrat) ad exitum repente concitati.

Parulides, παρῦλις; est inflammatio partis alicuius gingivarum. Ea autem omnium inflammationum modo, nisi discussa fuerit, suppuratur, & vertitur in abscessum; proindeque Paulus lib. 6. παρῦλιδα abscessum esse dixit. Ex ea plerumque gingivæ putrescunt & decidunt, gigniturque ἐπελὶς, hoc est, carnis excresecientia, maxime ad intimos molares dentes. Vidi autem parulidem ab imperito Chirurgo malè curatam, in qua caro non modo supercrevit, sed cum aduerso etiam buccarum musculo prorsus coaluit.

Parygron, id est, humidum, seu liquidum medicamentum, quod medetur particulæ parua adhuc phlegmone, conflictanti, huic protinus impositum; ubi duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit; quem admodum etiam, si phlegmonoso affectu, omnino sit libera,

libera, 7. de compos. medic. per gen. c. 2. Πάπυρον empla-
strum, est ab Hera primum descriptum hunc in modum,
sicut Galen. prodidit: R. Adipis suilli recentis & liquati,
vncias 44. ceræ, vncias 24. cerussæ, vncias 6. argenti
spumæ, vncias 6. liquida cum aridis permiscetur, ac
manebit aliquamdiu liquidius, postea verò consistet per
se, & compagem acquirit: Alij verò postea aliter pro
suo quisque arbitrio composuere. Emollit primo ordi-
ne, præsertim recens: inueteratum enim magis digerit;
Inflammationem quidem coercet & lenit, sed vlcera
sordida reddit. vide apud Paulum & Actium.

Passio, πάθος, πάθημα, generaliter quidem dicitur
omnis motus, qui ab altero in alterum fit, siue secundum
naturam fiat, siue præter naturam, qua parte ab altero
recipitur, hinc visio, auditio, calefactio, frigeffectio, hu-
medatio, delectari, dolere, gaudere, tristari, *passiones*
dicuntur, quorum essentia in fieri est, cum motus sint,
cuius nullæ sunt partes permanentes, sed dum sint, so-
lùm sunt, solùmque in fieri & mutari essentiam suam
hebent: Cum autem motus desit, non *affectio*, aut *pas-
sio*, sed *affectum* esse & *passum* dicitur Græcè πάθος, spe-
ciatim verò non solùm, dum fit alteratio, *passio* dicitur
sed dum facta est, & quæ motu absoluto superstes est,
quam etiam πάθος appellant, vt ex contusione, nigror;
ex febre, tabes; ex continuis vigiliis, insipientia. Ter-
tiò adhuc specialius, non modò *passio*, quæ fit, nec quæ
facta est, sed quæ est præter naturam tantùm facta affe-
ctio, *passio* vocitatur, vt ex vulnere cæcitas: qua signi-
catione, morbi, & symptomatica, à Medicis *Passiones* di-
cuntur; vide *Affectus*, & *Symptoma*.

Pastilli, Græcis ποχιστοί, seu rotula, & orbiculi, ab
efformationis figura, sic dicuntur medicamenta plana,
in rotæ, aut circuli formam eoacta, 5. de med. per gen.

11. & 1. de antid. cap. nono.

Passio, idest, *ulcus depascens*, §. med. per gen. c. 3.

Patella, est os cartilaginofum rotundum, & gibbum, qua femur tibiæ connectitur; aliterque *Mola* dicitur, lib. de ossib. 23. quin & *Rotula*, *Mylo*, *Epigonaris*, & *Epigonus*, idest, *Supergennalis*, appellatur, 3. de vlu part. cap. 15.

Pathema, idest, *passio*, vide *affectus*, *Passio*, & *Symptoma*.

Pathognomonica syndrome, idest, *concurfus*, (symptomatum, affectuum p. n. index, 1. loc. aff. 1. *Pathognomonica* autem signa sunt, quæ & *homogenea* & *homoeidea* dicuntur, idest, eiusdem speciei, vel generis, quæ in vna aliqua sunt affectione, quæ perpetuò & solo illi insunt, tanquam soli propria, & inseparabilis existentia, veluti quæ per sputa excernuntur, affectionis tum pulmonum, tum thoracis, tum asperæ arteriæ, tum gutturis, & tandem respirationi subseruentium instrumentorum, signa sunt, quæ & in respiratione, vitium per se, & primùm contraxerunt, non per consensum: atque hæc signa sunt certissima, non autem ea, quæ perpetuò, sed non soli insunt, vel ioli, sed non perpetuò, comm. 1. in 1. procrh. vide *Affidentia*.

Pathologica, nunc *Ætiologica*, medicinæ pars est, quæ causas & symptomata, & morbos inquirat; vide *Ætiologica*. Eam in totum neglexerunt olim Methodici, sed maxime olim fecere dogmatici Hip. vestigiis insistentes.

Pauciferum vinum, vide *Oenodes*.

Pechys, vide *Cubitus*.

Pecsis, idest, *Congelatio*; πῆξις Græcè, idem quod σπένσις, hoc est, *firmitas*, *stabilitas*, *fixio*, quum verò illa, quæ frigore concresecunt & congelant, firma quæque fiant ac stabilia, ob id maium hoc, (ubi corporis partes

partes præ frigore rigent, adeòque stabiles sunt) *πᾶσις*, id est, *Congelatio*, dicitur, Fit exiccatione, quod proprium sit sicci terminari, atque definiri. Inducitur autem siccitas vel sicco corpore superinducto, vel summo-
tà, quæ inerat humiditatis redundantia. Cuius sum-
mouendæ ratio etiam duplex est, scilicet per compres-
sionem huiusmodi à terrestribus partibus siccioribus
factam, sed adhuc tamen in corpore latentis & conten-
tæ, vel per resolutionem. Causæ verò coagulationis
seu concretionis sunt tum calidum, tum frigidum. Ca-
lidum quidem tam per se, quàm per accidens; frigidum
verò non nisi per accidens, ut Aristoteles lib. 4. meth.
demonstravit.

Pecten, est sinus ipse, quo muliebri pudendum claudi-
tur, lib. Introd. cap. 10. Est adhuc *pecten* ea plantæ pe-
dis, qua terram contingimus, pars, & quæ post conca-
uum ad digitos assurgit: Dicitur & *pecten*, ea pars ma-
nus, unde digitus procedunt, ibidem. *Pectorale os*, medio
pectore situm, costis utrinque alligatum est; constat
autem septem parvis ossibus, per synarthrosim colliga-
tis, quibus singulis, singulæ costæ connectuntur;
quæ tota pectoralis ossis figura à nonnullis, quia gladii
similitudinem repræsentat, *Xiphoides*, id est, *ensiformis*,
lib. de ossib. cap. 12. imò & *Sternon* appellatur, 7. de
anat. adm. cap. 2. vide *Sternon*.

Pectus, ea est corporis pars, quæ inter medias costas,
& utrinque latus iacet, lib. Introd. c. 10.

Pedem summum, partem eam pedis vocat Hippocr.
quæ à planta & lolo, usque ad digitos, & ungues porri-
gitur, 3. de artic. 106.

Pedicularis morbus. vide *phthiriasis*.

Pedion, id est, *planities*, *planta*, seu *Plantum*, est pars
pedis, quæ est ante digitos; quæ verò pars ante hanc

sita est, *Tarsus* dicitur, 3. de vlu part. 5. Arabicè, *Achmas*. *Allud*, Metacarpio manus: hoc, Carpo proportionè respondet, cap. 5. atqui & interiorem summæ manus regionem, & quantum infra pedem est, πέλας Græcè, *plantam* Latine dicunt, 3. de anat. 2dm cap. 1.

Pelignus, est color liuidus, 14. meth. 9.

Pelma, vide *pedion*.

Peltalis cartilago, vide *Cricoeides cartilago*.

Peluis, vide *Infundibulum*, & *Choana*.

Pemphygodes febris, vide *Febris pemphygodes*,

Penis, σῆμα, virile membrum, quod & αἰδοῖον & καυλός dicitur, 2. de sympt. caul. cap. 2. Rufus definit σῆμα dici τὸ ἐκκρεμές τὸ αἰδοῖον, hoc est, partem pudendi pendulam & prominentem; eique subiectam, quæ non propendet ὑπὸ σῆμα, & περίσκιον appellari.

Pensilis veruca, vide *Acrocordon*, dicitur, quod in imo usque adeò sit angusta, vt pendere videatur; tota enim foras prominet, adeò vt excisa nullam radiculam relinquat, angustiore basi prædita, & summæ chordæ similis; à *Myrmecia* differt, quæ basim habet latiore, & nigro colore præditam, atque vbi à Chirurgo tollitur, sanguinem fundit copiosiore, vnde & *Sessilis veruca* appellatur, vide *Myrmecia*.

Pepasmus, πεπασμός, morbi est, & eorum, quæ præter naturam sunt, veluti coctio quædam & maturatio, & ad excretionem præparatio, in qua quod assimilatur, paucum est; quod autem semicoctum, & superfluum, multum; quamquam alibi πεπασμός significatum latius extendit Galenus, dum omnem deductionem in medicrem temperiem πεπασμόν appellat; & alibi omnem morborum πέψιν, idest, coctionem, in succorum alteratione consistere scribit.

Pepsis, vide *pepasmus*.

Peracutus morbus, vide *Acutus simpliciter*.

Per consensum morbus, vide *Idiopathia*.

Perditio, vide *Abortus*.

Perforatio, est sectio, quæ in spatiosam pulmonis sedis capacitatem, ipsumque vsq; in pulmonis cauum penetrat; reliqua verò omnis diuisio ipsius, *vulneratio* quidē dicitur, *perforatio* non item, 7. de anat. adm. c. 14. Nominatur quoque *perforatio*, insignis quidam ventriculus, & meatus, qui ab anterioribus duobus Cerebri ventriculis in ipsum Cerebellum prorumpit, per quem parentecephalis Cerebro est communis & connexa. Cum enim Cerebrum sit à parentecephalide, crassæ meningis duplicatione diremptum, ipsumque oporteret aliqua parte illi coniungi, quo prædictum meatum produceret, in vnum prius locum utrosque ventriculos terminauit, quem sanè *quartum* totius Cerebri *ventriculum* nonnulli nuncupant; alii rectius, non *ventriculum*, sed *perforationem* nominant, ex qua cauitate animalis spiritus parentecephalidi transmittitur, 8. de vsu part. c. 11.

Perfrictio, est natiui caloris frigiditas sine sensu doloris, longiori temporis spatio, & paulatim facta, lib. de trem. conuul. c. 9. quæ natiuam caliditatem, ab humorum multitudine grauari ostendit, 4. acut. 26. vide *frigus*.

Periapta medicamenta, sunt capitis dolori conferentia, quæ Latinis *Aunleta* appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligentur, lib. de remed. part. fac. c. 1. Dicuntur & *περιὰ κεφαλῆς*, cuius generis Gal. plurima recenset, quæ capiti coronæ modo imposita, dolorem eius leuent. Per multa etiam quotidie experimur, quæ brachiali admota febres reprimunt. Vide *Amaleta*.

Pericardium, quod & *membrana*, & *tunica* dicitur: *membrana*, à substantia; *tunica*, ab vsu, 7. de anat. adm. cap. 2.

cap 2. vide *Membrana pericardios*. Eam verò & altera tunica inuoluit, prodicens à membrana costas succingente, qua thoracem diuidit. Quibus thorax breuior est, attingit septum transuersum: non attingit verò quibus septem ossa sortitum est. In eo serofus humor continetur, parciior quidem, quibus cor est calidius; copiosior, quibus frigidius, vaporibus multis in aquam resolutis. Nervos habet à sexta cerebri coniugatione, seu à recurrente sinistro, venas & arterias à septo transuerso, & membranis medium thoracem diuidentibus.

Pericharia ~~περιχάρια~~, hoc est, subitum & vehemens gaudium, contrarium, *Ecplexia*, quæ est subitus timor. Ex amborum occasione scimus multos interiisse, 12. meth cap. 5. vide *Ecplexis*.

Pericholus, id est, *biliosus*, siue is homo sit, siue deiectio, siue vrina, siue morbus, com. 2. in 1. prorrh. 18. Consiueuerunt autem excrementa, bilem substantia tenuem circiter habentia, atque ea circumuoluta, vocare *Pericha*, id est, *circiter colorata*, ibid.

Pericranios membrana, tunica est cranio superimposita, quæ ex duplicatione duræ meningis connatæ undique, & adhærescentis intrinsecus cranio, per suturas extra cranium egressæ, vt cranium duræ meningi, & cerebro arctius vinciret, oborta, ipsi cranio extrinsecus in orbem circumfunditur, 8. de vfu part. cap. 9.

Perinaon, ~~περιναον~~, & ~~περινεον~~, *femen*, & *interfemineum* dicitur, vide *Interfemineum*.

Periodus, vide *Circuitus*.

Periostios membrana, tunica est ea, quæ singulis ossibus proximè adiacet; aggenerauit enim natura, ac circumiecit omnibus ossibus carnes, simulque ipsa pinguisima quoque parte extracta, terrestria, atque arida, nec non pinguedine omni prorsus carentia reddidit, atque

atque ex eo, quod extrahit, lentum ac tenax singulis, & in capitibus colligamina, quibus inter se connectuntur, & in longitudine circum undique tenues membranas produxit, quæ circum ossa, hoc est, ossium inuolucra, & periostia nuncupantur, quibus carnes aggenerauit, 1. de semin. cap. 10. Est insuper *periostios* membrana, succingentem, & costas circumdans, quæ costis intus tenditur, ita ut inter coitas & succingentem, media collocetur, 8. de anat. adm. c. 10. Est quoque *periostios* oculi tunica, septima in ordine, quæ totum oculum cum ossibus colligat, & simul quoque mouentes ipsum musculos operit, 10. de usu part. cap. 2.

Peripneumonia, seu *pulmonia*, pulmonis inflammatio est, quam semper continua & acuta febris comitatur; *pulmo* autem, cum viscus sit laxum & molle, fistulisque inanibus undique infinitis cauum, cordi vicinum a pituitosiore proin atque crassiore sanguine inflammatur, cum subtilis, biliosusque fluat ferè, nec cum viscere, vlla ratione coherescere possit, 4. de caus. puls. cap. 12. & 2. progn. 64. quam sequitur spirandi difficultas, tantæque angustia, ut suffocari laborantes videantur, ac recti sedere cogantur, calidam sentiunt expirationem; multumque aerem frigidum attrahere concupiscunt, atque inter tussendum sputum varium colore eiciunt, insuper grauitatis cuiusdam, thoraci incumbentis sensum sæpè percipiunt, ad colorem, ex imo ad ipsum peruenire, & ad os pectorale; & ad spinam usque extendi conqueruntur, 2. loc. aff. cap. 9.

Periptosis, vel *paremptosis*.

Peritonæum, membrana est, à Græci vocabuli etymologia sic dicta, quod alimenti vasis περιείρηται, hoc est, prætendatur, quæ & *peritonæos membrana*, *peritonæos tunica*, & *tegmentum* appellatur, tenuis substantiæ est,

ex simplicium & primorum corporum numero, præ-
tenditurque tum visceribus, tum intestinis, tum vasis
quæ inter septum transversum & crura habentur, tum
etiam in iis, quæ interiacent, quale est vulua, & vesica
tenuè admodum corpus, latis araneorum telis similli-
mum, 6. de anat. adm. cap. 4. abdomini superstratum,
4. meth. 6. Arabibus *Siphac* dicitur..

Peritonæi vertex, membrana est, telis araneorum si-
milis, inferioribus septi partibus circumiecta, continua,
totam interiorem septi transversæ regionem subuectiēs,
eidemque circumhærens, 6. de anat. adm. c. 8.

Perittoma, est id, quod post completam coctionem,
nec confectum, nec assimilatum relinquitur: adeoque
corpori nec adnascitur, nec accrescit, sed per ipsius la-
xiora spatia, tanquam superuacaneum errât: Vnde no-
men quoque rectè a maioribus & *perittoma* est inditum,
1. de sanit. tuend. c. 3. quod est idem ac *excrementum*, siue
id spiritus, siue corpus aliud solidum sit, *περίτομα* Græ-
cè. Solida quædam corpora inter excrementa reputan-
tur, vt calculi arenulæ lumbrici, & si quæ præterea eius
generis in corpore continentur.

Perniones, quæ & *Chimæthla* dicuntur, sunt intertri-
menta, & scissuræ manuum, & pedum, hyberno tem-
pore à summis algoribus factæ, lib. de med. facul. part.
cap. 23. Oritur verò *χίμηλον* in talo frequentissime. Sic
dicitur ἀπὸ τῆς χιμῶος, quod hyeme maximè proueniat,
vnde & *χίμηλον* quidam scribunt.

Perona, *Sura*, *Fibula*, quibusdā est alterum os tibiæ ex-
terius & tenuius; alteram enim quod crassissimum est,
& interiori in parte situm, *κνήμη*, Græcis, & eodem
cum tota parte, nomine, Latinis *Tibia* appellatur. Ga-
lenus autem ex Hippocrate in *τῇ γλώσσῃ* dicit, *Peronam*
diuersa significare, aliquando quidem os totum membri,

aliquando ipsius ossis epiphyse, interdum eius protuberantiam, siue malleolum. Est autem *ἡ πρὸν* supra breuior paulò, vt quæ genu ipsum non contingat, infra verò longior multo quam tibia, habet autem & supra & infra epiphyse, quarum superiore iungitur cum osse tibie membranolo ligamento; inferiore verò prominente & gibba malleolum externum constituit, sicut tibia epiphyse simili internum.

Perosis, hoc est, *oblatio*, est priuatio & impedimentum naturalis functionis, aut alicuius particulæ mutilatio, lib. finit.

Persistentes morbi sunt, qui eisdem horis accedunt ac remittunt, lib. de Typis, cap. 3.

Perspiratio, & *Perspiratus*, vide *Inspiratio*.

Per viciniam affici, vide *Idiopathia*.

Pes, *ἄξ*, pars infima cruris est, quæ multiplici osse constat, malleolis, talo, & digitis. Pes etiam mensura est, qua rerum interualla dimetimur. Constat vnciis duodecim, siue sedecim digitis: siue palmis quatuor.

Pessarum, *Pessus*, *πίσος*, est lana concerpta, aut pannus, aut bombax, aut linamentum, ad digiti figuram; rotundum factum, quod immersum in medicamentum aliquod, inuolutum serico, filoque appensum in uterum inditur. Fiunt etiam ex gummi, & resinis, & cera, aliisque liquoribus ad talem formam redactis.

Vt autem ex Antyllo refert Oribasius, tres sunt Pessorum differentie: alij namque molliunt, alij adstringunt, alij aperiunt. Mollientibus ad vteri inflammationes, exulcerationes, perfrictiones, strangulatus, auersiones, & inflationes vtimur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris, & gallicæ, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, fenogrecæ & similibus. Aperientes viles sunt, cum

purgationem suppressam prouocare volumus, aut con-
niuentem compressamque vuluam emendare : hique
ex melle, artemisia, dictamnio, brassica, dulcis radice
succo, ruta, & scammonia. Astringentium vltus con-
trarius, est aperientibus : nam fluorem muliebrem co-
hibent, & vterum suspensum contrahunt, & prolapsu-
sum reprimunt.

Pestilentia, febris pestilens, morbus pestilens, *Ποιμνία*,
idem significant, estque morbus non quidem patrius, sed
Epidemius, contagiosus, perniciosissimus, communis, &
communi causa natus. aduentitius, præsentissimi peri-
culi, vt qui maligna & venenata putredine, humores
vitales spiritus, & substantiam cordis labefactet. Pestem
itaque excitat aer tota sua substantia putris, & corrup-
tus: siue quod iis inclusus non diffletur siue à non huma-
tis cadaueribus, & qui exhalant uaporibus, & halitibus
putridis non discussis. An verò corporum celestium
aspectus infauti, & influxus pestilentem reddant aerem
dubitare malim, quam credere; præsertim cum Medico
sensus magis sequenti, aeris mutationes pro omni sint
Astrologia, ut ex Hipp. conicere licet, 3. aph. & initio
progn. & lib. de aqua, aere, & locis.

Petaloeides vrina, est, quæ habet hypostasim similem
squamis piscium, lib. de vrinis, cap. 27. *Πεταλωδὴς ὕρον* &
foliosa vrina, dicitur ea, in qua folius similia, siue squa-
mis aut laminis subsident : dicuntur autem *πέταλα*, in-
quit Actuarius, quæ & longitudinem & latitudinem ha-
bent, non etiam euidentem profunditatem. Eodem
etiam, ait ille, donata sunt nomine instrumenta quædã
ad oculos cõparata. Quin etiam lapis quidam *πεταλίτης*
dicitur quasi *εἰς πέταλα*, hoc est, in laminas solutus. Ex
quibus omnibus *τὴν πεταλωδὴν ὑπόσασιν*, siue quæ subsident
in vrinis, folius similia considerare oportet. Fit autem
cuius.

eiusmodi, vesica resoluta & crofa, vt testatur Galenus, com. aphor. 76. lib. 4.

Petia oculi, est sanguis fluens de aliqua arteria, vel vena oblæsa & sauciata, lib. de ocul. part. 4. cap. 7.

Phacos, faciei macula, est nigra, lentis similitudinem obtinens. Latini *lentiginem* & *lenticulam* vocant, φακός, *lens cruda*. Prouerbialiter, φαλὸν κόπην dicitur, qui operam ludit; φακὸς ὁ ἐπὶ τῷ τελευτάων, *lens palustris* apud Dioscoridem. Est etiam vas lenticularis formæ, dictum *lenticula*. Dicitur & de vale, in quo mortuorum cines conduntur: item nigra quædam oculi macula, Hesych.

Phagedenas Antiqui nominant vlcera maligna, quæ semper maiora & deteriora fiunt, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, resoluta; vel propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem partis latente in longo tempore contractam, ex influentibus humoribus, vel ob aliquam dispositionem ossis eo loco corrupti: sed nobis sufficiat, ex iis vlceribus prauis, alia nominare *Herpetes*, quæ summam cutem tantum infestant; alia, *phagedenas*, idest, *exedentes*. quæ carnem subiectam corrumpunt; nam quod *putridum*, atq; *depaescens*, a nonnullis *vlcus* vocatur non est *propria vlceris differentia*, sed *passio implicita, ex ulcere; atque putredine* 6. aph. 45. & lib. de aqua, aere, & loc. c. 2. Aliis, *phagedena* sunt illa vlcera, quæ partes vicinas continuo depascunt, non tamen eas putrefaciunt, febresque inferunt; quod si depastionem cum putrilagine sustinent partes, aliis *Noma* dicantur, idest, *depastiones*. 6. de comp. med. per gen. cap. 1. φαγεδῶνα Græcè.

Phalacroasis, φαλκροασίς, *caluitium*, seu *caluites*, pilorum capitis defluuium est, propter humoris alimentarii penuriam, non autem humorum vitio; nam tunc dice-

diceretur *Alopecia*, *Area*, vel *Ophiasis*, vide *Madarosis*. Deficit autem pilis alimentum propter siccitatem cerebri, quæ uel à senio est, vel maturius etiam accidit propter calidum & siccum hominis temperamentum. Fiunt autem calui homines à sincipite magis, cum senescunt, quoniam illud omnium capitis partium est siccissimum: hæret enim cutis illic ossi nudo. Ceterum, quamuis propriè *φαλαγγισ* de capite intelligatur, sunt tamē, qui ad mentum etiam pertinere dicant. At si rem diligentius consideremus, de mento impropriè *φαλαγγισ* dici videbitur, ex quo non nisi vitio humoris defluere pili solent, cum illa propter solam, ut Galenus ait, alieni penuriam eueniat.

Phalangosis, affectus est, quo pilorum subnascentiū, duplex, triplexve acies, in superiore, vel in inferiore palpebra, prouenit, lib. Introd. cap. 15. ex quo videtur Author Introductorij *phalangosin* confundere cum *Distichiasis*, quod falsum videtur, quoniam in hac noui pili, & non naturales succrescunt; in illa verò soli naturales pili sunt, qui inuersi negotium oculo facessunt, in qua cilium intrò spectat, pilorum acie simul cum eo inuersa, sic enim oculum compungunt; quibus duobus affectibus, commune genus est *Trichiasis*, id est, *molas oculis*, inuersis a pilis, proueniens; qui pili, si recenter exoriuntur, *Distichiasin* efficiunt; si natiui, & naturales, *phalangosin*, Paulus.

Phalanx, articulus uest, is maximè, quo magnus digitus, ossi Carpi propinquo, dearticulatur, 2. de viū part. cap. 9. Græcè, *σκιτάλιδες φαλαγγες*, vide *Digitus*. Sunt etiam qui *phalangis* nomine, Metacarpij ossa comprehendant, ordine etiam eodem velut in acie constituta, quo ossa digitorum; *φαλαγγες* autem agmen militum significat.

Pharmaceutica, medicinæ pars est, quæ medicamentis per os assumptis, affectibus p. n. medetur, 2. de composit. medic. per gen. cap. 2. altera, *Therapeutica* medicinæ pars est.

Pharmacia, purgatio, καὶ δαρσις, ἀν καὶ δαρσις, duplicem habet apud Hippocratem & Medicos, significationem: Primò enim significat, humorum, qui sua qualitate molestant, euacuationem, siue natura, siue arte factam per quamcunque regionem; E. gr. vomitum, sudorem, urinam, nares, tussim, aluum, vterum; secundò, solam vitiosi humoris euacuationem per aluum tantum, ope medicamento factam notat; prior significatio habetur, com. 4. in 6. de morb. vulg. posterior, in eo aphorismo, qui bene corpore habent, difficulter ferunt purgationes, & corpora sana cum purgantur, exoluantur. Φαρμακῶν vsurpatur sæpè ab Hipocrat. ἀπὶ τῆς καὶ δαρσις, quod est medicamento purgare.

Pharyngethron, apud Galenum nunc pro *pharynge* sumitur, nunc pro *osse hyoeide*, ceu potione maxima *pharyngis*, vide *Hyeides*.

Pharynx, duo significat, nimirum primùm fauces (id est, regionem intra os, vbi tùm gulæ, tùm asperæ arteriæ extrema concurrunt, siue medium illud spatium inter laryngem & gulam, & ipsam asperam arteriam, cuius summum *laryngem* vocant, verumtamen loci vicinia effecit, vt *pharyngis* nomine, nunc pro medio inter Laryngem & gulam spatio, nunc pro aspera arteria, nunc pro ipsius asperæ arteriæ summo capite, id est. Larynge, indifferenter sumatur; vt ex pluribus Galeni, & Hippoc:atis locis elicere est.

Phatnia, sunt ossa, dentes continentia, lib. de ossib. vel, vt alij, sunt alueoli, præsepiola, & cauitates, quibus per *δόντες* dentes inseruntur, quas Græci, ὀστέια vocant;

Dd

vnde

vnde videntur hæc duæ voces *φάρμα* & *βόθρα*, idem significare . Apud Rufum etiam *φαρμάς* legimus : Apud Poll. & *φαρμάς* & *φάρμας* .

Phaulon, simplicem & vulgarem victus rationem vocat Hippocrates; eam verò, quæ huic contraria est, *exquisitam*; inter utramque autem mediam, *hypophaulon*, idest, *subvulgarem*, nuncupavit, 1. de fract. 45.

Phimos, & *Phimosis*, vitium quoddam in masculis est, ut docet Celsus, lib. 7. cap. 25. in quo Colis glans, ita præputio contestata est, ut nudari non possit; huic contrarium malum, in quo propter cutem decurtatam, aut retrò abactam, glans tegi non potest, *periphimosis*, vel *paraphimosis* appellatur.

Phimosis est, cum cutis palpebrarum extrinsecus inflammatur eò usque, ut vicinæ regionis partes quoque occupentur, & palpebræ inuertantur; cum verò modica quidem in cute inflammatio est, at membrana, quæ intus ad Irim usque extenditur, valde abbreviata, tunc fit, ut intrò palpebra conuertatur: quod vitium, cum utrisque palpebris accidit, *phimosis*, hoc est, *Capsitratio*, nuncupatur, cum deducere eas æger, atque aperire oculum nequit. Idem morbus interdum in labiis oritur, & præputio, & ano, cuius causa ubique eadem est, 3. de iis, quæ in med. 32. Fit etiam cicatrice, quæ in meatibus concreuerit *φίμας*, aut carnis incremento, quæ una in parte redundans, cum opposita coaluerit. Nascitur in omnibus meatibus, & locis quæ natura duci possunt. Vide *paraphimosis*.

Phleborrhagia, *φλεβορραγία*, ἢ *ῥιγίς τ' φλεβῶν*, idest venarum ruptio, 4. acut. 86.

Phlebotomia, idest, venæ sectio, aut sanguinis per venæ sectionem emissio, 1. i. meth. 1. Remedium est in medicina, si quod aliud, nobile, valens non tantum ad demenda-

dam

dam plenitudinem, nimiamque sanguinis etiam optimi
copiam, sed etiam ad vitia eius tollenda . Nihil enim
æquè plenitudinem demit, siue ea simpliciter, & ad va-
sa dicatur, siue ad vires tantum; nihilque perinde vitia
sanguinis emendat, ac venæ sectio . De vitiosa autem
sanguinis dispositione aliquis fortè instare possit eam
non necessariam videri . Attamen Galen. secutus au-
thoritatem veterum Medicorum, eam adhibet, cum &
pituita, & flaua bilis, atque etiam atra in sanguine exu-
perant, si modò ætas & vires cum magnitudine morbi
consentiant . His ad hunc modum habentibus, non
dubitabis incipiente anasarca, siue leucophlegmatia,
sanguinem detrahere, neque ubi sanguis feruidior est, &
febrem committit, vel tertianam, vel continuam, neque
in elephante, febre quartana, & in omnibus lienosis
affectibus . Similiter in phlegmone, œdemate, erysipe-
late, & scirrho, vel simplicibus, vel complicatis, atque
inter se coniunctis . Quod tamen ita accipi debet, non
vt intelligamus humorem, qui manabit incisa vena,
esse vel omnino album, vel valde flauum, vel exquisitè
nigrum . Neque enim is sanguis esse potest, cum phlebo-
tomiam sanguinis detractionem esse dixerimus; hoc est,
eius humoris, qui modicè calidus sit atque rubicundus .
Quare cum præcipuè mittendi sanguinis indicationes
sint virium robur & magnitudo morbi (etenim sub vi-
rium robore, ætas compræhenditur) quanto hæ ma-
iores valentioresque fuerint, tantò maiorem vacuatio-
nem faciendam esse indicant: sicut è contrario euacua-
tionis quantitatem minuere oportet, in quantum hæ
fuerint minores . Secari autem vena debet, eaque va-
ria, siue vacuare, siue reuellere, siue deriuare volumus .
Hisce enim tribus de causis omnis vena secanda suscipi-
tur, quorum consilia habentur varia pro diuersitate,

locorum, à quibus sanguis fluxurus est.

Phlegma, Latinis *Pituita*, humor est frigidus & humidus, albi coloris, inspidus, qui tum in senibus, tum iis, qui ratione quavis sunt perfrigerati, plurimus acernatur, autumnò abundans; quem Prodicus *Blenam*, & *Mucum* vocat, 2. de natur. fac. c. 9. vide *Pituita*, *Graeco*, & *Coryza*.

Phlegmasia, φλεγμασία, significant, siue illas, quæ propriè phlegmonæ, idest, inflammationes, nominantur; siue etiam libeat febres vna complecti, secundum antiquam vocabuli acceptionem, 1. aphor. 7.

Phlegmone, est tumor p. n. in quo sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem procumbens, maiora eius vasa distendit, ab his ad minora procedit, à quibus exodat foras, in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, vt etiam omnia, quæ in carne habentur, loca inania occupet, 10. meth. 6. Solet Hippocrates *Phlegmonas* appellare omnes inflammationes, etsi tumore præter naturam careant; sed ipso posteriores, nomen phlegmones tumoribus præter naturam attribuunt, quæ cum inflammatione, & resistantia, & pulsatorio dolore consistunt, com. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Consueuerunt Antiqui in omni caliditate, nomine Phlogosis, idest, Inflammationis, & Phlegmonos, hoc est, inflammationis vti, 2. & lauc. 1. & 4. acut. 21. & 13. meth. cap. 1. φλεγμονή φλεγως Græce: Non omnes phlegmonæ pars exsunt. Earum enim aliæ non modò maiores minoresque sunt, sed aliquæ magis minusve exquisitæ. Sed exquisita quidem sinceraque est, quæ sit ex optimo sanguine & mediocris consistentiæ: non exquisita verò, quæ sit à sanguine, cui aliquis alius humor admistus sit. Illa φλεγμονή simpliciter dicitur, hæc non absolute, sed vel φλεγμονή ἐρυσιπυλαῖωδης, vel διδυμαῖωδης, vel σκιρτωδης. Cæ-

Cæterum, omnis phlegmone contrahitur a fluxione, vel manifesta causa, vel occulta etiam excitari. Manifesta quidem, vt cum offenso pede glandulæ inflammatur: Occulta verò, quando aliqua parte delegante, aut toto corpore transmittente, & affecta parte ob debilitatem recipiente, aut propter dolorem, vel calorem attrahente, sanguinis copia effluerit. Verum omnis phlegmone quæ lanescit, aut digeritur, aut concoquitur: si digeritur, ex toto curatur: si verò concoquitur, in abscessum transit, qui *abscessus* dicitur.

Phlegmone erysipelasosa, est tumor præter naturam, à sanguine & biliolo humore subortus, sed sanguine in prædominio peccante, bile in subdominio: e contra, *Erysipelas phlegmonosum*, in quo prædominatur bilis, sanguine in subdominio peccante, ita vt ab eo, quo in mittura exuperat, nomen ipsi tumori indatur, ac *phlegmone erysipelasosa*, vel *erysipellas phlegmonosum* vocetur: Vbi autem neutrum vincit, ibi vitium, phlegmones, erysipelatosque medium nominetur, 14. meth. cap. 2. vide *Inflammatiō*.

Phlegmone oculi; tumor est circa oculos, qui cum rubore & caliditate multa, & motu difficili, & punctioni, bus gignitur; lib. finit, vide *Inflammatiō*.

Phlogosis, idest inflammationis nomen, sæpè Hippocrates affert pro phlegmone, hoc est, inflammationis vocabulo singulari, 3. prognost. 71. vide *Inflammatiō & Phlegmone*.

Phlyctenam vocant propriissimè, vbi per exulcerationem, vel etiam sine hac, exterior Caratocidis tunicæ membrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humorem collegerit, aut sub tunicæ spatio, crassior humor currens, intumescenciam parit. Introd. c. 16. inde ad pustulas per corpus erumpentes, ob serolos humores ad

cutem translato, nomen transfertur, 2. prog. 70.

Phlyctides, φλυκτῖδες, sunt pustule, quæ in ardentissima febre in vigore & statu per caloris intensiorem, in ore generantur, lib. finit. vide *Febris pemphigodes*.

Phocatos, instrumenti genus est, quo in fracturis calvariae utimur, a lenticulae specie ita dictum, 6. meth. 6.

Phoenigmus, φαινίμωδς, rubrificatio, est ruboris per medicamenta, in aliqua corporis parte: excitatio; quædam enim medicamenta, eam vim habent, ut cuti admota, ruborem concitent, caloremque accendant, atque etiam si diutius immorentur, vesiculas excitent, tandemque exulcerent, ab Arabibus proinde *Vesicantia*, & *Vesicatoria* appellantur; ex quo patet ea vehementer calida, sicca, & acris esse oportere. Eiusmodi sunt sinapi, thapsia, fœnus caprarum, nasturtij semen, helenij radix, scilla, sinus columbibus, staphis, agria, cantharides, & reliqua id genus. Est autem præsidii genus à Veteribus usurpatum, maxime ad eas partium imbecillitates, quæ vel ex frigore, vel plurimo humore circa manifestum calorem accidunt. Quippe eiusmodi medicamenta omnia calefaciunt, desiccant, & cucurbitulae ritu humorem altius insidentem attrahunt.

Phoxos, est deprauata capitis figura, cum caput acuminato est vertice, & non ad oblongæ sphaeræ similitudinem, qualem secundum naturam humanum caput habet, formatum est, lib. de olsib. cap. 1. φοξοί proprie dicuntur, quibus capitis acumen admodum est fastigiatum, & vehementer turbinatum, atque adeo indecorum, qualem fuisse Therstem scribit Homerus. φοξὸς autem quasi ελοξὸς dici videtur ex flammæ similitudine, quæ in pyramidem fastigatur.

Phrenas, vide *Diaphragma*.

Phrenica vena, sunt duo propagines venarum, & trunco

trunco venæ cavæ superioris orientis, insertæ in Diaphragma, ipsumque totum nutriendes.

Phrenitis, eam affectionem appellant, in qua *Phrenas*, id est, mentem laesam, esse vident, 1. prorrh. 1. Est verò *Phrenitis* mentis alienatio, cum febre acuta, quando cerebrum propria, primariaque affectione laborat; si verò cerebrum per consensum afficiatur, dicitur *Delirium*, et *paraphrenitis*, 5. loc. affect. 4. Est autem affectio hæc, inflammatio in meningibus; & in ipsum etiam cerebrum aliquando pervadens, adeoque perpetuum cum acuta febre *delirium* efficiens, 1. prorrh. 1. Quod si febrem a liundam non habeat, tunc non *phrenitis*, sed vel *Delirium*, vel *mania*, appellatur; si verò perpetuum non sit *delirium*, tunc haudquaquam *phrenitis* dici debet, sed vel *paraphrenitis*, vel *paraphrosyne*, ut quæ tum a ventriculo, tum a diaphragmate, tum in summo febris vigore, excitatur; ac declinante paroxysmo, spontè cessat mentis alienatio, com. 3. in 3. de morb. vulg. 45. unde omnia signa, quæ eam, vel efficiunt, vel significant, dicuntur *phrenitica*, com. 1. in 1. prorrh. 4.

Phtharticum, vide *Deleterium*.

Phthiriasis, est scabies, circa palpebrarum radices, quæ squamas furfuri similes dimittit, lib. finit. vocaturque; *morbus pedicularis*, cuius generatio quibusdam contingit in capite accrevit, ex multis videlicet humoribus viscidis, & calidis quidem, sed non ad talem tantamque caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres *Ichores*, id est, sanies, 1. loc. aff. 7. *phthiriasis*, & toti corpori, & singulis partibus accidere potest. Gignuntur verò pediculi non in superficie cutis, ut furfures, sed in eius profundo, i. leoque medicamentis indigent valde exsiccantibus, & quæ ex alto trahere possunt.

Phthisicus, Græcè *phthisis*, is dicitur, vel qui *Phthisi*

correptus est, & contabuit; vel quavis ex causa macilentus evaserit; vel qui ad phthisim natura proclivis est, angusto scilicet adstrictoque existens thorace, collo oblongo, cui insuper à tergo, operata scoptula instar alarum prominent, (vnde *πτερυγώδης*, hoc est, *alatus*, nominatur) tandem cui caput imbecillum est, organaque respiratoria facile omnem eius fluxionem recipiunt, comm. 2. in 1. de morb. vulg. 13. Nam si hæc duo simul coeant, thoracis figura, & capitis imbecillitas, eiusmodi natura tibi valdè obnoxia est.

Phthisis, quæ *Tabes* Latinis dicitur, si communiter sumatur, est diminutio, & colliquatio corporis: *Tabes* verò propriè est a pulmonis ulceratione, thoracis item fauciumque oblæsione, quam proin tussicula & lentæ comitantur febres, & corporis consumptio. *Phthoe*, proprio vocabulo dicta, est consumptio ex ulcere, lib. finit *φθίσις* Græcè, & *φθίς*. *φθίσις* Athenienses nominat, ob pulmonis ulcera insanabilia, totius corporis cum parua febre factam extenuationem, eandemque Hipp. vocavit *Phthisim*, 7 aphor. 16. atque ideo aliquando Gal. sanguinis sputum vocat *Phthoen*, 5. meth. 15. eandem vocat *Tabem*, 1. aph. 12.

Phthisis oculi, vide *Tabes oculi*.

Phthoe, vide *Phthisis*.

Phthoria, *φθόρια*, idest medicamenta, quæ valent ad eliciendos foetus, viuos vel mortuos: alio nomine *Echolia* appellantur, ἀπὸ τῆ ἐκβάλλειν, hoc est, ab eijciendo.

Phthoropœum, *φθοροποιον*, vide *Deleterium*.

Phygethlon, inflammatio est adenum, quæ in inguinibus & alis sunt, calore scilicet & celeritate generationis, ab aliis tuberculis distincta, lib. de tumoribus, cap. 15 *phygethlon*, est erysipelas inflammationis pariceps, 2. Glauc.

Glauc. 1. Figura sua illi pano similis, quo textores vtuntur; atque ideo *panus* & *panis* dicitur. Dolor distentioque vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris; interdum etiam febricula: idque tardè maturefcit, neque magnoperè in pus conuertitur. Ex Celsi verbis. lib. quinto, cap. 25. apparet, *φύγεθλον* esse *Phlegmonem erysipelatodem*, vel *Erysipelas phlegmonodes*. Quodd enim hic tumor multæ bilis sit particeps, ideò non altè affurgit, neque in profundum valdè subit, sed erysipelatis modo latior est. Occupat tamen & subiectæ carnis aliquid, quod aliqua ex parte phlegmone sit. *φυμῶνα* autem verior phlegmone est, magisque exquisita, proindeque facilius in pus conuertitur, præterea tanto minus doloris adfert, minusque calidum (nisi dum suppurat) sentitur, quantò bilis flaua sanguilue, biliosus sincero sanguine plus doloris mouet, calidiorque est. Differt autem *φύγεθλον* à Bubone, authore Galeno, quod Bubo phlegmone sit: *φύγεθλον* verò, vt dictum est, sit *φλεγμονώδες ἐρυσιπέλας*, ἢ ἐρησιπεκάλωδης φλεγμονὴ τῆ ἀδινῆς.

Phyma, est phlegmone glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit) citra vlceris occasionem accidens, 13. meth. c. 5. quæ statim augetur, atque ad suppurationem venit, 2. ad Glauc. 1. vide *Tuberculum*, & *Furunculus*.

Physema, *φύσιμα*, est resinæ species, quam & *pyinam* & *piceam* nominant, expers pinguitudinis, admodum exsiccans, 7. de comp. med. loc. cap. 3.

Physiognomica signa sunt, quæ hominum vultui & faciei impressa rei naturam indicant, lib. quod animi mor. cap. 6.

Physiologia, siue *naturalis* scientia, 1. de elem. medicinæ pars prima est, quæ & *Physiologica* appellatur, nomine sumpto à materia, quæ cognitioni Medicorum

subiecta

subiecta est, ipfissimaque est corporis humani natura., lib. de part. art. med. cap. 6 φυσιολογικὴ quippe naturam hominis vniuersam a conceptu ad extremum vsque lenium disquirit. Ad eam pertinet omnis de semine, deq; menstruo sanguine, de partium conformatione, & principatu, de foetus perfectione, similitudine cum parentibus, de anatomia singularum partium, earumque differentijs, & temperamentis, de ætatibus, de calore nativo, & spiritibus, de tribus facultatibus nostrum corpus dispensantibus, de humoribus, aquis, aere, locis, consuetudine, & cæteris id genus disputatio. In qua communibus quidem naturalis scientiæ principiis, atque theorematibus vtitur, sed quatenus hominis cognitioni inferuire, atque accommodari possunt. Eam quidem Medicinæ partem, Empirici atque Methodici aspernati sunt, sed Dogmatici, quorum Princeps fuit Hippocrat. plurimi fecere.

Physis, apud Hippocratem, nunc naturam, nunc temperamentum significat. 2. acut 31. Vocatur adhuc *Physis*, flatus, aut flatuosus siue halituosus spiritus, succis quibusdam pituitosis, in ventre, a deficiente calore in halitum solutis. qui, cum per eos excernitur, ructum creat; cum per sedem, sonorum silentemue flatum; cum verò neutra parte emittitur, symptoma creatur quod *empneumatosis*, hoc est, *Inflatio*, vocatur, ventre scilicet impotente ad excrementosum, nebulosumque excernendum spiritum; qui retentus propter magnam spiritus vim, & intestinorum latitudinem, grauiter sonat, & murmur, quod Græci *Borgorygmon* vocant, causatur, 3. de sympt. caus. cap. 2. vide *Clydones*.

Pia & *dura mater*, vide *Membrana dura*.

Pica, vide *Picatio*, & *Cittosa*.

Picatio, auxilium medicum est, quo partium corporis pilos

pilos excindimus, tūm maxime, cūm quidam nouaculę
præsidium formident, præsertim in gutture, insque
abrasis pharinacum aliquod applicamus, 1. de compof.
med. loc. cap. 5. Aliqui verò *picationem*, & *picam*, signi-
care inquit, symptoma deprauatę, vitioleque appe-
tentię, cūm stomachus vitiosus, & a natura alienos ci-
bos concupiscit præter morem: quo malo mulieres gra-
uidę infestantur, ad secundum, vel tertium vsque men-
sem, quarto namque fere eo liberentur: quod malum &
Citta & *Cittosa passio*, ab aue, quę *Pica* dicitur, denomi-
natur. Vide *Cittosa*.

Picea, vide *Physema*.

Picra simpliciter, siue *Hiera picra*, est i. lem ac medi-
camentum ex aloe, 4. loc. affect. 2. quod sui amaritudine
inorbos & humores expellit, de Dynam. in proœmio.
Eadem & *Amara* simpliciter appellatur, de cur. rat.
per sanguin. cap. 18. Sunt multę & *ἑρῶν* differentię quę
tamen ad duos omnes referuntur, videlicet *εἰς τὴν δι-
αίτην*, *εἰς τὴν διὰ κοροκυνθίδος*. Sunt autem ambarum ef-
fectus varij: illa maxime ventriculo, hæc capiti, & etiam
vniuerso corpori purgando conuenit: quanquam & sin-
gulę alijs etiam vñbus priuatim inferuiant.

Picrocholus homo, idest, amara bile abundans, 2.
acut. 29. *Πικρόχολοι* dicuntur ab Hippocrate, qui amaro
humore, quauis cit flaua bilis, abundant, quasi amarę
bilis homines. Colligitur autem humor ille aliquando
toto corpore, aliquando superiore corporis parte, vt
Paulo Rhetori, vt Galenus narrat: quandoque vero in-
feriore, vt Eudemo Philosopho. Itaque pro locorum, in
quibus ille regurgitat varietate, *πικρόχολοι τὴν ὅλην ἔξιν, ἢ
τὰ κάτω*, hoc est, Pericholi toto habitu, aut supernis
partibus, aut inferioribus, ab Hipp appellantur.

Pinguedo, est effusi alimenti, circa membranas ma-
ximę

ximè facta concretio, sensus carens, libi. finit. Vide *Adeps*.

Pinna, seu *Pinnula*, sunt alæ narium, lib. finit. vide *Alanarium*.

Pituita, est omnis frigidus & humidus natura humor, qui & *Phlegma* dicitur, 8. de placit. cap. 9. quatuorque principium humorum unus est, omnis qualitatis & saporis expertus, nonnunquam uerò & dulcis particeps sit qualitatis, lib. de atra bile, cap. 2. *Scindapson* Galenus iocandi gratia, nunc *pituitam*, 8. de placit. cap. 9. nunc *Cerebrum* nominat, 8. de placit. cap. 4.

Pithyina, Vide *Physema*.

Pityriasis, & *Pityra*, Vide *Furfuratio*.

Pityroides urena, quæ habet hypostasim similem, futuri, id est, furfuraceam hypostasim, lib. de urinis, cap. 28. *Πιτυρώδης*, *ὕψος*, fit à uehementi calore febrili, supra modum colliquante, vrente, & resiccante solidas partes.

Pladarotes *πλαδαρότης*, sicut mollia ueluti corpora uetusta, & maximè decolora, palpebrarum parte interna, nondum aspredinem habentia, lib. Intr. c. 15.

Plados, omnis humiditas redundans, & excrementitia dicitur; siue tenuis ea sit, siue in modum puris crassa, 3. de fract. nam & *πλαδαρὰ ἔλκη* ea ratione ab Hippocrate dicuntur, & *πλαδῶντα* simpliciter, quæ humida sunt. Quoniam uerò quæcunque superfluo humore madent. infirma ut plurimum sunt, & laxa, factum est, ut *πλάδω* etiam *τὴν ἀτονίαν* significet, ut notat Galenus.

Plagula, quæ & *Splenia* dicuntur, à splenis forma, firmamenta sunt quæ stabiliant deligationem; luxato enim, fracto, uel comminuto ossi fasciæ imponuntur, quæ confirmatum ac repositum os continent, pro-

prohibentque ab affecta parte inflammationem, præsentem humorem repellendo, & aduenienti obstitendo, quæ *fasciæ*, & *subfasciationes*, & *subligamina* appellantur; supra has, ne dimoueantur, ac diuertant, plagulæ imponuntur, cerato aliquo imbutæ, quarum duplex est usus, unus, ut subligamina contineant; alter, ut ea membra circum expleant, quæ in acutum delinunt; Plagulis tertio aliæ fasciæ, quas *superligamina* nominant, induntur, quibus ferulæ superponuntur, quæ totam deligationem firment, ac stabiliant, 3. de iis quæ in medic. 11.

Planities, Vide *Pedion*.

Planta, Vide *Pedion*.

Planum, Vide *Pedion*.

Platysma, hoc est, *latius linteum*, quod ulceribus extrinsecus superadditur, 4. de compos. medic. per gen. 14. *platysma* autem *myodes*, est dilatatio muscu ossa, siue latus ille musculus, qui cuti subnascens, buccam, sine maxilla. mouet, lib. de neruor. dissect. cap. 9. Vide *Latissimus musculus*.

Plestrum, Vide *pharynx*, & *Isthmus*.

Plenitudo, Vide *Multitudo*.

Plenus pulsus, qui arteriam pleniorē tactui exhibet, & humidam, 1. de diff. puls. cap. 5.

Plethora est, ubi æqualiter inter se omnes succi sunt adaucti; *πληθώρα* Græci uocant, nos, *plenitudinem*, & *succorum redundantiam* diximus; ubi uero uel flauabile, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus, refertū iam corpus fuerit, cum habitum *Cacoehymiam*, quasi succorum uitium dicas, non autem *Plethoram* uocant, 3. meth. c. 6. & 13. meth. c. 4. Vide *Multitudo*.

Pleuritis, quæ & *pleuresis* dicitur, & *morbus lateralis* est inflammatio illius membranæ, quæ costas inus sub-

cin.

cingit, 6.aphor.33. Quæ membrana (mutato à costis nomine, quæ *pleura* dicuntur) etiam *pleura* vulgò dicitur. *Exquisita* verò *pleuritis* fit, vbi subcingens membrana costas, primario affectu laborat; & dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia peruenit; ad iugulum quidem superioribus eius partibus affectis; ad præcordia verò, vbi inferiores afficiuntur: vehemens quoque febris hæc inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta, & parum distat à corde, & cum ipsius involucro, ac septo transuerso, cognationem habet, 5. de loc.aff. 3. lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus, *Sofai*, *Birsen*, & *pleuresis*, Græcis, *πλευρίτις* appellatur. *Non exquisita* verò, *Pleuritis* est, in qua dolor externus est, qui contactu loco mouetur, & exacerbatur, vel quod sine febre, vel sine spūto, vel sine tussī, vel sine spirandi difficultate sit; vel quod neque tensionem, neque duritiem vllam pulsus habet, quæ tamen singula exquisitam efficiunt pleuritidem. *Pleuritidem* verò, *incoctam* appellant, quæ vel celeriter hominem iugulat, vel non nisi longo tempore finitur, 5. loc. affect. cap. 2. Omnis in genere inflammationum est, totque propterea recipit differentias, quot habet ipsa phlegmone, sumptas à materiæ, vnde gignitur, varietate. Alia enim verè simpliciterq; phlegmone est, quæ scilicet nascitur ex fluxione sanguinis calidi & copiosi: alia verò non simpliciter, sed vel cedematodes, vel erysipelatodes, vel scirrododes, prout sanguini pituita aut bilis flaua aut atra mista fuerit. Non tamen vt phlegmone, sic etiam pleuritis ab humoris specie, vera aut non vera dicitur, sed quod ipsum præ se fert nomen, ab ipsa parte affecta.

Plexus choroides, vide *Choroideas plexus*.

Plexus retiformis, seu *reticularis*, est inuolucrum ex multis arteriis complicatis, sub dura meninge collocatum,

um, ad retardandum spiritum animale, ne statim
fluat; vbi enim natura voluit diutius morari materias,
vbi transitum ipsum difficilem molita est; quemadmo-
dum in ventriculo quidem Pylorus, in intestinis, inuo-
lucra, anfractus, & gyri, & ante testiculos arteriæ &
venæ multipliciter inuoluuntur; non secus in capite,
sub dura meninge plexus arteriarum *retiformis*, & *reti-
cularis* & *Chorooides* dictus, 4. de vsu part. c. 13. & 9. de
vsu part. cap. 7. quem vulgò *rete mirabile* appellant; vi-
de *Glandulosi assistentes*.

Plexus variciformis, vide *Flexus variciformis*.

Plichada, idest, *gressuram*, totum id, quod inter ingui-
na vtriusque cruris est, solet Hipp. appellare, de artic.
45. *πλῆχας* Gale. etiam inquit, apud Hipp. dicitur, quod
inter vtrumque crus spatium est. Nam & *ἐκ πλῆχας*,
& *διαπε-πλῆχας*, *dinariari* significat, dicunturque ea
verba de cruribus gressum facientibus, atque inter se
distantibus; ipsaque crurum diductio digressioque
πλῆχας, sicut & ipse gressus *πλῆχας* à Græcis nuncupa-
tur. Sunt autem ut scribit Galenus, qui *πλῆχας* per γ
quidam etiam *πλῆχας*.

Pneumatis, & *Pneumatodes*, vocat Hippocrates an-
helosos: qui densum spiritum siue tr. b. am. & densam
respirationem habent, 3. de difficult. respir. cap. 12. *pneu-
matodes* vocat insuper Hippocrates eos, qui ventrem
inflatum habent. ibidem. Vocatur Græcè *πνέματιαι*,
πνέματιάρμοι, *πνέματιώδες*, & *πνέματιώδεις*, tunc an-
helosi, tum inflati. Vtrumque enim licet, inquit Galen.
lib. 5. de dysp. tum ipsum difficultate spirandi laborare,
ob hypochondriorum affectus, tum et etiam ventrem
flatibus distendi.

Pneumaticas, idest, *spiritalis*, qui omnia spiritibus
attribuunt, lib. Introd. cap. nono, vel qui spiritibus agit,
3. de

3. de different. puls. capit. 6. Πνδματικοὶ dicti sunt Medici quidam, qui à flatu seu spiritu in corpore subeunte, omnia vel secundum naturam se habere, vel in morbos incidere censebant. Forte Hippoc. aut quisquis author fuit de flatibus libelli, huic sectæ occasionem præbuit, cui se inter Medicos, Athenæus & Archigenes in primis adduxerunt.

Πνδματικήη, *ramex ventosus*. Is genere, vt Paulus ait, ἀνδροισμα est, ut qui dilatatione fiat à flatulento spiritu. Verum duobus modis accidit, vel ex quatuor vasis testiculum alentibus, qui durior est, nec compressu digitorum euanescit, sed recipere curationem potest: vel ab arteriis darton membranam intercurrentibus, qui appresso digito intrò recurrit & euauescit: curationem vero non recipit, propter periculum, quod ab incessabili sanguinis profluuio impendat.

Pneumophalon, Umbilici est dilatatio, à flatuoso spiritu, lib. finit. Πνδμαπύφαλλον, cui umbilicus à flatu protuberat: species est τῶ ἐξομφάλων.

Pnigalion morbus Incubus Latinis dictus, alio nomine Ephialtos, vide Ephialtes. Πνιγάλιον dicitur ἀπὸ τῆ πνίγιδος, quod co laborantes prope suffocari videantur. Reperitur, & πνιγίμων pro eodem.

Podagra, est Arthritis pedum; ut enim Arthritis uniuersi corporis & articulorum omnium, morbus est, ita si solum pedum fit passio, ab affecta parte, Podagra, si manuum, Chiragra nuncupatur, uide Arthritis.

Pollex, est breuior & maior digitus manus, quem Anticheira & Promanum vocant, lib. de ossib. cap. 22. Vide Digni.

Polycresta medicamenta sunt, quæ multis affectibus conueniunt: quæ contrariis medicamentis constant; etiam iuxta secundas qualitates ac vires, non tantum priuas,

primas, 5. de comp. med. per gen. cap. 1. aliter enim vni tantum simplicique affectioni, non etiam multis, atque inter se etiam sepe contrarijs prodesse. Coegit autem Medicos necessitas contraria aliquando medicamenta miscere, non modò vt vnum alterius vires frangeret, atque minueret, sed quod conducibilis esse iudicarent, habere vnum aliquod medicamentum permultis affectionibus conueniens, quam tam multa singulis affectionibus destinata, etiam ea *παλυστικα* in medicina longè præstent. Sic enim vno eodemque medicamento epel-luntur & digeruntur, detergentur & læuigantur, in-crassantur & attenuantur humores, quod diuersas in se facultates contineat. Eius generis est Panacea, Ixis, Icesium, aliaque plurime emplastra, de quibus agit Gal. Et si in simplicibus quidem medicamentis, vt Aloe, Rheo barbarico, Mastiche, & aliis sexcentis ea vis inesse cernitur, vt contrarios simul effectus in hominum corporibus producant, nemo mirari debet in compositis contrariorum pariter inesse facultatem.

Polycronius morbus, qui longo tempore durat, & etiam *Chronius* dicitur, cui opponitur *Brachichronius*, qui breui tempore finitur, 3. di. de cr. cap. 13.

Polymorphum, vide *Sphenosis*.

Polypus, *παλύψ*, tumor est præter naturam, in nari-bus genitis, polypodis carni assimilis, iuxta substantiæ proprietatem, 3. de compos. medic. loc. cap. 3. Proprietatem substantiæ intelligo, non colorem modò & consistentiam, sed reliqua etiam quæ sunt *Polypis* propria, quibus tumorem hunc similem esse, Veteres prodiderunt, nempe quod multas radices, ut & ille pedes habeat, quodque ut ille venantes ulciscitur, acetabulis suis manus eorum apprehendens, ita & vitium hoc laborantium nares obstruat, ut & difficulter spirent, & ægrè

Ee

loqui

loqui possint. Hæc enim substantiæ *Polypi* proprietatem consequuntur, non minus, quam color atque consistencia: Ac color quidem varius est, aliis albidus, aliis subfauus, aliis subruber: Substantia pariter aliis mollis, & quodammodo fluida, aliis durior, magisque contracta. Celsus lib. 5. cap. 8. graphicè *Polypum* depinxit his verbis: *Polypus in naribus, est caruncula modo alba, modo labruba, quæ narium ossi inhaeret, & modo ad labra pendens, narem implet; modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces, descendit, adeò increscit, ut postquam conspici possit, strangulatque hominem, maxime Austro vel Euro stante, fereque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fere capax videtur est; itaque attingi non debet: His quidem verbis, Celsus omnes Polyporum differentias complexus est: Quarum quinque asserit species Hippocr. lib. 1. περὶ πνέοντος.*

Pompholyx, Bulla, est eleuatio in humore facta à flatu oispiritu, quo intra humorem concluso bulla excitari solet; præsertim si humor tenax, viscosusque est, & calor in illum agat debilis; tunc enim bulla permanset, nec facile soluitur; quales sæpè in vrinis visuntur, renalem & longum morbum significantes, Est autem *Pompholyx* metallicum medicamentum, quod in coctura æris sursum fertur, & in cameris parietibusque fornacum bullarum modo tumens colligitur. Nihil enim aliud est quam æris fauilla. Effertur autem vel ex ære solo, vel ex cadmia sola, vel ex ære, & cadmia, quod eam aliquando friatam metallici inspergant æri. Primum autem in bullas, ut aqua, tumet, atque ex eo nomen accipit: mox maiore accedente incremento, lanarum assimilatur Peniculis: atque ita quidem sua sponte gignitur in fornacibus. Rara nunc est *Pompholyx*, & pene ignota,

ta, vt & pleraque alia recrementa metallorum. Sunt tamen qui in Officiis eam *Nil album* appellent, vt & *Spodium* (sic dictum à cineris similitudine, quod æor-
sum fertur] *Nil nigrum*, aut *Grysenm*. Inter ἀδυσκτα φάρ-
μακα numeratur πομπόλυξ: adstringit & siccatur lenissi-
me, præsertim lota, habetque tenuitatem partium,
citra calorem.

Ponos, nunc laborem propriè dictum, nunc dolorem,
seu malam affectionem, qua in acutis morbis, ægri malè
tractantur, significat, 2. acut. 46. Πόνος est motus om-
nis vehementior, idem omnino cum exercitatione ge-
neraliter dicta. Quoniam autem ex immodico labore,
plerumque lassitudo dolorque oritur, factum est, vt
πόνος non modò vehementem motum, sed dolorem etiam
significet, & quicquid hominem offendit. Sed cum in
omni dolore duo esse oporteat, affectum à naturali con-
stitutione alienum, & eius affectionis sensum, Hippo-
crates utrumque πόνον appellauit. Nam cum scribit do-
lorem fieri propter calidum, frigidum, plus vel minus,
ipsum alterationis sensum sine dubio intelligit. Vt au-
tem πόνος apud Græcos, sic apud Latinos labor acci-
piunt, vt ex Cicerone vide. e. licet; qui laborem definiuit
esse functionem quandam vel animi, vel corporis gra-
uioris operis & muneris: & ex Virgilio, qui parienti
dolorem Lucinæ labores appellat.

Poples, siue *Ancyle*, est articulus ille, quo os magnum
femoris articulatur ossi tibiæ; in quo pars exterior genu
dicitur; interna verò, qua crus flectitur, dicitur *ῥοπλες*,
vel *Ancyle*, lib. Introd. cap. 10.

Procele, est ramex callolus, siue tophus in testiculo,
aut in membrana *Erytroide* concrelescens, insignis, re-
nitens, durus, & inæqualis. His notis ab *Hydrocele*,
& *Sarcole*, distinguit, lib. finit.

Poromcephalon, , est concretio Tophi in j Vmbilico, lib. finit.

Poropæia, est exiguorum meatuum apertio, 4. method 4.

Perracea bilis, vide *Bilis pallida*.

Porrigo, idest, *Furfuratio*, vide *Furfuratio*.

Porta vena, vide *Cana vena*.

Porta hepatis, πύλου ηπατος, sunt pars sima hepatis, in qua radicata est ea vena magna, quam vocant venam portam, vel venam portæ, qua est ingressus chyli in jecur, sicut ex gibba sanguinis est egressus.

Porta ventriculi, est inferius ventriculi oriñcium, quod πυλωρος Græcis, Latinis *Ianitor* dicitur, 3. loc. aff. 7. vide *Pyloros*.

Portonarium, est primum intestinorum, quod *Duodenum* appellatur, libr. de anatom. viii. vide *Dodecadactylon*.

Porus, est in specie opticus nervus mollis, ex prima coniugatione nervorum, à cerebro ad oculos perti- nens, quippè qui solus manifestum habet foramen, unde & *visificus* & *meatus* absolute dicitur, 4. loc. aff. 2. *Porus* deinde dicitur exiguus omnis corporeæ molis meatus, 1. sanit. tuend. c. 12. per quem aliquid influit vel effluit, siue id spiritus sit, siue aer, siue humor, siue excrementum. Ad hæc *meatus*, tùm per quos cibus vel in ventriculū subit, vel ab eo exit; tùm quibus chylus in jecur effunditur, aut bilis in suam vesiculam ingreditur, vel ex ea effunditur, πόροι appellantur: præterea & exigua illa foramina per totam dispersa cutim, quæ corporis vniuersi perspirationem moliantur. Sunt autem in vniuersum duo pororum genera: alij sensibiles, alii insensibiles habentur. Illi magni, & patentes sunt, quales in ventre, iecinore, liene, intestinis, venis, arte-

riis,

is, & reliquis eiusmodi instrumentis visuntur; ei verò carui & visum fugientes, non solam quidem partium superficiem occupantes, sed per totam etiam carnis osseum, cartilagineum, nervorum, ligamentorum, membranarum, & cutis substantiam disseminati. Neque enim externi modo sunt, & superficiales, sed etiam interni. Siquidem his plenum est totum corpus, & tota cutis; aliter putredo vitari nullo modo posset. His enim foraminibus totius corporis perspiratio fit, quæ constat ex frigidi aeris intromissione, & fuliginosorum, quæ in singulis partibus colliguntur, excrementorum evacuatione. Ex quibus perspicuum est, meatus omnes in optima corporis constitutione patentes esse semper oportere. Quod ut plurimum valet ad tuendam sanitatem, sic eorum obstructio maximorum morborum occasionem præbet. Atqui & *Porus* Tophum significat, tum qui in arthriticis, tum qui in calculosis generatur; cum enim humor crudus lentorem assumpsit, & transitus per renes in quibusdam naturis sunt angusti, id, quod crassissimum est, & maximè lentum, diutius moratur, & tophum gignit. 1. de alim. facult. cap. 5. *Porus* denique & *Callum* significat, ad quem gignendum cogi, concre-scereque aliquid proprii ossium alimenti oportet, id quod in fracturis ossium cum primis accidit, 6. meth. c. 5. vide *Meatus*, & *Oncos*.

Post-apparentia, vide *Affidentia*.

Post brachiale, vide *Brachiale*.

Posterior cerebrum, vide *Cerebellum*.

Posthia, siue *Crishe* dicitur, cum parte interna etiam iuxta coronam palpebrarum, suppuratum tuberculum oblongum, figura hordeo simile sit, unde appellatum est. Fiunt & alia quoque maiora in mediis palpebris eodem dicta nomine, lib. Introd. c. 15. vide *Crishe*.

Præcedentes causa, vide *Antegressa*, & *Febres putridæ*.

Præcognitio, *πρόγνωσις*, prænotio est futuri decursus, & euentus morbi, ut etiam futuri symptomatis eius, quod necessarium habet generationem, non autem omnium, quæ circa ægrotos eueniunt, accidentium; modò nihil, aut ab ægro, aut ab assidentibus fuerit commissum, quod morbi naturam dissoluat, & cogat naturam in aliud tempus differre morbi solutionem. Verbi gratia, prædicat medicus septimo die, si omnia ut oportet, agantur, solum iri morbum. Vbi verò quicquam admissum est, si paruius quidem error hic sit, relabi solutionem ex septimo in nonum posse: si maior, in undecimum: Si multò maior, in quartumdecimum: si perquam magnus, periculum pro certa salute secuturum: Hæc quidem ad morbum attinent. Nec verò de symptomatibus aliter sentiendum est, sed necessarijs & magna ex parte morbum comitantibus. Tumultus enim, ex vicinis per noctem & canes latrantes, & iniocundi quidam nuncij, insomnes ægrotos reddunt; quorum nullum neque generationem habet necessariam, neque firmam deriuationem. Quare eorum tantum, uti dictum est, *πρόγνωσις*, quæ generationem habent necessariam, ut tussis & doloris lateris in pleuritide, capitis doloris in febre, tumoris & ruboris in phlegmone.

Præcordia, alias *Phrenas*, Veteres, *Diaphragma*, & *transuersum septum* appellarunt; infra verò hæc præcordia, tum venter, & intestina, tum jecur ipsum sita sunt, 8. de placit. cap. 9.

Pregmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbentia, parte posteriori os occipitis, anteriori verò os frontis, vtriusque ab ossibus temporum, lienis fuerunt distincta, quæ & *Bregmatis ossa* appellantur, 12. de

usu part. cap. 20. vide *Bregma*.

Praecipientes causa, vide *Antegressa*.

Præputium, cutis est, quæ glandem pudendi vestit, 5. method. 15. vide *Glans*.

Præsepiola, vide *Phattnia*.

Præter naturam, vide *secundum naturam*.

Prætextus, manifestissimas causas, & verissimas, vocavit Hip. cum tamen in usu sit, vel falsæ causæ, prætextus appellentur, 2. le fract. 62. quin & prætextus aliquando non falsas causas, sed veras dicit, 3. de fract. 46.

Priapismus, (qui & *Tentigo*) est augmento pudendi stabilis in longitudinem, ac orbem tumefacti, citra rei venereæ appetentia, 9. de comp. medic. loc. cap. 9. a flatuoso spiritu, 15. method. 7. nullo præsentē stimulo ad libidinem, aut desiderio coitus; ut quibusdam accidere consuevit, qui lupini decumbunt, ducta denominatione a *Priapo*; nam hunc, ut cui suapte natura huiusmodi Coles esset, ita finxerunt, atque pictura descripserunt homines, 6. loc. affe. 6. Addit Aetius, dolores inde moveri, quales esse in tetano solent, quod inflatum distentumque; pudendum convulsionis modo afficiatur. Scribit etiam, eos qui sic laborant, citò perire ventres inflatos, & frigidum sudantes, nisi illico auxilium ei adferatur. Accedit etiam his quandoque inflammatio. Fit hic morbus a flatu vaporoso, ab humoribus viscosis crassisque; sublato, & cauernosum penis nervum distendente. Aliquando verò ipsis etiam arteriis eo flatu repletis oritur, nullo præcipuo proprioque affectu colem infestante: quem affectum etiam *satyriasim*, & *satyriasimum* Græci vocant, quod Satyri arrigere semper crediti sint, de tumor. cap. 14.

Prima corpora, vide *Homiomeres*.

Prima vena, (quæ & magna vasa appellantur, & vasa

forum radices, 5. method. 3.) sunt, quæ circa iecur, & mesenterium, & cor visenda sese præbent, 12. meth. cap. 3. vide *Radicem vasis*.

Primaria particula, vide *Similare*.

Primarius affectus, vide *Idiopathia*.

Primitiva causa, vide *Antegressa*.

Princeps intestinum, vide *Rectum*.

Principium morbi triplex dicitur; primum quidem de primo insultu, qui simplex est, & latitudine caret; secundò, de eo, quod ad tertium extenditur diem; & præter hæc etiam id, quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quo manifestæ coctionis signa desiderantur, 1. de cris. cap. 8. & 19.

Proboſcis, siue *Pronomaa*, est pars quædam pendens angusta, & longa in Elephante animali (quo loco aliis est nasus) adeò ut ad terram pertingat, 16. de usu p. 14.

Procatastica causa, vide *Antegressa*.

Processus ancoralis, vide *Ancyroides*.

Processus canicularis, vide *Ancyroides*.

Procidencia oculi est, cum ab ictu aliquo violento, aut strangulatione, cum febre continua, vel capitis dolore, prolapsus oculus fuerit, lib. finit.

Procondyli dicuntur, primi digitorum articuli, metacarpio proximi, perinde ut medii digitorum articuli; *condyli*, extremi verò, *metacondyli*, annuncupantur.

Productio, vide *Dodecadaetylon*.

Proegumena, causa interna est, quam antecedentem solent nominare: Celsus vocat *abditam*, in occulto positam, & morbi continentem causam, quanquam talis in specie dicitur, *causa morbi coniuncta*, qua posita, ponitur; sublata, tollitur morbus.

Prognostica signa nuncupantur, quæ futura præ-nunciant; *Diagnosticæ*, quæ præsentia declarant; *Indicatoriæ*,

ratoria, quæ instantem crisin, & curationem indicant
lib. de optim. sec. emp. cap. 5.

Prolapsiones, id est, ossium absolutas; & integras alterationes, siue de articulationes. *Dimotiones non integras* appellat Hipp. 3. de fract. § 1. & 2. de fract. 36.

Prolepticus morbus, vide *Anticipans*, & *Cinnumens*.

Promanus, vide *Digiti*, & *Pollex*.

Pronervationes, vide *Tendones*, & *Aponeuroses*.

Pronomæ, vide *Probofcis*.

Prophasis, vide *Antegressa*.

Prophylace, ea est artis medicæ pars, quæ morbi causam adimit; *Prophylactice* verò, quæ a morbo præseruat, 11. meth. cap. 2. *Προφυλακτική* pars, est τῆς ὑγιανῆς, tuetur enim sanitatem. Tota consistit in caularum, quæ morbum alicui facturæ erant, ablatione, hoc est, tota circa humores præcipuè negotiatur. Siquidem maximæ præcipuæque impendentis morbi causæ humores sunt, lenti, crassi, multi, valde calidi, frigidi, mordaces, putres, pestilentes, aut alia quadam vitiosa qualitate præditi. Quæ ergo iis adhibetur prouisio, lentos incidendo, crassos attenuando, multos vacuando, calidos refrigerando, frigidos calfaciendo, mordaces contemperando, putres & pestilentes immutando, ne morbum gignant, *προφυλακτική* appellatur.

Proprius affectus, vide *Idiopathia*.

Proptosis, procidentia oculi appellatur, vbi cum inflammatione illi ex sede sua procidunt, lib. int. c. 15.

Prostertesis, *προσέρτησις*, hoc est, Appensio, longiorum est membranarum ad vicina loca applicatio, li. fin.

Prospheromena, id est, *assumenda*, vocantur, quæ intra corpus sumuntur, quæ eduntur, bibuntur, & ipse inspiratus aer, 10. method. 6. *προσφερειν* propriè de ciborum oblatione dicitur, & iis quæ in alimentum cedunt,

dunt, vt & τὰ προσεφύδα: sæpè tamen ea dictione externa præstidia & auxilia, quæque circa ægrum parantur & admoventur, intelliguntur, vt ea quæ circa partem affectam diutius adhærescere oportet, cuiusmodi sunt deligaturæ medicamenta, circumposita vlceri lintea, & cataplasmata.

Prospheysis, vide *Prosthesis*.

Prosthesis, est adiectio eorum, quæ corpori ad sanitatem defunct, pars scilicet medicinæ altera, quam nonnulli celebres quidem Medici definiuerunt esse πρόσθετον & ἀφαιρέσιν, id est, adiectionem, & detractionem. Etiam prior est virtutis nutritiue facultas, quæ nutrimentum in membro, quod nutriri debet, apponit, unde appositio dicitur, quam subsequitur *Prospheysis*, id est, agglutinatio, siue unio, quæ nutrimentum oppositum agglutinat, & vnit membro. Tertia est ἐξομοίωσις, quæ vnitum nutrimentum eidem assimilât, diciturque in specie Nutritio, 3. de natur. facult. cap. 1. & 13. Postquam succus is, qui omnem animalis particulam nutriturus est, è vasis excidit, in totam eam primùm dispergitur, mox adiungitur, deinde agglutinatur, demum assimilatur. Differre autem inter se ἐξομοίωσιν & ἀφαιρέσιν, id est, assimilationem atque agglutinationem, docet vitiligo illa, quæ λεύκη dicitur, in qua adhærentia quidem nutrimenti tacta cernitur, non tamen assimilatio; sicuti etiam adiunctionis atque agglutinationis differentiam prodit genus illud hydropis, quod εἰνασάρκω vocant. Siquidem in eo apertissime affluentis nutrimenti appositio quædam fit, quod tamen propterea quod aquosius adhuc est, nec ad succum sufficienter redactum, sed lentitiam glutinisque consistentiam, quæ naturalis ope caloris prouenit, ad eptum adhærentiam consequi non valet. Etenim vt agglutinatio fiat, oportet

oportet ea quæ agglutinari debent, nec plus æquo dura esse, nec nimis humida, & fluentia, sed mediocriter lenta & tenacia, & in eo loco consistere, vbi assimilanda sunt.

Prosthesis, *προσθησις* est pars carnosa, quæ in manuum & pedum caua parte, & inter digitos nascitur. In manibus, *ἡ χεῖρ*: in pede, *ἡ πούς*, *podis* vocatur.

Protopathia, vide *Idiopathia*.

Prurigo, *pruritus*, lentus pruriginosus est, cum exigua quadam molestia, qualis puerorum, qui iam dentire incipiunt, gingivis accidit, 3. aphor. 35.

Psalida, vide *Fornices*.

Psalidoidea, siue *Psaloeides*, vide *Camarion*.

Psammismus, curationis genus est, quo Hydropici arena calida, exerto tantum & tecto capite, ad aquam ab vniuerso corpore ciendam, & eiciendam, sepelebantur, & soli ardenti exponebantur.

Psilothra medicamenta sunt, quæ pilos & capillos aut ex toto auferunt, vel duos, magnos, multos, crassos, & veluti suillos pilos attenuant, & minores reddunt, vel ipsos penitus extirpant, & partes corporis debiles reddunt, 1. de compos. medic. loc. cap. 4. Differunt a *Dropace*, quod sint viribus *Dropace* valentiora: vide *Dropax*.

Psoa, quasi *pulpa*, id est, lumborum carnem dixeris, est magnus musculus, ab vndecima thoracis costa incipiens, & per vniuersa illa, ipsamque pubem progressus, lib. de muscul. diff. cap. 31. *Ψόα* dicuntur duo maximi musculi in interna lumborum regione siti, Hipp. eamque partem spinæ, quæ secundum ipsos est, inflectunt: Idem vero & *ὑποψήτται*, & *ἀνώνυμοι* a quibusdam vocantur. Sunt vero & qui externos spinæ musculos *Ψόας* vocent. Marcellus *Ψόας* lombos propriè dici contendit, quod nomē a libidine meritò deduci volunt, Nam

Nam illic libidinis pruritus excitatus maximè, quod iis renes subiacent.

Psora, scabies est, cum asperitate summæ cutis cum pruritu, furfuribus, & corporis insigni absumptione, lib. Introd. c. 13. quæ omnia, etsi illi cum lepra communia sint, differunt tamen, quod in *psora* summa cutis occupatur, in *lepra* malum altius descendit, subiecta quoque sævit in partes. Insuper, in *psora*, furfuracea fit cutis, in *lepra*, squamosa: Adhæc *psora*, variè figurata est; *lepra* verò, circularibus magis erosionibus cutem depaleitur. *Psoram* Aulicenna distinxit in excorticatam, & non excorticatam; foedam, & non foedam; humidam, & siccam; quod forte aliud sit Græcis *psora*, ac Arabibus. Ex melancholico humore nascitur malum, atque inter melancholicos affectus numeratur.

Psoriasis, *ψωρίασις*, est scabies, & duritia scroti, cum intensa prurigine; quandoque verò & ulceratione, lib. finit.

Psorica medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant, 2. de comp. med. loc. c. 3. *ψωρία* vocantur etiam, quæ contra *ψώρας* prosunt, & cutis asperitates emendant, qualia medicamenta attrahunt, desiccant, partiumque tenuitatem habent. *ψωρία* medicamenti compositi ex duabus chalcitidis partibus, vna cadmiæ, ex aceto tritis, in fictili repositis, & fimo diebus quadraginta sub caniculæ ardoribus obrutis, meminit Diosc. & Celsus, lib. 6. cap. 6. Sunt & Heraclidæ *psorion* ad circumrosos oculorum canthos.

Psorophthalmia, id est, *pruriginosa scabies*, à Sole, & pulvere orta, lib. de remed. par. fac. cap. 10. Lippitudo scabra, nihil aliud est quam oculi *psoriasis*. Causa eius est salsus quidam, & nitrosus humor. Inde lucedunt angulorum exulcerationes, rubores, pruritus.

Rubent

Rubent etiam palpebræ, & lacrymæ salæ nitrosæque ex oculis stillant. Differunt ἀπὸ τῆς εὐποδᾶλαιας asperitate, & reliquorum ferè symptomatum magnitudine.

Psychrophobus, est qui frigidæ aquæ exhibendæ est timidus; sicut & *hemophobus*, est sanguinis mittendi timidus; & *hydrophobus*, qui à rabido cane morlus, aquam reformidat, 9. meth. 5.

Psytica medicamenta, sunt refrigeratoria, quæ omnem calorem, & lassitudinem mitigant, lib. de Dynamid. in procem. ψύξις, frigus refrigeratio, ut aph. 1. & 26. lib. 7. ψύξις ἀποτρίσιον, extremarum partium refrigeratio damnatur, & in Philini vxore, lib. 1. Epidem. ἀκρεῖα ψύξις, extremæ partes frigidæ ascribuntur ubi scribit Gal. *Istud quidem inter summè perniciosum reponitur, si morbi initio cum vehementissima febre contingat*, ψύξις ποδῶν, pedum refrigeratio, pro magno inualuræ accessione febrilis indicio ponitur apud Hipp.

Psydracia, ψυδράκια, sunt parvæ efflorescentiæ, factæ in capite similes vesicis eminentibus in superficie, li. de med. fac. part. cap. 5. Differunt à *Phlyctænis*, quæ in toto corpore, non tantum capite, ut *Psydracia*, oriuntur. Item, quod *Phlyctænæ* à calidiori, acriorique, hæc a minus calido humore, minusque acri gignantur.

Pterna, calx, os pedis omnium maximum est, parte, qua ingredimur, leniter rotundum, & latiusculum, posteriore, tibiæ rectitudinem longè excedens, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoeidi inarticulatum. Ex partibus eius anterioribus, quæ quidem è regione magni digiti sita est, astragali capiti subiaceat, neque cum altero osse cupulatur.

Pterygium dicitur, nervosa superinnatæ oculi membranæ eminentia, incipiens ab angulis, & procedens usque ad corneam; quando verò insuper augetur, cooperit

operit & pupillam, lib. de med. fac. part. cap. 12. *Pterygia* etiam vocant *alas narium*, d est, fines eius infernos, qui mouentur, 11. de usu part. cap. 1. Intuper *Pterygium* etiam *Vngula* appellatur, & *Vnguis*, differens ab *Enchanthide*, quæ est carnis in maiore angulo excrecentia; *Pterygium* verò, ne ruosa caruncula est, 10. de usu part. c. 10. Sunt autem *πτερυγία* propriè, volucrium alæ, duræ eudem & fibrosæ, sed pauci excrementi, & salubres. **Inde** ducta vox ad alia est. In mulieribus *πτερυγία* appellati eminentias illas duas, vteri sinum ambientes, scriptum reliquit, quisquis ille est Introductionis seu Medici Author, *Πτερυγώδης* alatus, is dicitur, cui scapulæ sine carne nudæque sunt, & alarum instar prominent, reuorsumque producuntur.

Pterygoidea, quæ & *alaria ossa* dicuntur, vide *Sphenos*.

Pilos. glabras, simulque nascentes, alias, *palpebras*, quæque pilos non habent, Græci vocant, 4. de compos. med. loc. cap. 8. *πίλοι*, inquit Galenus, lib. 14. method. medic. quibus perire ex ciliis pili. Alii verò non omnes simpliciter, quibus ij pili deciderunt, *πίλος* vocandos censent, sed quibus præterea adiuncta est crassities, collositas, ac rubedo palpebrarum, quod aliter inter eos, qui *πυλῶσες*, & eos qui *μυλῶσες* laborant, non liceat distinguere: Est enim vtriusque commune pilorum defluuium.

Ptilosis, est casus pilorum palpebræ, lib. de medic. fac. part. cap. 12.

Pisana, nunc pro *succo hordei percolato*, nunc pro *insculo ex hordeo parato*, sumitur, 9 de plac. cap. 9. *Πισάνα*, propria est hordei decorticati appellatio, ἀπὸ τῆς *πίσεως*, quod *pinsere*, & *decorticare* significat, quoniam hordeum tundendo deglubretur, ac suo cortice castratum

stratum ita conderetur: *Mandatum hordeum* Officinæ vocant. Tunditur enim hoc, non molitur. *Prisana* laudes Hip. vno volumine prosecutus est, eam omnibus sorbitionibus præferens, quoniam lenis & lubrica ex facili hauriretur, quidnam sitim arceret, quoniam in aluo non intumesceret, quoniam facili redderetur, & assuetis is solus cibus in febribus his die dari possit, multum remotus ab his, tum qui medicinam fame exercet, tum qui ægros ciborum copia obruunt. Est enim *Prisana* succus seu cremor, alimentum medi generis, et tunc a Galeno dictum, quod vires nec onerat vt plenus victus, nec vt tenuissimus dissoluit.

Profsis, oculi vitium est, quod alio nomine *φαλάγγσις* appellatur, vide *Phalangosis*.

Pubes, *Pubertas*, tempus est ætatis primæ, quo lanugo circa mentum & pudenda oriri incipit: quo initio anni decimi quarti incipit, ad vigesimum quintum terminatur, 5. aphor 7. Est & *Pubes*, idem quod *Pecten*, postrema pars hypogastrii, huc aqualiculi, cui pili innascuntur. Vide *Aqualiculus*. Cuius Pubis, seu Pectinis ossa, Apophyles sunt ossis sacri tenues perforatæ, & in anteriora protentæ.

Publicè grassantes, vide *Communis*, & *Ecdemus*.

Puerilis morbus, vide *Comitialis*.

Pulmo, ex genere est parenchymatum, caro rara, tenera, & spongiosa est, in cuius cauis & fistulis cartilagineis, aer attractus, modicè retinetur, & rectificatur à suis prauis qualitatibus, indeque in cordis transmittitur ventriculū sinistrum, pro spirituum vitalium generatione, lib. de anat. viu. vnde respirationis & vocis instrumentum est, 7. de vlu part. 1. Est itaque *pulmo*, vitæus quemadmodum hepar, vasis quam plurimis contextum, quorum intervalia carne molli, instar sioches cuius.

cu uisdam, opplentur, quo omne id, quod inter vasa est inane, repletur, essetque firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipsorum, ibidem cap. 2. & 8. *πνεύμα* Græcè dicitur, spongiosus est, quò follis instar, aere impleri, distendi que citra noxam possit & contrahi, substantia spumam sanguinis referens, Intra thoracem situs est pulmo, ipsumque totum replet, & occupat, & eius motum sequitur. Cum enim per se immobilis sit, ab alio moueri debet: itaque distentus thorax, pulmonem vna distendit: subsidens autem atque contractus, ipsum quoque subidere facit, & aerem, quem dilatarus attraxerit exsufflare, atque ita aeris inspirationem expirationemque perficit. Vt autem thorax ipse in duo diuisus est, & media membrana (mediastinum vocant) distinguitur, ita pulmo in duas partes diuisus est, dextram & sinistram. Rursum verò pars eius vtraque duobus lobis constat, vno superiore, altero inferiore, sæpè palam discretis, interdum obscurè. Præter hos nonnunquam tertius est dexter lobus exiguus, vasibus per paucis textus, media cauitate venam cauam in cor subeuntem ceu puluino molli excipiens ac firmans, in hominibus sternon ossibus septem compositum sortitis. Nam quibus cum sterno thorax anticus est breuior, iis pericardios tunica in phrenas magna suæ cauitatis parte incidit, & in hanc cauitatem vena caua, lobo hoc quinto propter viæ breuitatem non indigens. Tria autem vasa per eius substantiam dispersa sunt, ante quidem arteria venosa, post verò vena arteriosa, & media harum aspera arteria: & hæc quidem iam inde à quarto thoracis spondylo, vena a dextro cordis ventriculo, arteria à sinistro proficiscitur. Distribuantur autem singula in totos pulmones numerosa ramorum serie. Cæterum, pulmonem ipsum vna cum suis vasibus tunica

obducit, orta ab eà quæ costas succingit, & neruulos à sexta cerebri coniugatione sortita, quorum beneficio tunica quidem ipsa mediocrem sensum possidet, cum tamen pulmo ipse nullam vim sentiendi sortitus sit.

Pulmonia, vide Peripneumonia.

Pulsatius dolor, vide Dolor pulsatiuus.

Pulsus, est sensibilis cordis, & arteriarum motus, dilatione, & contractione factus, 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de different. puls. cap. 3. Hoc nomen *pulsus* veteres primùm adhibuerunt designandis motibus dolorificis pulsantibus, ex inflammatione concitatis, vehementiq; motu arteriarum. Deinde, Medici ea voce significant motum secundum naturam in corde & arteriis factum, per systolen & diastolen, cuius naturam Hippocrat. vel non callebat, vel vt fallacem neglexit; in quo si Medici tactus ipsa in diastole euertitur, aut violenter impellitur, & cum renixu quodam ipsa arteria pullat, *vehemens pulsus*, *εὐσπῆς σπυγμῶς* dicitur: cui oppositus, *ἀνυσπῆς*, *languidus* dicitur. Motus ille vitam moderatur, vt qui vel non alius sit quam vita, aut causæ certè rationem obtineat, per quam vita est, aut sine qua esse nō potest. Neque enim alius vita videtur esse, quam actio quædam, siue motus actiuus. Cum autem motus plures sunt in omnibus vita præditis, is meritò præstantissimus est, & in eo maxime vitam positam esse censendum, qui perpetuus sit, & à quo cæteri omnes dependent. Eiusmodi cordis motus est, cum reliquæ partes interdum ferientur, eo perseverante, nec vnquam, stante quidem vita, muneris sui vocationem habente. Nec verò cor sibi tantum motum illum ciet, sed corpori etiam vniuerso, quod ita singulis partibus, quantum quæque meretur, calorem natium, cuius opifex est, impertiat. Constat autem motus is duobus motibus inter se contrariis,

Ff

quorum

quorum vnus cor & eius arteriam à medio quoquoque-
sum distendit, & loco mouet; alter, distentum rursus
contrahit, & in locum priorem reducit. Illum *διαστολή*
hunc *συστολή*. Græci veteres dixerunt. Hi quia contrarii
sunt, necessaria est inter eos media quies intercedat, eaque
gemina, vna, quæ diastolen: altera, quæ systolen exci-
piat. Ab his differentiarum plurimarum pulsuum oriuntur.
Cum enim certis quibusdam numeris ea in edendo pulsa
sibi inuicem succedere oporteat, si in aliquo peccetur,
pulsus protinus varius fieri necesse est. Numeros ap-
pello, non rhythmum modò, sed etiam velocitatem,
magnitudinem, frequentiam, vehementiam, aliaque
eiusmodi, ex quibus pulsuum differentiarum sumuntur, qua-
rum aliarum ab ipsa diastole, aliarum verò à systole, nonnullarum
à media quiete, quæ ab ipsa arteria, plurimarum ab ipsa fa-
cultate aut usu sumuntur.

Pulvis pinguis est, in quo nec asperum quippiam, nec
acre subest, 5. sanit. tuend. cap. 3.

Punctio, solutio continuitatis in carne est, ab aliquo
acuto incidente, & tenui facta; Græcè *ρύξις*, & *ρύξις*
dicitur. Est adhuc *punctio*, quæ & *compunctio* appellatur,
incisionis ratio, quæ hydropicis ad ciendam aquam de-
betur, *παραπέντησις* Græcè dicta, Arabibus, *punctura*.

Punctorius dolor, vide *Dolor tristis*.

Pupilla, Græcè *κόρη*, foramen medium vultus tunicæ
oculi est, in quo fit visio, lib. de anat. vii. estque media
totius Iridis pars, lib. Introduct. cap. 10. per *pupillam* qui-
dem cernimus, non quod ea sit præcipuum videndi in-
strumentum, sed quod spiritui visorio per eam via
pateat, nec possit aliter visio fieri. Argumento sunt
hypochymata. Est autem locus ille, qui ad *pupillam*
est, totus spiritu plenus, & præterea cæruleo viridique
colore, aut aliis etiam præditus, quibus & ipsa vultus
cuius

cuius ille pars quo iam modo dici potest.

Purgatio, euacuatio est vitiosorum, & qualitatibus suis peccantium humorum per propria loca; *Derivatio* per propinquiora; *Reuulsio* per contraria, 4. meth. 6. & 5. meth. 3. *Vacuationem* appello propriè materiæ, vbi quantitate exuperat; *Purgationem* verò materiæ, qualitatibus suis infensæ, 2. Prognost. 14. 1. aph. 2. vide *Euacuatio*, & *Pharmaca*.

Purgamenta, ῥόχμα Græcè dicuntur ea omnia, quæ à puerpera, post foetum & secundas exeunt per vterum, quæ & *Catamenia* appellantur; Moloque hoc differunt, quòd hæc ante partum sint, illa post partum.

Purgatoriam facultatem non omnes intelligunt; duo enim significat; alterum, commune omnium, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant; alterum verò, per excellentiam de iis tantum dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris deiectionem substantiæ suæ familiaris expurgant, 5. de simpl. med. cap. 20. vide *Cathartica*.

Purpurea vena, vide *Communis*, & *Media*.

Purulentiam, *Suppurationemque* appellat Hippocr. vbi pus vniuersum constiterit, cōcocto tumore copiam præter naturam, 1. progn. 40.

Purulentus, & *Suppuratus*, vide *Empyus*, & *Empyus*.

Pus, πύον, est humor putris, siue suppuratus; partium spermaticarum substantiæ magna ex parte assimilis. Dicitur humor, quod in humoris modum fluat, atque ex humore habet originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens, & per inania eius spatia diffusus, oclusis vndique meatibus, perspiratione, intercepta computrescit; perinde atque alia omnia, quæ perspiratu carentia, alieno in loco vehementius incalescunt.

Pustula, Græcis *Hydatides*, & *Exanthemata* dicuntur
4. sanit. tuend. cap. 4. Sunt & *Pustula*, abicessus in nigr
oculi, cum phlegmone & humorum affluxu, lib. finit. vi
de *Exanthemata*.

Pustula lata, siue *tubercula omnia*, duplicem habent
differentiam, quoniam quædam tendunt in acumen, &
altum petunt; quædam ad maiorem & ampliorem ex
tenduntur locum, non tamen in altum attolluntur; unde
de *Pustula* nonnullæ *sublimes*, nonnullæ *lata* sunt, C
aph. 9. *Lata* quidem, tum ob humoris frigiditatem, len
torem, & crassitudinem; tum propter continent
membranae densitatem; *sublimes* verò, tum propter hu
moris caliditatem, & tunicae raritatem, tum propter
virtutis robur, foras expellentis pus: unde Coni simili
tudinem referunt, & in mucronem fastigiantur, 1. pro
gnost. 40.

Putredo, est mutatio totius putrescentis corporis sub
stantiæ ad corruptelam, à calido externo, 1. 1. meth. &
Secundum Philos. lib. de gen. & corrup. est corruptio cal
loris in vnoquoque calido & humido, ab extranea calid
tate. Cæterum, non quicquid corrumpitur, ὁλκνῆς, hoc
est, *putrescere*, dicimus, sed quibus id cum foetore acci
dit, 5. simpl. 15. dicitur autem *putredo*, siue *putrefactio*
Græcè σήψις, quam duplicem Gal. facit, 1. de diff. febr
unam, quæ fit superante natura; *alteram*, quæ fit supera
ta: Gal. eo loco consule. Et superante quidem, sicut in
inflammationibus, & similibus tumoribus omnibus pus
in humoribus autem, qui in venis atque arteriis conti
nentur, quiddam quod puri proportionem respondet, sub
sident in urinis; At talis quidem putredo, non simpliciter
putredo existit, sed aliquid in se continet coctionis
Nam adhuc vi coquendi vasorum remanente, qui inter
rim putrescit humor, ad talem peruenit alterationem.

Sed & alterum est putredinis genus, cum ea vis, cui de-
mandatum est concoquendi officium, adeo imbecillis fa-
cta est, ut nullam amplius facere possit in putrescente,
superfluitate ad optimum transmutationem. Quod qui-
dem usu contingit nonnunquam eum eadem vis ad vl-
timum imbecillitatis peruenierit, etiamsi id quod putre-
scit, mediocriter sit vitiatum. Interdum vno fieri potest;
ut vis quidem ipsa non omnino sit imbecillis, humor
vero putrescens maxime sit vitiatum. Huius autem su-
perfluitatis putredo, neque consistentiam, neque aut co-
lorem aut odorem habet vnum, sed semper permutatur,
ac multis modis illud euariat quod putrescit. Altera ve-
ro putrefactio, quam & coctionem esse diximus, semper
ad vnam puris speciem terminatur, coloremque ac con-
sistentiam suscipit atque odorem.

*Pycnotica, & Pycnosis, vide Condensantia, & Ob-
struentia.*

Pyleos, vide Choana.

*Pylus, Græci vocant paruos alueos, in quibus nata-
tiones instituuntur, 7. meth. 6.*

Πύλωρ, posterior est, & inferior ventriculi termi-
nus, sic dictus, quoniam portæ modo, ne nutrimentum
ex eo confestim dilabatur, prohibet, lib. Introd. cap. 11.
qui & *Pyloron* dicitur, ad dextram propè iecur situm,
habens, lib. de ven. & art. dissect. cap. 1. Latinis *sanctor*,
vide *Porta ventriculi*.

Piæsis, vide Onyx.

Pyrenoeides, πυρηνειδὲς ἀπόφυσις, vide Dentem.

*Pyriana, fofus, fomentum est, non vno modo cor-
pori admotum, sed vel per suffitum, vel calidam spon-
giam humido aliquo decocto imbutâ, vel vaporem per
arundinem, vel cucurbitulas. Πυρίαμα in genere id dici-
tur, quod corpori admotum, ipsum quouis modo exal-*

facit: Dicitur enim & *πυρία ἀπὸ τῆ πυρᾶ*. Sunt autem & fomentorum multiplices differentiae: alia humida, alia sicca sunt, vel ex vtriusque mixta. Humida, vel actu, vel potestate dicuntur: conueniunt phlegmonis, quæ a biliosiore succo factæ sunt. Sicca similiter vel actu eiusmodi sunt, vel facultate; phlegmonis opitulantur, quas tenuis, & aquosus sanguis excitauit. Omnia calida sunt, nulla frigida. Proinde fomentum omne cutem rarefacit, & facile transpirabilem reddit, sanguinemque in inflammationibus attenuat; atque discutit. Alia præterea mordentia sunt, alia morfu carentia, vel ex iis mixta: illa extenuant, profuntque crassis & viscosis humoribus, hæc verò, acris & mordacibus. Quoniam verò fomenta calore suo foras humores attrahunt, idcirco non ante totius corporis vacuationem illis vtendum est: Nam quæ redundant in corpore superflua, eorum vltrahentur potius in partem affectam, quam discutiantur. Cæterum fomentorum materia varia est, & modis variis adhiberi potest, per spongiam, per linteam, per pannos, per virem, per vesicam, per vas æneum, vel testaceum, per cucurbitam, per ollam, per arundinem; quorum exempla passim apud Galenum occurrunt.

Pyricauskon, idest, *ambustum igne*: simul & is affectus eodem nomine appellatur, quo quis in aqua feruenti vltus fuerit, i. de comp. med. per gen. cap. 4. *Πυρκαυσ*, *Ambustus* dicitur. Prodeunt primùm bullæ, deinde phlegmone & vltus, nisi lenibus emplastris, & sine morfu exsiccantibus, nec calidis, nec frigidis, sed temperatis proutinus succurratur.

Pyulcon, *πυελκόν*, Organum, siue instrumentum est, quo mulla per vicus infusa, iubemus vt ægri, inclinati in laborantem partem, tussiant; aliquando etiam mollior thoracem concutendo, pus vniuersum, saniemque

vltoris

visceris extrahimus, 5. meth. cap. 8. Fortè idem fuit cum Chirurgorum organo, quod nunc *Syringam* vocant, per quam vt aliquid infunditur, ita facile attrahitur: a quo & *Pyulca*, idest Puris attractiua medicamenta de; nominantur, 2. ad Glau. 8.

Q.

QUADRATVM corpus (quod & *Eusarcon* vocant) est, quod nec gracile, nec crassum, nec calidum, aut frigidum, aut alio quouis modo intemperatum; 1. de temp. cap. 9. sed inter hæc omnia extrema, medium constituitur, 3. de caus. puls. cap. 11.

Quartana febris, *τεταρτῆς πυρετός*, est, cuius circuitus est quarto quoque die, quo vnam accessionem facit, ac vnam remissionem, lib. de Typis, cap. 4.

Quassatio, est quartus luxationis vertebrarum modus; tria enim vitia ex vertebrarum luxatione contingunt; cum retrò abeunt, *gibberositas*, cum intrò, *re-panditas*; cum in latus torquentur, *obstipitas*; præter hæc, quartum vertebrarum vitium accedit, cum dimotæ quidem iuncturæ ac compages sunt, sed vertebræ tamen in sua sede permanent, *quassationem* hanc appellant, 3. de artic. 2.

Quotidiana febris, vide *Cathomerina*.

Quotidianarum febrium typus est, qui quotidie vnam, & eandem accessionem, & eam quidem longitudine commensuratam, & vnam eandemque remissionem habet; vt Tertianus circuitus est, qui tertio quoque die, vnam & eandem accessionem longitudine commensuratam, & vnam, & eandem remissionem facit, lib. de Typis, cap. 4.

RADENS *bilis*, vide *Ater succus*, & *Acidabilis*.

Radicem vasis, seu *vena*, vocant priorem eius partem, quæ vel iecinori prior est, vel etiam cordi: hæc in collo ab inferiore est parte, in brachiis & crucibus à superiore, 5. meth. cap. 3.

Radius, vide *Cubitus*.

Ramenta, sunt membranarum in intestinis rasuræ, aliquando etiam cruentosæ, 1. loc. affect. 4. vide *Strigmenta*.

Ramex, *Hernia*, Græcè *Cele*, est omnis in *Scroto* tumor, siue ex delapsu Intestini, siue Omenti, siue Vasorum spermaticorum, varicis, tophi, siue lenti humoris, siue aquosæ substantiæ, lib. finit. Fit autem & aliquando *Ramex* in inguine, quoties validus ille Tendo (qui & membraneus dicitur, & ante inguina ortum habet, ac pubis ossi inseritur) laxescit, eiusque robur infirmius fit, & cum eo totus inguinum locus, laxior redditus, partes quasdam corporis subiacentium in se recipit, velut intestinorum, vel omenti, 4. de anatom. adm. cap. sexto vide *Celes*,

Ranula, tumor est phlegmonodes, sub lingua consistens, potissimum in pueris, quem Græci *Βατραχον* vocant. Dicuntur quoque *Rana*, sublinguales venæ, sanguine copiosiore distentæ.

Raresfacientia medicamenta, quæ *Areotica* Græci vocant, sunt, quæ cutis meatus referant, 5. simpl. 14. vide *Anastomatica*. Απαωρινα γάμμακα calida sint, oportet, & tenuium partium, minimeque desiccantia, quod aliter substantiam nec diffundere, nec laxare possint. Ad hoc autem consequitur, ut & Pori dilatentur. Id quod præstare nequeunt, tum valdè calida, tum multum exsiccantia :

cantia: illa quidem, quod acria sint, acque horrores moueant; hæc autem, quia sensilia corpora colliquant, quorum neutrum sine dolore fieri potest. At quæ citra molestiam exalefaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Siquidem rarefactio, dilatatioque voluntatis, non etiam doloris opus est: Vt enim dolor comprimit, ita voluptas expandit. Contraria iis sunt *ra tenuitatis* hoc est, condensantia.

Rarum corpus est, cuius partes multis spatiis inanibus interceptæ sunt, aere plenæ: è contra, *corpus densum*, seu *spissum*, quod eiusmodi porositatibus carens, compactum est, 1. simpl. 13. siue *rarum corpus* est, quod meatus, & poros magnos habet, 2. de sanit. tuend. cap. 5.

Rarus pulsus, vide *Creber pulsus*.

Rascecta, vide *Brachiale*.

Rationalis medicorum secta est, quæ naturæ rationem & ductum secuta, morborum causas inquit, & signis ad illarum inuentionem vitur, curationem capiens à contrario, prout causæ exigunt, in *Introd. cap. 3.*

Rauedines, vide *Broncor*.

Recidina febris est, quam prauorum humorum reliquæ putrescentes, de nouo accendunt; cum omnis humor, aliendus à naturâ corporis, in quo continetur, aptus non sit ad eius nutritionem, & proin necessariò ad putredinem conuertatur, 2. aph. 12.

Reciprocus decurtatus, vide *Deficiens decurtatus*.

Reciprocus pulsus, vide *Deficiens*, & *Recurrentis*.

Recrementum, vide *Callesum corpus*.

Recrudescētia, vlcera maligna vocat; & *recrudescere*, quasi rursus crudum fieri, atque in pristinam malignitatem quippiam redire statuunt Medici, 2. de fract. 28.

Recta sutura Caluaria, vide *Obleta*.

Rectum intestinum, est vltimum intestinorum omnium.

nium, quod ad sedem vsque porrectum est, 6. de anat. adm. cap. 9. quod & *princeps intestinum* vocatur; ad cuius finem est *sphincter*, idest, constrictorius musculus, ad cuius distinctionem reliquam recti intestini infimam partem, quā maximè dilatatur & laxatur, *laxam* appellamus, lib. de vulu. dissect. cap. 1. Idem etiam *extensum*, & *longum* dicitur, lib. de anat. viu.

Recurrents pulsus est, qui ad quantum excurrit magnitudinis aut vehementiæ, in alijs rursus ad tantumdem recurrit, lib. finit.

Recurrentes nervi, vide *Nervi recurrentes*.

Redunia, vide *Paronychia*.

Refrectia, vide *Anatripsis*.

Regius morbus est, qui amaram bilem in toto corpore redundantē, comitatur: Fiunt perindē vt *erisypelata*, & *ulcera serpentina*, cum eadē amara bilis vnam quampiam particulam obsidet; aigram verò bilem in toto quidem corpore, *elephantiasis*; in vna quapiam particula, *Cancer* subsequitur. Pituitoso excremento in toto quidem corpore luxurianti succedit *hydrops leucophlegmatias* dictus; cum in vna inleat particula, *tumor adematofus* oritur, 3. de sympt. caul. c. 2. vide *Arquatus*, & *Icteros*.

Relaxantia medicamenta vocantur, Græcè *Chalastica*, familiari omnibus propè recentioribus Medicis vocabulo, inde nimirum, sicut & nomen ipsum indicat, quod tensas laxent particulas; quippe *relaxari*, ac *intendi*, contraria inter se dicunt, 7. de compos. medic. per gen. cap. 9. vide *Chalastica*.

Remissio febris, secunda totius circuitus paroxysmi pars mitior est ad infebricitationem properans; in duo siquidem periodus vniuersa diuisa est, in accessione m. & remissione, lib. de totius morbi temp. cap. 8. vide *Ablatio*,

Remissus pulsus, vide Vehemens.

Renes, νεφραι, peculiare quoddam corpus sunt, densum, ex carne, & fibris constitutum, adeoque carnea substantia, non paucas habens inuolutiones, figura Græcæ litteræ C, aut phaseolis similes, habentes in medio cavitatem quandam, qua ex venis & arteriis serosum excrementum excipiunt; ad *Renes* enim non maiores solum venæ (quarum aliæ in cavitatem hanc inferuntur, aliæ in membranam, quæ eos tegit,) sed meatus etiam capillorum modo exiles deferuntur. *Renes* sitî, paulò altius, quam ilia, à quibus duo vrinarij meatus emergunt, per quos ad vesicam vrina deducitur. Renum operatio est, discernere, & percolare serosum excrementum, à sanguine, lib. de ren. aff. dign. c. 1. In omnibus propè Ren. dexter sinistro sublimior est. Vterque membrana a peritonæo nascente inuoluitur, neruulumque gracilem recipit a ramis sextæ coniugationis, qui costarum radicibus exporriguntur. Sunt autem *Renes* prauis succi, & concoctu difficiles, & resipiunt nescio quid vrinæ, vt testatur Gal. lib. 3. de alim.

Repanditas, vide Obstipitas, Quassatio, Cyphosis.

Repercutientia, vide Attrahens.

Respiratio, & respiratus, vide Inspiratio, & trāsspiratio.

Resolutio nervorum, est deperditio motus, cum prius in aliqua corporis parte, non autem semper sensus; si enim deperditur sensus, dicitur sensus resolutio, 3. loc. affect. 10. licet eiusdem capitis initio dicat: vbi omnes pariter nerui, tum sensum, tum motum amiserint, *Apoplexia* hæc affectio appellatur; vbi verò alteri laterum soli, aut dextro, aut sinistro, id accadat, *resolutio*, eius scilicet partis, in qua consistit affectio, interdum dextræ, interdum sinistræ: quod si in aliquo membrorum idem euengrit, eiusdem membri resolutio, Græcè *paralysis*

paralysis esse dicitur, 3. loc. aff. 10.

Resolutus oculus dicitur, vbi naturali motu destitutus, neque sursum, neque deorsum moueri potest, verum sensus expers sit: frequenter id mali, partibus etiam oculi accidit, lib. Introd. cap. 15.

Restitutio, est ossis, vel membri, in propriam sedem collocatio, reductio, & repositio, 3. de fract. 38.

Rete, vide *Omentum*.

Retentrix facultas, vide *Attrahrix*.

Retiforme corpus est tunica, aut tunicae quid simile humorem vitreum oculi ambiens, quod ex Cerebri portione aut verius ex nervo optico supernè descendente, atque amplificato conflatum est, reti simile, quod à Choroeide, id est, tenui Cerebri tunica, quæ illi supernè dimittitur, continetur; vnde tunica oculi *Choroeides*, id est, *secundina*, nominatur, 19. de vsu par. c. 2. vide *Choroeides*.

Retiformis plexus, vide *Flexus variciformis*, & *Amphiblestroides*.

Retina, est panniculus, vitreum humorem oculi circumdans quasi rete; cui annectitur alius, qui dicitur *secundina*, quod secundinae sit similis, iuxta quem tertius est, qui ossa contingit, durus & solidus, vnde *σκληρὸς* dicitur, lib. de ocul. cap. 2.

Reuersua febris nominatur, quæ non est acuta, sed diuturna, & imperfectas habet solutiones, erroneasque accessiones, com. 2 in 6. de morb. vulg. 21.

Reuulsio, est euacuatio alienæ materiae per loca opposita. Vide *Purgatio*, & *Derivatio*. Est autem *Reuulsio*, facienda deorsum quidē, vbi succi ad superiora feruntur: sursum, vbi ad inferiora vergunt; & vbi introrsum, ad exteriora: ubi extrorsum, ad interiora; vbi dextrorsum inclinant, in sinistrum; si sinistrorsum, ad dexteram *re-uulsio* facienda: sic sanè fluxiones quæ retrò inclinant,

in priora reuellendæ: quæ in priora, in posteriorem regionem abducendæ sunt, lib. de hyrudin. c. 2. lib. de Deriuat. c. 19. Motum hunc Græci *Antispasis* vocant, vide *Antispasis*, *Deriuatio*, & *Purgatio*.

Rhabdoeides sutura, eadem est ac recta capitis sutura, vide *Obelaa*.

Rhachita, qui & *Rachicæ*, sunt *Dorsales musculi*, 4 de anat. adm. c. 6. 7. aph. 35. Illi enim, vt annotat Gal. uniuersis costarum commissuris in toto thorace superinjecti sunt à posteriore parte, nihil relinquentes quod non contegant, sed omnes costarum radices, & vertebrarum processus, qui à lateribus sunt, adhæc quod inter ipsas radices est, complectuntur: Vnde *Rhachitis medulla*, id est, *spinalis medulla*, quæ & *Rhachis spina* dicitur. Vide *Dorsum*, & *Medulla*.

Rhacodes, *ῥακώδης*, id est, *lacerosa*, uniuersa dicitur cutis, crofa instar laceræ vestis, à pure circa abscessu aggregato, sufficienter extenuato: idq; accidit, ubi qui ad abscessu perueniunt tumores, tardè lecti fuerint, aut ob medicatium impetitiâ, aut eorû, quibus medela adhibetur, timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant, ut longiori tempore cutis à pure rodatur, 2. Glauc. 8.

Rhacosis, *ῥακώσις* ὁ ῥακός, id est, *detritio*, laxata scroti cutis, seu multa scroti extensio est, lib. finit.

Rhagades, sunt rugæ ani intumescences, rimæque, ac fissuræ sedis, 1. de comp. med. loc. cap. 8. quæ & *rimæ sedis* dicuntur, non aliter quam labra, quandoque & manus, ex vehementi frigore; Plinius *fissas* appellat. Fiunt plerumque ab acris humoris affluxu, interdum autem, propter condylomatum inflammationem & distensionem rumpitur cutis, rimæque eiusmodi emergunt. Dicuntur & à Veteribus quibusdam *ῥιγῆες*.

Rhagas, *ῥαγῆς*, id est, *scissura*, *fissurae*, diuissio est labia

labia obtinens callo obdurata, dura, lib. finit.

Rhages, dicuntur extremi digitorum n̄nes, qui Græcis *ρορυαί* vocantur.

Rhagoeides tunica, quæ cærulea, vnea, & vtriformis dicitur, est oculi panniculus, albugineum humorem tangens, & circumdans, nigri coloris, vnde *vnea tunica* ab vuarum colore dicitur, post quem est alius panniculus, cornu similis; vnde *Ceratoeides*, idest, *Cornens* appellatur; iuxta quem est tertius, non circumdans alios, sed eos inter se iungens, quem *Coniunctivam* vocant & *Adnatam*, siue *Agnatam*: inter crystallinum autem & albuginem, est tela aranea, lib. de ocul. cap 2. & Introd. i i. & 10. vsu part cap. 4 *Ραγοειδής χιτὼν*, est oculi tunica corneæ subiecta, & anteriore quidem oculi parte humorem *υδαπειδῆ*, posteriore verò tunicam *ἀμφιβλυσπειδῆ* proximè comprehendens. Ducit originem ex tenui cerebri meninge, quæ vna cum nervo optico ad oculi constructionem concurrat: ex quo quidam etiam *χρσοειδῆ* illā appellarunt. Dilatata enim & soluta tenuis illa meninx circuo oculum ambit, totaque spherica est, nisi vbi ad pupillæ locum accedit. Eo enim loco leniter comprimitur, atq; media ea parte qua comprimitur, foramine rotundo peruia est, quod pupilla appellatur. Dicta est *ραγοειδής*, quod vna folliculo, à quo pedunculus avulsus est, quam simillima sit: vt enim ille, ita hæc tunica parte sui anteriore leuiter compressa est, & in medio ad pupillam perforata. Habet verò & coloris cū vna similitudinem, variis interstincta coloribus cæruleo & viridi, quibus se defatigatus oculus recrearet. Præterea verò acini vna leuitatem extremam, & asperitatem internam emulatur, vt eam Medici rectè illi comparasse videantur.

Raphe, idest, *Sutura*, *Commisura*, *Syntaxis serrata* vide *Commisura*.

Rhegma, id est, *ruptum*, est solutio continuitatis in vase; vt, Fractura, in osse; Conuulsio, seu Spasmus, in neruo; Apospasma in ligamentis; Thlasma in muscularis: ita Rhegma in vasis, ex violento ictu; vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitata, est vnionis solutio, 4. meth. c. 1. Aliis est carnosæ partis solutio citra vulnerationem: cum ecchymosi quidem omnino, aliquando verò & cum contusione circum ipsam præruptam carnem consistit.

Rhetidosi, id est, *oculi tabes*, & *corrugatio*, 3. meth. 2. Vide *Tabes oculi*.

Rheuma, id est, *fluxio*, & *humorum decubitus*, 1. de comp. med. per gen. vide *Fluxio*.

Rheumaticus vocatus *affectus* provenit, quando toto videlicet corpore infirmo, & cachectico, principibusque partibus (paulum licet ipsis insit sanguinis) grauari solitis, noxios humores, illæ, ad carnosas cutis partes protrudunt, potissimumque ad adenas, excipiendis recrementis idoneos, tum ob substantiæ laxitatem, tum quia omnium partium minimè robustas habent naturales virtutes, sicut & pinguedo; partes enim infirmiores omnium primæ, excrementitiis morbis corripuntur, lib. de cur. per sang. cap. 8. Fluentibus verò humoribus, *Rheuma*, seu *fluxio* dicitur; cum verò in aliqua parte eadem illi constiterint, is affectus, qui inde generatur, *Rheumaticus* appellatur, 2. Gl. c. 2.

Rhexis, id est, *ruptio*, ab ictu, vel alia quapiam causa, violenta, in alto, tota subinde membranas diuidens, & per sæpè humores, quibus videndi facultas administratur, effundens, lib. Intro. l. cap. 15.

Rhodinum, vide *Oxyrhodinum*.

Rhodomeli, id est, *mel rosaceum*, quod aliquando simplex, interdum purgatorium paratur.

Rheas,

Rhœus, siue *Rhyas*, *ῥῥῆς*, seu *ῥῥῆς*, vide *Encanthis*.

Rhegme, est ossis ruptio, siue interruptio, per superficiem recta, vel angusta, vel lata, lib. finit. *ῥῥῆμι*, est diuissio caluarie superficialia, vel profunda quidem, sed eatenus vt fractum os loco non moueatur; differentia est fracturæ capitis, vt est apud Paulum, lib. 6. c. 90.

Rhopalosus, *ῥῥοῦλος*, concretio est summorum pilorum indiuisibilis, ueluti in baculos, qui etiam amplius non crescunt, lib. finit.

Rhus, profluvium feminarum propriè apud Medicos significat, fluente sanguine assidue penè & inordinate per uterum; longèque diuersa fluxio est ab ea, qua fluit sanguis per uterum mensuris periodis; cum illa præter naturam sit, hæc verò, secundum naturam; Morbi nomen est *ῥῥῆς γυναικῆς*, fluxus muliebris. Additur autem nomini coloris diuersitas, vt intelligatur quis humor fluat, dicendo *ῥῥῆν ἄλκον*, vel *ῥῥῆν ἐρυθρον*.

Rhyas, est oculorum vitium, quando meatus, qui ab oculis in palatum desinit, vel obstructus, vel conuiuens, excrementa, non ad loca conlueria transmittit, sed in oculos regurgitare permittit, com. 2. in 6. de morb. vulg. 32. vide *Rhœus*, & *Encanthis*.

Rhydopea medicamenta sunt, quæ à sordium similitudine; quasi strigmentosa nominantur, 2. de comp. med. per gen. cap. 1.

Rhyptica, *ῥῥυπτικά*, siue *extergentia medicamenta*, nominantur; quæ in superficie, siue in cute, siue in ulceribus *ῥῥῆπον*, id est, *sordem*, auferunt; quæ verò altius Poros ab excrementis expurgant, ea *Ecpractica*, & *Ec cathartica* (quasi expurgantia, & ab infarctu liberantia dicas) appellantur, 5. simpl. 12. Quæ tergent, alia imbecillius, alia vehementius id agunt. Modicè detergent farina fabarum, hordei, ciceris, semen lini torrefactum

saccharum, oxymelli, magis, terebynthina, thus, mel de-
spumatum, amygdalæ amaræ: valentius, erui farina,
semen hormini: radix ireos & panacis, nitrum vsum,
nitri spuma, fictiles testæ, pumex, buccinorum & pur-
purarum, & cæterorum ostræorum testæ vltæ, tæitæ, te-
nui cribro cretæ, quorum quidem aliqua tam valenter
tergent, vt etiam pilos tenuent; sed hæc improprie
semitæ appellantur. Quæ verò proprie & speciatim
dicta sunt, tergant tantum, non etiam obstructa libe-
rant, quia sunt amaris imbecilliora, falsa scilicet & dul-
cia: quæ autem valenter detergent, omnino etiam di-
gerunt & ob id valdè siccant.

Rhythmus in pulsu, est proportio temporis ictus, ad
tempus quietis, 1. de diff. puls. cap. 7. Cum pulsus constet
quatuor partibus, duobus scilicet motibus, & gemina-
quiete, sibi inuicem perpetua quadam serie succedenti-
bus, eorum inter se proportio comparatioq; *Rhythmus*
est: Eum omnis pulsus habet, sed varium. Suus enim est
cuique naturæ, ætati, anni tempore, sexui, & reliquis:
quem quidem qui seruat, is *εὐρυθμὸς* dicitur, qui non
seruat, *ἀρρυθμὸς*.

Rigor, *πρῶτος*, est insiti caloris exagitatio, cum sensu
doloris subita & vniuersim facta, lib. de tremor. conuuls.
cap. 6. nominaturque etiam *Rigor*. Nervorum conuul-
sio, & Tetanos, 3. loc. affect. 10. Est autem proprie sic di-
ctus, concussio, & commotio inæqualis totius corporis
a tenui & magis acri, copiosiorique humore, quam qui
in horrore peccet, 3. sanit. tuend. 5. & 1. de sympt. caul.
cap. 8. vide *Frigus & Horror*.

Rigor sine febre, nonnullis quidem accidit semel, non-
nullis autem per vices interpolatas multorum spacio
dierum interiecto, vel a principio vsque ad finem con-
tinuatur; aut est ita omnino exiguus, vt neque adesse

videatur, cum se quieti tradiderint, sed cum moueri cœperint, tunc demum eum sentiunt; aut etiam, sine motu molestus accidit, pituita humore redundante, sed non putrescente; quando autem hic humor etiam potuerit, non modo rigent, sed etiam febricitant ægri, 2. de diff. febr. c. 5.

Rob, vide *Succum medicatum*.

Ros, tertia est humiditatis species, unde partes nostri corporis nutriuntur, quæ continetur in omnibus animalis partibus, ceu *Ros* quidem per earum substantiam spersus, 7. meth. 6.

Rotula, vide *Patella*.

Rubra bile, vide *Bilis pallida*.

Ructus, est flatus excretio per gulam; cum & alius fit, qui per intestinum rectum secernitur, comm. 5. in 6. de morb. vul. 4.

Ruptura, vide *Vnionis solutio*.

S.

SACEVS, vide *Cæcum intestinum*.

Sacer morbus (ἱερανόσος, id est, *Epilepsia*) dicitur, quod eius magnitudo designetur; *Sacrum* enim apud Antiquos, significat magnitudinem; alij verò *sacrum* dici putant, quod diuinus esset, & à Diis in peccatorum vindictam mitteretur; quos Galenus reprehendit, lib. 2. de caus. sympt. cap. 3.

Sacer ignis, id est, *Erysipelas*, lib. de purg. med. facult. licet Celsus, *Ignem sacrum*, paruum vlcus existimet dici.

Sacrum os, vide *Dorsum*.

Sagittalis sutura, vide *Obelæa*.

Sahafatum, apud Auicennam, & Plinium, manantis capitis

capitis ulcera nominantur, quæ Græci ἀχόρας & χήρα.
Aliabbas, tinea sub quo & *ficus*, & *ψύψα*, &
εὐαθιμαδα collocavit, nominant.

Salsa pituita est, quæ ab alieno calore computruit, 2.
 de natur. fac. cap. 9. & *lalsa* redditur, aut propter putre-
 dinem, aut propter sallæ serosæ humiditatis admistio-
 nem, 2. de diff. febr. cap. 6.

Salus, qui & *Palpitatio*, & *Palmos* dicitur, 2. meth. 2.
 vide *Palpitatio*.

Saluatella vena, est ramus venæ axillaris, media per-
 currens inter medium digitum manus, & auricularem,
 5. de anat. adm. cap. 5. & lib. de anat. vii.

Salubre corpus, simpliciter est, quod ab ipso naturæ
 ortu, bonam habet temperataram, in simplicibus &
 primis particulis, atque in iis, quæ ex illis componuntur,
 instrumentis, est probe conformatum & commensura-
 tum, lib. art. med. cap. 4.

Sanguificatio, quæ & *Hæmatosis* nominatur, est mu-
 tatio alimenti, in sanguinem, lib. finit. vide *Attrahens*,
 & *Hepar*.

Sanguifluas venas, eas appellat Hippoc. quæ magnæ
 sunt, quibus ruptis, insignes sanguinis eruptiones con-
 tingunt; id quod ex parvis euenire non consuevit: nam
 & paucus ex huiusmodi sanguis effunditur, & citò ad
 oras diuinas coalescit, nocumentumque non affert, 2. de
 fract. 24.

Sanguinarium medicamentum (quod & *glutinatorium*,
cruento opitulans; Græcè autem *Εναιον* dicitur) est,
 quod vulneris oras committere, & glutinare molitur,
 3. de compos. med. per gen. c. 2. vide *Glutinatorium*.

Sanguinis cordi ventriculus, dexter ipsius est thala-
 mus, per cuius orificium vnum sanguis in cor intromit-
 titur, per alterum autem, ex ipso in pulmonem deduci-

tur: alius cordis ventriculus sinister, *spirituosus* nominatur; per cuius prius quidem orificium cor iis, quæ in pulmone sunt, arteriis; per posterius autem omnibus, quæ per totum animal sunt diffusæ, arteriis cor est continuum, 6. de usu part. 7.

Sanguis, nunc lumitur pro omni in venis concluso succo (in quo pituita scilicet, vtraque bilis, & tenues ferrosique liquores continentur) nunc pro quarta substantia, è directo reliquis humoribus opposita, quæ propriè *sanguis* dicitur, & è cuius exuberantia tota massa nominatur, comment. 4. in 5. de morb. vulg. 29. & comment. 2. in 6. de morb. vulg. 38. & lib. de multitud. cap. 10.

Sanies, vide *Sordes*.

Sanitas partium similitudinum, est calidi, frigidi, humidi, & sicci symmetria; *dissimilantium* verò, compositio, numerus, magnitudo, figura conueniens, 1. de sanit. tuend. cap. 1. & 4. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 3.

Sapa, quam alii *Siraon* vocant, est mustum plurimum coctum; sunt qui & ficuum siccatum decoctum ita nominant, lib. de attenuante diætâ, cap. 12. vide *Apothermus*.

Saphana vena est, quæ desuper ad partem cruris intimam descendit, quæ descendendo occultatur, donec partem super malleolum interiorem attingere incipiat, lib. de anat. viu. vide *Malleoli vena*.

Sapor, vide *Chymus*.

Sarcocoele, σαρκώδης, est morbus testiculis induratis conueniens, quod si aquosus humor in tunicis, quæ circa testiculos sunt, aggregetur, *Hydrocele*, omentum autem & intestina, quod si eadem in loca illabantur, *Epiptocoele*, & *Enterocoele* dicitur, lib. de tum. c. 15. *Sarcocoele* verò simpliciter *Ranex* dicitur, 14. meth. c. 17.

Sarcoma, est carnis in naribus aut aliis partibus præter naturam auctio, differens à *Polypo* magnitudine, opificio, & forma, lib. finit. Est autem *Polypus* quidem *sarcoma*, non contra. *Polypus* enim similitudinem piscis *Polypi* gerat oportet, cum *σάρκωμα* informe sit potius carnis incrementum.

Sarcophalon, incrementum carnis est, præter naturam in umbilico, vel mitis, vel malignæ, lib. finit.

Sarcofis in utero, est carnis ibidem prognatæ & collectæ expullulatio, quam, si magna sit, recidere conuenit vellicatam scalpris, quò celerius emoriatur; sin parua, protinus tollere, lib. finit. vi setur proinde nihil aliud esse, quam mola.

Sarcoticum medicamentum est, quod carne vlcus implet, 3. method. 2. Nam quamuis carnis generatio naturæ opus esse videatur, iuuatur tamen illa quidem plurimum in replendo vlcere medicamentis, quæ modicè calefaciunt, moderatè detergent & purgant, atque minimum siccant, nulloque modo adstringunt. Talem namque *σαρκωτικόν* facultatem esse oportet. Carnis enim generatio fit, cum & membrana ipsa quibus adnasci vel circumnasci caro debet, in calore & frigore temperata fuerint, & sanguis qui illuc affluit, tum qualitate salubris, tum qualitate moderatus. Verùm calidiora paulò ipsa carne esse oportet *sarcotica*, qui sanguinem attrahant; neque villo modo adstringere oportet, ne quod influit, repellant, sordemque vlceribus arctius affingant; minimumque siccare, ne absumant, sed modicè prorsus siccare quo in carnem densetur. Detergendi autem purgandique vi prædita esse decet, ne mala caro & vitiosa gignatur, si quid sordis & vitij in sanguine relictum sit, sed citra omnem morsum, & acrimoniam.

Satyriasis, & Satyriasmus, vide Priapismus, & Elephas
Scabies, vide Psora.

Scabies oculi, est summorum genarum, angulorumq;
 oculi erosio, cum pruritu, quam acerrima flexio progre-
 gnit, lib. finit.

Scalpella, vide Laminæ.

Scalptum vocant frictionem, motumque per ungues
 effectum, quod in prurientibus particulis animalia na-
 turaliter faciunt, idque in ipsis omnibus reperitur, com-
 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Scamnum Hippocraticum, vide Hippocraticum scam-
num.

Scaphoeides, id est, *Os navicularè*, siue *naviforme*, est os
 profundo sinu excavatum. Tali caput anterius & ob-
 longum excipiens; sic dictum à Scaphæ similitudine; ca-
 vitationem enim habet oblongam, Scaphæ similem, in-
 quam simile caput Astragali, seu Tali, intra se admittit;
 vide *Cubiforme*.

Scapulae, sunt ossa in dorso post thoracem sita; cum
 osse occipitis, spinaque thoracis; costis, & osse, quod
 gutturi præjacet, musculorum operam copulata, lib. de
 ossib. cap. 14. quæ & *Omoplate* dicuntur, lib. Introd. cap.
 10. vide *Omoplate*.

Scarificatio, est cutis incisio, lib. de cucurbit. cap. 4. vi-
 de *Encharaxis*.

Sceletos, σκελετός, quasi cadauer assicatum & aridum;
 est ossium humani corporis inuicem cohærentium uni-
 uersorum uniuersa compactio, lib. de ossib. in præmio;
 & 1. de anat. adm. cap. 1.

Scelus, crus, pars est corporis organica, à coxæ illic
 ad imum pedem protensa, præcipuum ambulætionis
 instrumentum, cui innitimur; in femur, tibiæ, & pe-
 dem paruum diuiditur. Quod enim in manu cubitus,
 id,

id in crure tibia; & quale in manu brachium, tale in crure femur est; quodque in manu manus extrema, id in crure pes est.

Scelotyrbe, quasi cruris turbam, vel perturbationem, dicas, species est resolutionis, qua erectus ambulare homo nequiens, latus quandoque sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert; interdum quoque pedem non attolit, sed attrahit, velut ij, qui magnos cliuos ascendunt, lib. fin. Nomen hoc, ut & morbus ipse, cepit primum Germanici tempore, cum trans Rhenum exercitum duxisset. Vitio enim aquæ milites, ut ait Plinius, duobus mali tentari ceperunt, quæ Stomacacem & Scelotyrben vocarunt. Ante hæc tempora nomen hoc a Græcis usurpatum non reperies.

Sceptica, est illorum Medicorum Schola, qui nihil sciri posse dicebant, lib. an sanguis in art. nat. cont. c. 5. atque in singulis rebus hærent, atque hæsitant, libel. de subfig. emp. cap. 1.

Schesis, id est, *dispositio*, est, quæ faciliè discutitur, ut calefactum in sole lignum; ex aduerso ei affectioni, quæ ægrè soluitur; lignum E. G. quod igni eatenus excalefactum est, ut iam accendatur, & fumum edat, 8. method. cap. 1. *Schesis* quoque aduentitius corporis habitus dicitur, 3. de caut. pull. c. 10. vide *Affectus*.

Schetica febris est, quæ faciliè discutitur; è contrà, *Hætica*, quæ difficulter soluitur, 8. meth. 1.

Schetron, exquisitum victum vocat Hippocr. *Phaulon* autem, victum simplicem ac vulgarem; Medium autem, *Hypophaulon*, id est, *Subvulgarem*, nuncupavit, 1. fract. 45. Galen. σκεδρόνιονibus dici vult τὸ ἀκριβές, exquisitum & accuratum, & σκεδρὸν διαίταν Hippocrati ἀκριβῆ exactam victus rationem, eique oppositam τὴν φαύλην, ἢ ἀπλήν.

Schidacedon, est diuifio per longitudinem facta, conueniens fractis offibus, quæ non omninò separantur a fe inuicem, fed veluti per rectitudinem finduntur: veluti *Cauledon*, diuifio eft per tranfuerfum facta, 6. meth. cap. 5.

Scindapfos, vide *pituia*.

Scirrholis, eft liuefcens, & crefcens caro, ex vehementia diuturnæ inflammationis orta, lib. Intr. c. 5.

Scirrhum, tumor eft durus, qui fine dolore eft, non tamen omni line fenfu; talis enim fanabilis non eft. Sunt qui eos duntaxat, tumores præter naturam, qui omninò infenfibiles funt, *Scirrhus* appellandos cenfeant; reliquos, non *scirrhus*, fed *scirrhofos tumores*, 14. method. cap. 6. *Exquifitus* verò *Scirrhus* nominatur, qui omninò durus, fenfusque priuatus eft; qui verò non omninò infenfibilis eft, & difficulter fenfit, ex humore lento, & craffo, qui partibus, quæ indurantur, tenaciter infigitur, non *exquifitus*, 2. ad Glau. 4. Durities propter humoris ficcitatem craffitiei que accedit. Doloris autem fenfus abeft propter craffitiei & lentorem. Vbi enim craffus & lentus humor inania partis alicuius fpacia lubierit, & neruos neruofaque alia corpora repleuerit, facile viam intercludit fpiritui animali, à quo vis omnis sentiendi proficifcitur, gummi inftar omnia, quibus inciderit fpiracula oblinens atque obturans. Si humori melancholico flauæ bilis portio aliqua remiffa eft, aut fanguinis, aut pituitæ, iam non abfolutè *scirrhus*, fed *eryfipelatodes*, aut *phlegmonodes*, aut *œdematodes* dicetur. Quo factum eft, vt priori definitioni à veteribus traditæ, Medici recentiores humoris fpeciem addiderint, definiētes *scirrhum* tumorem effe præter naturam ab humore melancholico durum fine vilo doloris fenfu. Cùm enim quatuor genera funt tumorum fim-

plicium,

plicium, à totidem humoribus pariter simplicibus prodeuntia, ut sanguis phlegmonem, pituita œdema, flaua bilis erysipelas parit; ita scirrhus ab humore melancholico originem ducere, dicendus est, neque humoris species in eius definitione omittenda est, quod non minima pars sit eius substantiæ.

Scleriasis, id est, *durities*, est tumor palpebræ cum rubore, & dolore; difficile tollitur, & durat magis, quam inflammatio, lib. Introd. c. 15.

Scleroma, *durities*, tumor est duriusculus, qui in parte vulvæ aliqua nascitur; fitque plerumque ex phlegmonis, quæ diu permansit, induratione, lib. finit.

Sclerophthalmia, id est, *dura lippitudo*, in qua oculus durior, ad motum pigrior, dolens, rubicundus redditur, palpebræque similiter duriores, siccioresque redduntur, post somnum aperiri facile non possunt, vel inuerti, propter duritiem: differt à *Xerophthalmia*, sola magnitudine doloris, duritiei, & siccitatis, quod hæc sicillafatis imbecillior.

Sclerostunica, vide *Retina*.

Sclerantica pharmaca, id est, *indurantia medicamenta*, quæ duritiem corpori inducunt; quod tribus auxilijs præstat; congelatione, siccitate, & repletione, ac tentione.

Scoliosis, vide *Cyphosis*, & *Obstipitas*.

Scoptula, vide *Omoplata*.

Scotodinos, hoc est, tenebricosa vertigo; cum enim caput circumagi vi letur. *Dinos*, siue *Vertigo* nuncupatur, cum insuper & tenebricosa fuerit visio, *Scotodinos*, hoc est, *tenebricosa vertigo*, affectio appellatur, fit autem ob inordinatam spiritus fluctuosi motionem; qui vel in capite primam suam habet generationem, vel sursum ex infernis fertur partibus, 4. acut. 42. Est ergo

Scot.

Scotodinos, seu *tenebricosa vertigo*, quando simul res conspectæ videntur circuinuolui, & sensus visus repente obscuratur, & ægrotus sibi tenebras circumfundi opinatur, 4. aphor. 17. Idem affectus, & *Scotomia*, & *Scotoma*, & *affectus scotomaticus* appellatur: ex ipsa appellatione qualis sit apparens, quippè a parva occasione bebentantur ij, qui sic laborant, adeò, ut interdum cadant, maxime si aliquando in gyrum rotentur, seu alium quempiam rotari viderint: siue rotam, aut id genus aliud quippiam, aut ipsos quoque, quos vocant in aquis vortices, circumagi viderint, 3. loc. aff. 8.

Scotomia, *Scotoma*, *Scotomaticus affectus*, vide *Scotodinos*.

Scrofula, quæ & *Struma*, *Chærades*, & *Parotides*, & *Eparmata* dicuntur, sunt apostemata secus aures, lib. de med. fac. part. cap. 11.

Scrotum, est tunica crassissima extrinsecus testiculos ambiens, lib. Introduct. cap. 10. quod & *Scortum*, & vulgò *Bursa testium* dicitur; multis rugis & media lutura distincta, Græcè *σχῆλον* vel *σχῆλον*.

Scutiformis cartilago, vide *Cricoides*.

Scybala excrementa, sicciora, & quasi in nucleum formata, combusta scilicet a visceris phlegmone, sunt *σκιβάλα*, 4. acut.

Scypho, vide *Choana*.

Scyros, id est, *Callus*, & *Porus*.

Scytalides, vide *Digit*.

Sebum, siue *Seum*, est oleosa, & pinguis substantia adipe siccior, & magis concreta, compactaq. eiusdemq. interim cum adipe generis, (vtrumque enim sanguis est concoctus, ex nutrimenti bonitate) nisi quòd *Seum* fragile usque quaque sit, nec ad ignem admotum tam facile lique scat, & cum refrixit, denuò concre scat, ut ovis, & capræ,

capræ, *pinguedo* autē liquidior sit, minimèq; apta, durari,
oleo, longa vetustate incrassato similis, vt equi, & suis.

Secunda, siue *Secundina*, vide *Chorion*, *Retiforme*, &
Retina.

Secundiformis tunica, Græcè *Choroëides*, vide *Choroëides*.

Secundum naturam fieri, cum multis modis dicatur, in
eum tamen sensum frequentius accipiendum est, vt si-
gnificetur, quod prima ratione à natura sit, & quasi finis
ab ea intenditur, non quod ex cōsecutione quadam aliis
succedere consuevit; talis motus secundum naturam est,
cum ex se aliquid, insitaque natura sua mouetur: vt, mo-
tus cordis, qui in pulsibus sit, est operatio, & ea quidem
secundum naturam, qui verò in palpitationibus sit, is &
à corde fit, sed p.n. à causis morbidis exagitato, vnde,
etiam Palpitatio affectio est, & ea quidem præter natu-
ram, 6. de placit. cap. 1. *Præter naturam* autem quicquid
est, aut affectus sunt, à quibus functio leditur, aut causæ
horum, aut symptomata, 3. de prælag. x p. 1. cap. 1.
differtque ab eo, quod est, non naturaliter se habere, 8.
meth. cap. 9.

Sedes, vide *Visionis solutio*.

Sedimentum, sit id, quod in vrinæ parte infima subsi-
det, lib. de vrinis, cap. 16. Quod si ad supremam superfi-
ciem terminatur, dicitur *Nubecula*; si ad mediam regio-
nem, *Suspensum*; si profundiori parte, inferioreque
occupat locum, *Hypostasis*, bid. c. 21.

Semeiosis, vide *Annotatio*.

Semeiotica, hoc est, *Adnotatrix*, medicinæ pars est,
quæ de signis salubribus, insalubribus, & neutris agit,
curationi morborum per victum, summe necessaria,
præterita, præsentiaque symptomata ad morbi causam
inueniendam, & ad prælagendum, diligenter inspi-
ciens

cious, lib. Intr. cap. 8. *Συμμετρικὴ* pars est medicinae signorum omnium differentias & vires expendens. Cum autem signa multipliciter dicantur, ut Galen. in arte parua scripsit, certum est ad istam partem omnium cōtemplationem pertinere, sed eorum maximè, quibus per morbos & præterita inuestigamus, & præsentia cognoscimus, atque futura prænidemus, uti ab Hippocr. proditum initio, lib. prognost.

Semen, ex Aristot. est quædam pars utilis excrementi, à quo, & ex quo singula foetus membra efformantur, 1. de sem. c. 14. Alij, *semen* nihil aliud esse dicunt, quam sanguinem à venis; quæ ipsum continent, exquisitè confectum, 2. de sem. cap. 2. quod & *genitales vires* vocat, 1. prognost. 42.

Semicōctos humores appello, qui à ventriculi calore alterationem perpeffi, nec tamen perfecte ab eo superati fuerunt, 4. simpl. cap. 5.

Seminarij meatus, vide *Parastata*, & *Glandulosi affistentes*.

Semisyderatus homo, vide *Syderatio*.

Semitertiana, quæ *hemitritæus* dicitur, est febris, quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente fit, 2. de differ. febr. cap. 7. vbi sequentem in modum de hac febre loquitur: frequenter febris secundum suam ipsius naturam, ex intermittentium genere est, ut tertiana; complexus autem quotidianæ febris, nullum integritatis tempus, priori circuitu relinquit, dum secunda accessio, antequam prior absoluat, inuadere anticipet; hanc ergo febrem, compendiosæ, claræque doctrinæ gratia, vno volens appellare vocabulo, imposui ei nomen *Semitertiana*, lib. de morb. temp. cap. 8. Sane nonnulli aiunt, *Semitertianam* ita nominatam fuisse, veluti semicirculum, ipsam tertiani circuitus dimidio

dio minorem esse afferentes. Alii dicunt, *Semitertianam* appellatam fuisse ideò, quòd dimidio tempore tertianam superet: vt si tertiana accedat ex duodecim horis componatur, semitertiana duodecim ipsas; horas tertianæ in sefe comprehendat, eisque dimidium duodecim horarum addat; vniuersæque simul euadant duo leuiginti, lib. de Typis 4.

Senecta serpentum est, crassissimus quidem lentor, & velut membrana, ex diuturna latitandi mora, hyemis tempore, sub cauernis terræ contracta, temporis longitudine potius, quam senescentis ætatis vitio facta, de Theriac. ad Pison. cap. 13.

Senes, à decrepitis nonnulli Hipp. sectatores distinguunt, nomē *seniorum* vltimæ ætati tribuētes, *senes* autē in priori ætate statuētes, quæ media est inter iuuenes & seniores. Aliquando *senes* vocat eos Hipp. qui extremam agunt ætatem, 2. aph. 31. estque id, quod proprie omnes homines *senectutem* appellant, non aliud, quam siccum & frigidum corporis temperamētum, annorum multitudinis ratione comparatum, 5. de tuend. san. c. 9.

Sensifici nerui, vide *Nerui sensifici*.

Sensus indigentia, est sensus tactus exquisitissimus, soli ventriculo, & maximè ori eius superno, per coniugationis sextæ: neruos molles, concessus, ad cibum lumendum animal ipsum excitans, & stimulans, 4. de vsu part. cap 7. qui *fames* nuncupatur, lib. 5. cap. 8.

Sensus vitiosus est omnis, qui perperam obitur, & oblatrus est, quando scilicet proprium sensibile non aut omnino sentitur, vel cum vitio sentitur, vel diminutè, vel deprauatè, & sub specie peregrina percipitur, vt in auditu surditas, auditus grauitas, obauditio: in visu cæcitatis, visus obcuritas, & deprauationes quædam, lib. de sympt. dist. cap. 3.

Sepedonodes, id est, *putredinosos*, Græci vocant eos, qui ad putredinem sunt proni, & dispositi, 8. method. cap. 7. *Συπεδονώδης*, *putredine vitiatus*; *Σηπεδών*, *putredo* est, & *σηπεδῶνες* humorum collectiones & putrilagines quacunque in parte corporis redundant. Siue enim ad intestina descendunt, & illic putrescant aut corrumpantur, putrida intestinorum vlcera gignunt, vel dysenteria, quales *σηπεδῶνας* exponit Philotheus; Celsus, cap. 1. lib. 2. Cancros vertit; Gal. humorum in venis putredines intelligit, unde oriuntur febres putridæ. Quod si fuliginosa & serosa excrementa putrescant in habitu corporis, cutis affectiones putres suboriuntur, vt Alopecia, Ophiasis phthiriasis, furfures, cutis putrilaginosa, & maligna vlcera, & carniū corruptiones.

Septa, quæ & *Septica medicamenta* dicuntur; sunt omnia, quæ tūm eliquare, tūm colliquare, ac potissimum carnem tenellam consumere ferè absque dolore possunt; huiusmodi sunt Arsenicum, Auripigmentum, Sandaraca. Chrylocolla, Aconitum: Vocantur autem *Septica*, seu *putrefacientia cum putredine*; symptomatis autem similitudo, vt sic appellemus, efficit, inter hæc autem numerantur & *Catharetica*, hoc est, *Detractoria*; quæ extimam modò superficiem, quam tetigerint, detrahunt, & conficiunt, non tamen in altum subire corporis & sæuire valent; vt, Alumen, Galla, Omphacium, *Æs* combustum lotum, 5. simpl. 15.

Septum transversum. vide *Diaphragma*.

Serapium, vocat Actuarius potionem eam, quam hominē *syrupum* voce magis barbara nominant: sic verò vocant, quando medicamentosi succi & liquores, cum melle, vel saccharo, donec concreuerint, coquantur. Diuidunt *Seplasiarii syrupum* in breuem, & longum; *breuem*, quod parū aquei humoris in se habet, appellant,

lant, alioque nomine *communem* vocant, *longum*, quod humoris aqueis multum obtineat, nominantq; alia voce *decoctum*; quin & diuidunt in *communes*, & *magistrales*.

Serosum recrementum, uide *Ochema*, τροφή.

Serpigo, uide *Herpes*.

Sesamoeidea ossa, à sesami liguminis minuti (specie) sic dicta, quæ multis manuum, & pedum articulis, natura ex abundanti, velut auctarium circumponi, securitatis gratia, 2. de usu part. cap. 12.

Sesilis verruca, uide *Formica*, & *Myrmecia*.

Sextans, pendet vncias duas, 4. de comp. med. per gen. 14. *Sextarius* pendet heminas duas, quartarios quatuor, acetabula octo.

Sicca, & *valida frictio* est, quæ corporis foris adhibetur, ad curandum quodammodò lassitudinem nullo humido, aqua videlicet, vel oleo, foris corpori circumfuso, 7. simpl. cap. 25.

Siccus hydrops, uide *Hydrops*.

Sief, uide *Collyria*.

Sielismus, Σιελισμός est saliuæ copiosissimæ; in os affluxus, siue ab humidiori capite in glandulas, ad radicem linguæ fitas; siue à ventriculo, multa pituita redundante, quæ ex eo secundum gulam in os prorepiat, & refluat multoties, etiam absque motu, 8. de compol. med. loc. cap. 4.

Sigmoeides apophysis, dicitur processus unus Omoplatæ, quod instar antiquæ Græcorum litteræ C, cauus sit, qui & *Ancyroide*, & *Coracoeides*, appellatur. Dicitur & hoc nomine sinus seu cauitas semicircularis in cubito, inter duas cubiti apophyses comprehensa, in quam brachii extremum, trochææ simile, inseritur. Refert quoque figuram G. vnde σγμαειδής, vel σγμαπειδής appellatur.

Sigmoeides membrana, seu *cartilagine*, sunt tres tunicae

nicae, quæ in venæ cordis arteriosæ orificio videntur, quæ pulmonem alit, intus foras spectantes, quas à figura græcæ literæ Σ, (qui accuratius tractarunt Anatomicas) *Sigmoeides* appellarunt, 6. de usu part. 14. *Sigmoeides* quoque dicuntur, cartilaginum asperæ arteriæ extremæ partes, quæ Sigma literæ figuram referunt, 4. loc. aff. 6. vide *Circoeides*.

Signa aliqua mala sunt, tum vt signa, tum vt causæ: vt signa quidem, quoties ex difficilioribus fiunt affectionibus; vt causæ verò, quoties ipsa rursus alias committunt & concitant prauas affectiones, pessimaque inducunt symptomata, prognost. 49.

Signa indicatoria, vide *Decretorius dies*.

Significatio febris, vide *Insultus accessionis*.

Sinæ hepatis pars, est concava ipsius pars, qua ex parte prodit vena porta; Vnde per Masaræi venas alimentum à ventriculo, primisque intestinis iecur attrahit; cuius opposita pars, *convexa* & *gibba* nuncupatur, 4. de usu part. cap. 13.

Similare membrum (quod & simplex, homogeneous, & prima corporis particula, quæ ex primis constat elementis, & ex qua partes organicæ conflatae sunt) est, cuius quamcumque partem sensibilem sumptis, erit illa toti similis in nomine, & definitione, sicut os & caro de anat. viii. cuiusmodi sunt arteriæ, venæ, nerui, ossa, cartilago, ligamentum, membrana, caro, lib. de morb. diff. cap. 3. vide *Instrumenta*.

Simplex morbus, vide *Compositus*.

Simplicem febrem vocat Hippocrates quæ mitis est, & cum signis tutis cum primis: sic dicitur *Febris ephemera*, 1. cris. 16.

Sinapismus, est medicamentum vehementer calidum, ex sinapi compositum, capiti conueniens, 3. loc. aff. 4. *Simplicissimus*

plicissimus quidem ille est, qui solo sinapi constat, trito & appposito: quo tamen non contenti Veteres sinapismū ita præpararūt; fici pingues tepida aqua pridie macerabantur, postridie manibus diligenter expressæ contundebantur: deinde sinapim quā acerrimam, qualis est Syriaca vel Ægyptia, priuatim terebāt, adiecto interim ficuū cremore, quo facilius teri posset, nec tamen aquosum euaderet, postremo in offas simul hæc cogeabant. Si sinapismum vehementiorem facere fuisset in animo, binas sinapis portiones ad vnā ficuum addebant: sin inualidiorem, contrā, si moderatum, æquas vtriusque partes cōmiscabant. in mollioribus autem corporibus sensuque præditis, exquisito, & in quibus circa superficiem affectio est, panē pro caricis miscebāt, aut ipsum sinapi accot. macerabāt, antequam detereretur, quo magis domaretur eius acrimonia, quod aceto vis sinapis frangatur. Ita paratus sinapismus vel illiniebatur, vel linteo exceptus admovebatur, & quantū opus est sinebatur. Temporis autem spatium certo definire non licebat; Quare frequenter leuandum erat cataplasma, & considerandū, an subiecta pars ruborem contraxisset, præsertim si sensu hebetiore prædita esset. Quod ut celerius fieret, partem ipsam spongiis aqua calente madentibus fouebant, incumbente adhuc cataplasmate, nec soluto: deinde, ubi satis calere, rubere, & tumere videbatur, sinapismū eximebant, post, in balneū ducebant, deinde rosaceo partem illiniebant, aut hapso lanæ rosaceo & aqua imbuto, vel malua cocta tritaque cum pane integebant, donec nihil ex sinapismo mali superesset. Efficacissimum est remedium longis & deploratis ferè valetudinibus, cum iam inueterati morbi cæteris præsidii non cesserunt. Pollet enim plurimum aduersus vetustos capitis dolores, hemicranios, lethargicos, comitiales, in sania, verti-

gines siue capiti, siue cruribus admoueat. Valet & ad orthopnoëas, asthmata, longas tussis thoraci impositus. Diuturnis stomachi & intestinorum affectionibus inapetentiæ, ilchiadi, arthritidi, paralyfi, perfrictionibus, quæ calori non cedunt, ineditur. Sed modum adhibere oportet, desistendumque a medicamento cum locus iam multum intumuit, & inflammatione cingitur, caro turgens succrescit, & cicatricosa liuet, & post balneum pustulis leniter exasperatur: neque est committendum, vt partem sensus deficiat ardore nimio victam & velut obstupentem. Non autem id remedii genus adhibendum acutis morbis, in exulceratione pulmonis, aut alterius internæ partis vel externæ, quod vlcera sinapis acrimonia irritentur, vt nec particulis cartilagineis & carne viduis, quoniam sinapisimo facile vrantur & nigrescant.

Sinciput, est anterior capitis pars, supra frontem sita, capillis intacta, lib. Introd. c. 10, vide *Bregma*.

Singultuosa febris est, in qua ægri singultiendo rodentem, acerrimumque humorem vomunt, a quo tamen symptomate febrientes sunt liberati; verum febris huiusmodi, nequaquam *singultuosa* dici debet, nisi *singultus* per totum morbum, simul cum febre, ægrum excrucietur, 4. acut. 69.

Singultus, *σύνχτης*, est veluti conuulsiva quæ iam oris ventriculi affectio, quoties illud ex humorum copia grauat, vel mordetur, vel propter frigiditatem contristatur, com. 1. in 1. prorrh. 23. Accedit etiam ex iunmo lerata inanitione, 4. acut. 69. Non autem *Singultus* est vera conuulsio, vt potè quæ in solis musculis accidit; ventriculus autem nec inusculus est, nec eius os, 3. de caus. sympt. cap. 2.

Sinus, qui & *Vomica*, est solutio continuitatis in car-
nosa

hosa parte: fit cum sanguinis quadam in mediam regionem, partim inanem & porosam affluxione; id quod abcessu, & sinui commune est; pars affecta, in exteriori summitate occlusa, os nullum habet, & abscessisse ipsa dicitur à subiectis partibus, cum eiusmodi in ipsam quædam fit fluxio; affectio verò *abscessus* propriè, siue *apostema* vocatur; at ubi aliqua ex parte aperta est, vt, qui continetur, humor inde excernatur, non amplius *abscessus*, sed *sinus* iam appellatur, 2. de his quæ in med. 27.

Sinus rectus appellatur, cuius os in inferiore parte, fundum in superiore est; *obliquus*, scilicet in latus declinat. Fiunt contrario etiam modo *sinus*, quibus deorsum fundum, sursum verò os vergat; quibus neutiquam fundum quò facilius sanici exitus pateat, aperimus, 2. de his, quæ in medic. 28.

Sinus vulua, vide *Cornua*.

Siraon, vide *Apothemas*.

Siriasis, est inflammatio Cerebri, & membranarum eius, quam consequuntur sincipitis, & oculorum cavitates, febris ardens, pallor, totius corporis siccitas, & inappetentia. Morbus hic infantium proprius esse dicitur, cui nomen inditum est à sincipitis cavitate: *σινρις* enim, Græci appellant foueam: in qua semina recondunt, & asseruant. Scribitur & *σινρις*.

Sitis, Græce *διψα*, potationis desiderium est, idest, appetitus frigidi, & humidus.

Solidas corporis partes, vocant Medici ossa, nerues, cartilagines, ligamenta, tunicas, musculos, membranas, arterias, lib. Denotatio dogmatum Hippoc. quas etiam particulas, *Elementares*, *Similares*, & *simplices* appellant, 1. de natur. fac. cap. 7.

Solutio morbi, simpliciter est illa, in qua vel virtute, vel morbo, sensim emoriente & deuicto, vel morbus,

vel finitur, tertio de cris. primo.

Solutus, est, & dicitur *paralyticus*, qui laxatos habet articulos, 5. de comp. med. per gen. cap. 2.

Sopientia, vide *Anodyna*.

Sopor, alias, *Coma*, propensio, delatio in somnum est cum vigilare ægri nequeunt, non habentes apertos oculos, sed conuenientes, alto somno, vel tenui, quin & vigilijs detinentur, idq; accidit, vel humectata plus nimis ea parte cerebri, quæ sensus fons est, vt in ebriis, vel eiusdè intensissimum ob solum frigus; aliquando ob verumque, quin & propter virium imbecillitatem adeò iam emorientium, vt apertas palpebras moribundi seruare nequeat, com. 1. in 3. de morb. vulg. 7. vide *Caros*, & *Coma*.

Soporaria arteria, vulgò *Carotides* dicuntur, sunt duæ illæ, quæ ab arteria magna sursum ascendente, postquam ex thorace exiens, ac clauiculas transgressa, in medium iugulum peruenit, generantur, 1. de placit. cap. 7. vide *Carotides*.

Sordes, crassius nutritionis excrementum est; in ipsa enim primæ carnis generatione duplex excrementum prouenit, quod omnem qualitatis alimenti mutationem superat; alterum, *crassius*; alterum, *tenuius*: quod tenuius est, ipsa est *insensibilis perspiratio*, quæ etiam subindè fit visibilis, quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento vitur, quàm iustum sit, ampliore, vel motus quispam vehementior animali contingit; alterum, *crassius*, sunt ipsæ *sordes*, quæ in summo corpore nostro colliguntur: quin etiam in vlceribus, tenue excrementum, *Sanies*, Græcè, *Ichor*, appellatur, quod crassum est, *Sordes*, ex priori excremento, vlcus, humidum redditur; ex crasso, sordidum, 3. meth. cap. 5. vide *Ichor*.

Sorici cauda, siue *Sorcinus*, vide *Myurus*.

Sparganosis est, dum oblaetis redundantiam, mamili-

læ tumefactæ sic distenduntur, vt copiam hanc vix ferre queant, lib.2. de Glauco.c.2.

Spasma, vide *Rhegma*.

Spasmus, idest, *Conuulsio*, musculi est ad suum principium contractio, vide *Conuulsio*. Inde *Spasmosus affectus* idest, *Conuulsiuus*, qui in suo principio, aut non multo post, quàm fieri cœperit, conuulsionem accersit, com. 3. in 1. prorrh. Sic *conuulsiuum affectum* appellant, qui ante mortem necessario conuulsionis aliquod periculum inducit, 1. de prælag. ex puls. *Spasmosus autem pulsus*, siue *conuulsiuus*, est pulsus inæqualis in vna pulsatione, & diuersis arteriæ partibus, & cuiusmodi quidem, in quo vtrinque ab extremis retrahi, tendi, conuellique arteria videtur, in modum chordæ tensæ.

Spasmus oculi, vide *Mollities*.

Spatæ, vulgò *Spatula*, Instrumentum est, quo Pharmaco-
pola confecturas in cacabo, seu mortario mouent, 1.
de comp. med. per gen. cap. 4.

Spathomela, vide *Laminas*.

Sperma, *Spermatice arteria*, *Spermatice vng.*, *Spermatice poris*, vide *Semen*, *Glandulosi assistentes*, & *Parafata*.

Sphacelare, Hipp. in lib. de fract. & art. pro corruptione
pene vsus est; *Sphacelus* autem est corruptio substantiæ
vniuscuiusque partis, quæ *sphacelari* dicitur: partis car-
nosæ autem interitum, ex magnitudine inflammationis
proprie Medici *Gangranam* nominant, 7. aph. 50. *Spha-
celon*, in specie etiam vocant *ossis cariem*, 14. meth. 17.
Sphacelos vocem, sunt qui dicunt, *vehementem dolorem*,
declarare; alij tantum inflammationis excessum, qui
partem ad corruptionis periculum deducat, 2. loc. aff. 7.

Sphacelodes hemicrania, idest, alterius capitis partis
conuulsiuus dolor, 2. loc. aff. cap. 7.

Sphacelos, vide *Sphacelare*, & *Syderatio*.

Spharomata, vide *Nates*.

Sphage, vide *Anticardion*.

Sphagitides, id est, *Vena iugulares*, 5. meth. cap. 4.

Sphenois os, (quod & *Polyporphum* appellatur, lib. Introduct. c. 12.) est, quod ad cunei similitudinem, ex utroque latere Caluariæ ad palatum tendit, superiorem maxillam constituens, cuius ossis apophyses utrimque concavæ, ab alarum similitudine *Pterygodes* nuncupantur, lib. de ossib. cap. 1.

Sphincter, quasi constrictior, seu constrictorius, est musculus constringens orificium recti intestini, & vesicæ urinariæ, 6. de anat. adm. 4. vide *Rectum intestinum*.

Spicilla, vide *Laminae*.

Spina, est omnium vertebrarum, quas *spondylos* vocant, basis, compages, & structura: sumitur & *spina* aliquando pro *medulla spinali*, 3. loc. affect. 10. vide *Dorsum*, *Axelos*, & *Medulla spinalis*.

Spirationem naturalem appellat Hippocr. spirationis facilitatem, quæ neque thoracem, neque cor, aut pulmonem, neque præcordia p. n. affecta, aut dolore aliquo infestata, quin etiam neque partes quasdam iis adiunctas, ventriculū, lienem, iecur, ægrotare significat, 1. prognost. 25.

Spirituosos appellat Hip. eos duntaxat, qui copiosum aerem inspirant, & aere multo indigent, 4. acut. 115.

Spiritosus, vide *Sanguineus*.

Spiritus, πνεύμα, præcipuum est naturæ simul & animæ instrumentum, quo omnes functiones muniaque exequitur substantia aerea, calida, leuissima, tenuissima, omnes in corpore motus naturales ciens; est enim terra substantia corporis nostri constitutiva, contra distincta aliis duobus solidis, & humoribus, eiusdem plantæ

cum calore natiuo originis, & temperiei, cuius caloris est perpetuus comes, nam cum ad vitæ munia oporteret calidum innatum per omnia diffundi, is verò singulis solidis partibus, insitus, & fixus, & immobilis sit; ei natura spiritum socium asciuit, qui ipsum, suo celeri motu, quò necesse erat, deduceret. Estque tanta spiritui cum calore natiuo substantiæ communio, & operis societas, vt par sit eiusdem essentia, natura, & proprietas; vt non immeritò Hippocr. *spiritus* vocarit, impetum facientia, a sui motus celeritate. Aliquando Hippocr. absolue ipsam respirationem, vocat *spiritum*, com. 4 in 6. de morb. vulg. 4. vnde & *densum*, & *rarum spiritum*, id est, *respirationem tardam*, & *raram* vocitabat, 1. de difficult. resp. cap. 2. Interdum ab eodem, aer inspiratu attractus, qui respirationis, vocisque materia est, *spiritus* appellatur, 1. acut. & in progn. Aliquando *flatus ipse*, quo neruosa & musculosa corpora distenduntur, *spiritus* appellatur.

Spiritus animalis, est primum animæ instrumentum, in cerebri ventriculis contentus, ad iensificam & motricem vim in vniuersas corporis partes transmittendā, procreatus, 4. loc. affe. 2. *Spiritus* equidem, qui in arteriis continetur, *vitalis*, & est, & dicitur; qui in cerebro *animalis*, non quod de substantia animæ sit, sed quod primū eius illic habitantis sit instrumentum, qualiscumque substantia eiusdem fuerit, qui ex vitali perfectius concocto, & in cerebri anfractibus elaborato, conficitur; qui animalis spiritus, nequaquam animæ domicilium, sed primum tantum eius instrumentum est, cò quòd, cum ex vulneratione fuerit euacuatus, illicò animal quasi mortuum collabitur; cum iterum colligitur reuiuiscit, 7. de plac. c. 3. *Spiritus animalis*, exhalatio, quædam est sanguinis benigni, 6. de vsu part. 17.

Spiritus asper, à quibusdam appellatur is spiritus, qui cum sono & stertore ducitur, siue ob angustiam loci, quo ille redditur, siue ab humoris copia, 3. de art.

Spiritus densus, est brevis spiratio, siue motus respiratoriorum organorum, per breue tempus factus, 3. de diff. resp. cap. 10. vide *Inspiratio densa*.

Spiritus detentio, est respirationis ad plurimum tempus voluntaria cohibitio, per quam & singultus, & oscitationes sanantur, 3. de diff. resp. cap. 10.

Spiritus flatuosus, qui & *Flatus* appellatur, crassus, ac vaporosus flatus est, secundum substantiam aerius, atque tenuis; Cogita verò eius naturam ex circumstante nos aere, in memoriam reuocans, qualis in Austrinis constitutionibus, & qualis in Aquilonaribus fiat; ei enim, qui in Australibus, assimilatur flatuosus, alteri verò, qui in Aquilonaribus, is, qui in nobis secundum naturam est, spiritus comparatur, 2. Glau. 6. vide *Flauus*.

Spiritus inter exeundam offendens, vide *Exspiratus*.

Spiritus naturalis, vide *Spiritus vitalis*.

Spiritus sublimis est, qui sublimioribus thoracis partibus inspiratur, 4. loc. aff. 7.

Spiritus vitalis, à Cordis facultate naturalis genitus; in arteriis continetur, nurriturque respiratione, attracto aere & sanguine; quod si naturalis quoque spiritus est, utique is quoque in jecinore, & venis continebitur, 12. meth. 5.

Spirituum interceptio, vide *Interceptiones spirituum*.

Spissum corpus, vide *Rarum*.

Splen, siue *Lien*, corpus est rarum admodum, ac laxum instar spongiæ cuiusdam, ut succos crassos, & melancholicos facile attrahat, & excipiat, hepar ab illis expurget, eodemque conficiat, unde ipsum *Parenchyma*,

ma, idest, *affusionem*, nominant, 4. de usu part. cap. 15. cuius *simæ partes*, seu *concaua* jecur, & ventriculum spectant, *gibba* his oppoñuntur, c. 16. Eiusdem lienis corpus tantò est rarius hepate, quantò est crassius pulmone, c. 15. Quia autem nigro sanguine compositus est, idcirco non modo nigricat, & prominentibus quibuidam tuberculis inæqualis est, sed etiam familiaritate suæ substantiæ, quicquid atri humoris ac fecis est in sanguine, ad se attrahit; hoc enim illi à natura propriè tributum est. Trahit autem per eum venæ portæ ramum, qui superior & minor est. Ac eius quidem fæcis parte sibi cognata magis & familiari, per arteriarum præcipuè calorem motum elaborata nutritur; reliquum autem excernit nunc in portam & intestina per eundem portæ ramum, nunc in ventriculi latus sinistrum, per insignem venam ex suamo, aut propinquo in lienis simo ramo prodeuntem: nunc in sedem per hæmorrhoides, nunc in renes per arterias ab aorta supra renes natas. Id quoniam debuit esse fæculenti sanguinis receptaculum, præuidēs natura ne facile obstrueretur, duo præsertim illi remedia comparauit, substantiæ raritatem, & arteriarum copiam. Est enim valdè laxus, & spongiosus, habetque tum plures, tum grandiores arterias, quam magnitudini suæ conueniat, ab aorta qua per lumbos fertur, prodeuntes. Situs est in hypochondrio sinistro, qua ventriculo incumbit cauus, qua verò septum contingit, leuiter gibbus. Tunicam habet à peritonæo, neruulum autem a ramo sextæ coniugationis, qui sinistrarum costarum radicibus inseritur. Neque enim expediebat maiores cum neruos habere.

Splendentem urinam vocauit Galenus, quæ & flaua est, & peculiari, ac propria missione constat, ita ut gemini coloris esse videatur, & rufi, & rubei; splendor
rem

rem enim à rufo, niorem autem à rubeo accipit, lib. de viin. cap. 4.

Splenica, vide *Plagula*.

Splenica vena, est ramus sinister superior & minor venæ portæ qui totus per lienem spargitur; nam cum vena porta in duos præcipuos ramos mesentericum videlicet & splenicum distincta sit, hic in lienem abit, ille in mesenterium diffunditur.

Splenici, dicuntur ij proprie, qui induratum splenis scirrhusamque substantiam habent; non quibus inflammatum viscus est, 9. de comp. med. loc. cap. 2. quamvis ita dici possint omnes qui ex liene laborant. Euadunt autem lienosi, à copia melancholici humoris lieni infarcti, quæ defluxiones, & scædus corporis color subsequitur. Vnde fit, vt humore melancholico sub morbi finem crismq; per aluum erumpente, dysenteria promptè excitetur: quæ si diutius perseueret, omninò lethalis est; sin breui finiatur, magna ex parte salutaris est, vt est apud Hipp. aph. 43. & 48. lib. 6.

Spondylus, *Sphondylus*, *Spondylon*, & *Vertebra*, idem significant; sunt autem viginti quatuor ossa, quibus Rhachis, idest, Spina, constituitur; tot enim sunt in homine secundum naturam se habente: aliquando verò plura, aliquando pauciora visa sunt, omnia caua, & forata, spinam habent, & apophyles obliquas, & transversas, descendentes, & ascendentes, vide *Dorsum*.

Spongoides ossa, vide *Ossa Ithmoeidea*, & *Cavernosa ossa*.

Spontanea vocantur *ulcera*, quæ ex mordete humore oriuntur, qui sistitur in exitu, ac tardat, extremamque cuticulam solam, propterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit; quam nec ipsam, si eandem quoque sudoris vice transiret, ulceraret, 14. meth. c. 17.

Spon-

Spontaneum, apud Medicos dicitur, non quod sine causa sit, sed quod nostra causa non sit: item quod sit absque opera Medici, solius naturæ vi, 6 aph. 14.

Sponte euacuari ex corpore dicimus, quæcunque sine aliqua Medici opera excernuntur; ea scilicet, quæ nostrum regit corpus, potentia ipsum expurgante, aut quæ ex irritamento aliquo, aut quia à vasis non continentur reiciuntur, 4. aph. 2.

Sporades morbi, siue *Sporadici* sunt, qui sparsim priuatimqueprehendunt, ægros discrepanter fatigantes, neque secundum communem morbum constantes, i. acut. 9. vide *Communis*, & *Endemus*.

Sporades venæ, sunt propagines quæ jam venæ maxime cauæ, trunci, in totum crus ab interiore ipsius parte per inguina procurrentis, inordinatæ, ad cutem permeantes, modicis interuallis dispersæ, 3. de anat. adm. cap. 12.

Spuria costæ, vide *Illegitimæ*.

Sputamen, est *sputum*, cui aliquid alieni humoris est admistum: vt bilis, sanguinis, saniei, 1. de cris. 5. *sputum* autem, quod secundum naturam se habet, est, cui flauum aliquid admistum est, ibid.

Sputum appellatur, non quod sanguinem, biliosum, atque spumosum est; tale enim propriè *sputamen* nominamus, sed quod neque sanguini, neque bili pallidæ, vel nigre commistum, spuendo reiectum fuerit. 1. de cris. 5.

Spyratus, vocant Caprarum deiectiones; sunt autem hæ siccæ, atque id quod excernitur propria circumscriptione rotundum, circumductumque existit. Cum igitur quis hoc pacto, sicca, & circumducta deiecerit excrementa, *Spyratode*, id est, in *spyras voluta*, appellantur, fiuntque talia, & quod plusculo tempore retinentur, & propter copiam igneæ caliditatis, comm. 1. in 1. prorrh. 6. quæ & *Scybala excrementa* vocantur; vide *Scybala*

excrementa vocantur; vide *Scybala excrementa* Σκύβαλα dicuntur Galen. caprarum stercora, & pilulæ stercoris caprini, quas ad muliebres morbos, & vteri suffutur. vsurpat Hippocrat. σκύβαλα καὶ κοιλία sunt apud Hippocratem alui siccae & duræ, & quæ caprinis stercoribus similia reddunt.

Squamosa agglutinationes, quæ & *Mendosa commissura*, & *Temporales* dicuntur, vide *Lepidocides*.

Staltica medicamenta, quæ carnes vulneribus equant *Ib. de Dynam. in proœmio*.

Staphyle, est carnosa quædam particula, quæ in summo ore apparet pendula, si quis, aperto plurimum ore, toto linguam deprimat; hæc ipsa carnucula duobus nominibus appellatur, à veteribus Græcis, *Gargareon*, & *Cion*, hoc est, *Gurgulio*, & *Columna*; Cæterum, posteriores Medici ferè omnes non ita, sed *Cionidem*, id est, *Columellam*, vocant: nam qui *Staphylen*, id est, *Vuam*, & *Acinum*, ipsam appellant, eorum non meminisse præstat. Propriè enim non particulam illam, sed vnam aliquam eius affectionem, *Staphylen* siue *Vuam* nominamus; rarò autem hæc affectio circa columellam contingit, tametsi sæpè inflammetur grauissimè, 6. de comp. medic. loc. cap. 3. & lib. de anat. vii. Est igitur *Staphyle*, non illius partis inflammatio, vt quidam putant, sed quædam illius passio, in qua tota Columella laxata, extrema sui parte maior est, & liuida; superna verò tenuis, vt similitudinem fructus vuæ, vnde nomen accepit, præ se ferat: Latini, *Vuam*, & *Vualam* nominant; Galenus ibidem.

Staphyloma, est oculi morbus, cum in summa tunica, quiddam acino simile euenit, 2. method. capit. 2. Σταφύλωμα differentia vna est τῆς ἀρρεστώτος, cum scilicet erosa ruptaque tunica cornea, altera ei subdita,

quæ

quæ *φαρυγγίς* dicitur, excidit ad eum modum, ut acinum vuæ repræsentet. Cum enim infra istum modum excidit, *μικρόκεφαλον*; cum modum hunc superat, *μικρόν* vocatur, ut docet Paulus, lib. 3. cap. 22. Interdum verò aliter fit *σαφύλωμα*, sine ruptione aut erosione corneæ, quando ipsa cornea intumescit certa quadam parte, atque attollitur, & prominet in modum acini vuæ. Id quod plerumque contingit ex defluxione, humoribus intra corneam coaceruatis, quos ea propter imbecillitatem sustinere non valens, laxatur, & quasi incuruatur, apparetque veluti acinis vuæ exertus, qui Staphyloma appellatur. Differunt inter se hæc duæ species staphylomatis, quod una integra fiat cornea, tunica, tumorque ipse candidior appareat; altera verò fiat eadem rupta aut erosa, in qua quod prolabitur, cæruleum aut nigrum cernitur. His addit & tertiam speciem Aetius, lib. septimus, cap. 34. scribens aliquando fieri ex pustula quadam inter strias corneæ tunicæ satis profundè excitata, quæ tunicam attollat, non tamen rumpat. Causæ huius *staphylomatis* variæ esse possunt, sed quæcumque ea fuerit, certum est visum omni *staphylomate* aboleri.

Stacum, ab Hippocrate solere non temperamentum tantum aeris præter naturam, sed etiam omnem cuiusque rei formam appellari, recordemur, com. 3. in 3. de morb. vulg. in proœmio.

Status morbi, est vehementissima totius morbi pars, 1. de cris. 8. vel *status morbi* aliud non est, quam morbi, quantum ad casus, & symptomata attinet, maximum, 1. aph. 7. vide *Consistentia*.

Sreatocele, affectio est scroti, succrescente in eo quorpiam seu simili corpore, lib. Introd.

Sreatoma, vide *Atheromata*.

Stegnosis,

Stegnosis, *Stipatio*, cutis vitium, quo per occultos meatus prohibetur transmitti, quod superfluum est, excrementum fuliginosum, obstructis, siue censatis meatibus, quam desitatem *μῦσις*, id est, *concontinentiam* vocât, 3. de san. tuen. cap. 10.

Stegnotica medicamenta, hoc est, *obstruentia*, quæ sensibiles excretiones cohibent: corpus enim quod claudit, & continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex sese emittit, Græcè *στεγνόν*, siue *Stegnoticum* nuncupatur, 5. simpl. 14. vide *Obstruentia*.

Stelechiaa, vena est superficialia, & caudicis more sita, vnde omnes aliæ venæ sanguineis, ac pedestribus animalibus procedunt, 6. de anat. adm. cap. 8. Estque vena magna, ad portas iecoris sita, aliarum omnium caudex, ibid. cap. 10.

Stephaniaa, siue *Coronaria* vena, sutura, & os, vide *Coronale os*.

Stephanos, *Conona*, & *Iris*, sunt locus ille communis, in quo vniuersæ oculi tunicæ simul committuntur, 14. meth. 10. 19.

Sternon, est antè thoracis os, siue os pectoris, 7. de anat. adm. cap. 2. Sedes enim omnibus costis duplex est; prior, *Sternon*, id est, *pectoris os*; posterior, *Vertebrae*; quæ totidem numero omnino sunt, quot & costæ habentur, duodecim inquam; enim verò pectoris os, vnum quidè os apparet, membranis autem detractis, quod & plura ossa sint, & numero totidem, quot cum eocostæ dearticulantur, palam innotescit, 8. de anat. adm. cap. 1. Tenebrum admodum est recens natis, vt ossium pars plurima, & epiphyfes omnes, nil aliud quam cartilago. Deinde vero in medio inter costarum articulationes paulatim siccessit: vtique tamen vnumquodque eius os rotundissimum est. Quod reliquum est omne singula hæc officu-

la ambiens , cartilago adhuc est , costarum cartilagini tam simile , vt idem videri possit . Cæterum parte *sterni* ima cartilago triangula adnascitur , quam *sterni* appellant . *Sternon* manubrio , cartilago gladio similis videtur .

Sternutatio , maximum remedium capitis halitibus repleti est , qua vno impulsu , tum a pulmone , tum a capite spiritus emittitur copiosissimus , ad expurganda ea , quæ in anterioribus cerebri ventriculis . & in naribus ostendunt , 2. de caus. symp. c. 4. *Sternutatoria* verò *medicamenta* sunt , quæ in naribus admota , vtpote ad cerebrum sublato , crassitudinem humoris attenuant , & per nares seu palatum cerebrum expurgant , 13. meth. 21.

Stigmata , inter cutis vitia numerantur , & dicuntur non puncta , sed maculæ punctorum magnitudine sua & forma hominis cutem & superficiem deformantes , ac variantes ; *Vericata* vulgò nominantur .

Stomachi paralyssis , symptoma est virtutis attractricis stomachi , cum alimentum aut omnino trahere non potest , aut quam trahit debilissime , 3. de sympt. caus. c. 2.

Stomachicos eos appellant , qui appetentiam perdidērunt , & quibus post acceptum cibum , ventris os grauatur , a quo opprimitur , ægros intollerabili anxietas habet . Appellat *stomachicos* etiam illos , quibus nausea contingit , & maxime si ad vomitum impellantur , & si idem simul cibi corrumpantur , quandoque acidi , quandoque nidorosi facti , quandoque aliam viciatam qualitatem adepti . Insuper eos *stomachicos* appellant , quibus ructus huiusmodi cum molestia quadam , anxietate , & subuersione contingunt , sæpè cum nondum cibum acceperunt : quinetiam , quibus per plurimum tempus cibi in ore ventris morantur , grauantes , & vix descendentes , tales etiam *stomachicos* appellant . Alios iam appetitum

titum caninum habentes, vt & plurima edant, & maxima granati, paulò post reuomant, vocant *stomachicos*. Alios rursus, qui fortiter exsoluuntur, vbi diutius indiam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, quorum aliqui etiam nauseosi fiunt, nisi citius potum ac cibum acceptent, *stomachicos* etiam vocant, 8. de comp. med. loc. c. 2.

Stomachum, os ventris appellant Medici superius siue finistrum, qui etiam *stomachica animi deliquia* appellat, & quosdam *stomachicos* esse dicunt: sic in eo loco aborto ab affectu præter naturam appellantes, velut *Hepaticos* Hepate, *Colicos*, à Colo, *Nephriticos*, à Renibus, *Splenicos*, à Splene affecto, 2. de compos. medic. loc. capit. 1. & 4. de caus. puls. 23. licet *Stomachi* nomine collum, omni ventri præpositum, instar isthmi cuiusdam angustum intelligatur, 4. de vsu part. cap. 1. quin & Oesophagus, *Stomachus* dicitur, vide *Oesophagus*. Est igitur *stomachus*, os ventriculi: id est, meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum ventriculum intromittuntur: aliud habet & ventriculus os infernum, quod Græci πύλωρον, per quod chylus descendit, vocitant; duobus enim nominibus, Veteres *Os ventriculi* nominabant *stomachum*, & *Cardiam*, id est, Cor, propter consensum, quem habet cum corde maximum, 8. de compos. med. loc. Est autem σίμαχον maximo sensu præditus, & longè acutiore quàm reliquæ vllę partes, propter duorum neruorum magnitudinem, qui à sexta cerebri coniugatione in ipsum inferuntur: per eos & alimenti penuriam & rofionem sentit, ventriculique affectus cerebro, & contra ventriculo cerebri communicantur. ad ipsum propriè pertinet appetentia, quam vt bene habens secundum naturam excitat, sic malè affectus inappetentiam, & vitiosum appetitum inducit.

Situs est sub cartilagine *Epiglottidis*, quam ob id natura videtur comparasse, ut ipsius etiet propugnaculum.

Stomatica medicamenta sunt, quæ modicè siccant; sic vocata, quod in assidue fiat usu; cuiusmodi sunt quod ex Moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglandium viridis, atque etiam his magis, quod ex mulso, & cupressi sphaerulis componitur, 5. meth. 10. *Στοματικά φάρμακα* dicuntur propriè medicamenta, quæ ad vuas, tonsillas, & omnes quæ in ore fiunt, derepente inflammationes conueniunt Gale. Generaliter vero dici possunt quæcumque gargarizata, illita, aut alio quouis modo admota, medentur oris affectibus: Nam & citra inflammationem vlcera admodum humida stomaticis medicamentis curantur.

Strabismus, qui & *Strabismus* dicitur, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam, vel sursum, vel deorsum, vel in latera nuunt oculi, lib. finit, vide *Illois*.

Strangulatio, est internecio, ob respirationis defectum facta; uel propter angustiam, & coarctationem alicuius spiritualium, id est, respirationi seruientium organorum; uel propter uirtutis thoracem mouentis imbecillitatem; uel propter uitalis principij uehementem refrigerationem: Angustia autem fit, uel repleta ea regione, quæ inter thoracem & pulmonem media est, uel pulmonis cauernis & fistulis obstructis, uel inflammatione quadam totum uiscus habente, uel aspera arteria uel eius arteriæ capite, quod Græci *Laryngem* & *Bronchon* nominant, Latini *Guttur*; uel illa gutturi præiacente capacitatem, quam Græci *Pharynga*, Latini, *Fauces* nominant, affectum quempiam perperiente, 4. aphor. 34.

Strangulatio uteri, & *apnæa*, id est, spiritus interceptiones,

ceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, & præsertim viduis occidunt; sunt innata caliditate. à multitudine, materiæ frigidaë grauata, ad similitudinem flammæ, quæ præ multis humidis lignis suffocatur, 3. de difficul. respirat. cap. 10 & 6. loc. affect. 5. Qui affectus à Græcis *ὕσπερ*, & *ὕσπερ πνιγίς*; à quibusdam *ἄσπρον ὕσπερ*, dicitur: Latini autem, *uteri strangulatum*, *uterinam suffocationem*, vel *spirationis ob uterum priuationem*; tum à parte affecta, tum à superueniente symptomate appellant.

Strangulator, vide *Lycoides*, & *Lupus*.

Stranguria, est vesicæ affectus, quo urina non retinetur, sed guttatim deffillat, lib. finit. vnde & *urina stillitidum* appellatur, 8. de placit. 8. Fit autem vel imbecillitate vesicæ, vel urinaë acrimonia, 3. de caus. symp. cap. 2. Cum neque inflammatio, neque calculus, nec aliud quicquam infestat; si urina acris est, totus habitus, aut aut reliqua signa bilem ostendunt, ex hac vel *δυσσπρία*, vel *σπᾶν σπρία* contrahitur: vide *Ischuria*, & *Celiaca*.

Strictor, vide *Anulus*, *Rectum*, & *Sphincter*.

Strigmenta, sunt particulae quædam intestinerum, quæ in excretionibus biliosis simul deiciuntur, summa intestinorum tum ea humoris acrimonia detrita, 4. de art. 31. vide *Rhypodea*.

Struma, vide *Chæras*, *Parotides*, & *Scrofula*.

Stryphna, vide *Habituosa*.

Stultitia, est rationis deperditio, cum læsione memoriæ, & phantasie, 3. loc. aff. 5.

Stupefacientia, vide *Anodina*.

Stupor, insignis est refrigeratio, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit; quemadmodum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit, & paralyin inducit. Equidem.

noui quosdam adeò refrigeratis pedibus, vt primis quidem diebus sensus periret, sequentibus deinde diebus emortui pedes putrescerent; 2. loc. aff. 2. Est insuper *stapor* symptoma, quale dentibus euenit post elum malorū immaturorum, & aliorum acerborum, & acidorum, proprio nomine appellatur *αἰμαδία*, 3. de alim. fac. cap. 16. Est denique *stapor*, cum neruus aliquo obstruente, vel adstringente cogitur, adeò, vt spiritus animalis ad mēbrum transmitti nequeat, hinc membra sensu & motu priuantur, lib. de ren. aff. dig. cap. 3.

Stylocides, vide *Graphoeides*, & *Lithoeides*.

Stymmata, spissamenta sunt, quæ oleis adduntur, aut odoris gratia, aut confecta diutius ab iniuriis immunita permeant, 2. de compos. med. per gen. 2. *Στύμματα* dicebantur Veteribus vnguenta solidiora & corpus habentia; Ea autem odorata erant; cuiusmodi sunt, Costus, Nardus Amaracus, Amomum, Mentha. Differebant ἀπὸ τῶν ἰσχυμάτων, quod liquida essent, nec vt *σύμματα* solida:

Styptica medicamenta sunt, quæ stringunt partes relaxatas, lib. de Dynam. in proœmio. *Στυπτικόν* vel *στυπνόν*, adstringens, id dicitur, quod terreum est, & compagis quidem suæ mole crassarum partium, frigidum, autem qualitate. Est autem adstringens duplex, sicut & calefaciens. Vt enī in hoc partim simplex & summum est, velut ignis partium per exsuperantiam caloris, vt Vinum, Crocus, Piper: ita illud vel summum est, vt exempli causa, Alumen, Melantheria, Galla, & Rhus: vel modicæ cuiusdam astringentis particeps, velut Pyrum, Malum Rosa. Est autem adstringens genus commune austeri, & acerbi; Vtrumq; enim eorum adstringit, hoc magis, illud minus. Omnia autem adstringentia contrahunt ac densant meatus, siccant, reprimunt: adhæc

vinciunt & continent partium sibi inuicem cohærentium substantiam, & vehementer refrigerant. Id quod de puris adstringentibus intelligi debet, quoniam plæraque ex dissimilibus particulis composita non adstringunt modò, sed & acria sunt aut pingua, aut dulcia, aut amara, aut salia, aut acida *Στρίψις adstrictio*, per accidens calorem excitat & auget, conducitque ad concoctionem.

Subalaris vena, vide *Axiliaris*.

Subcartilaginea, vide *Hypocondria*,

Subcinctura, vide *Diaphragma*.

Subcingentes membrana, vide *Hypexocotes*.

Subclanium, vide *Cataclida*.

Subductiones, solitus est Hippocrates appellare per aluum exeuntia, 7. aphor. 64. Dicitur autem *Subductio*, de ea tantum excretionem, quæ per aluum fit, non de ea, quæ fit per vniuersum corpus, 2. aphor. 28.

Subfascinationes, & *Subligamina*, vide *Epidesmus*, & *Plagula*.

Sublimamentum, *Enaorema*, & *Nubecula*, apud Hippocratem sunt id, quo in vrina, neque in summitate, neque in fundo vasis, sed in media sede sublimè, & exquisitè medium existit. licet apud Galenum *Nubecula* sit id, quod supernatat in vrina desuper, 1. prognost. 26.

Sublimis spiritus, est externus aer, qui ob suffocationis periculù, toto thorace, in suspiriosis cynâchicis, suppuratis, peripneumoniacis, magna vi attrahitur; nam nobis inculpatè de gentibus, solis inferioribus thoracis, quæ ad septũ transversum sunt, partibus inspiramus: sin ampliorẽ spirationẽ requirimus, etiã partes infernis vicinas vna mouemus. Vbi plusima indigemus respiratione, tũ partes etiam ad operta scoptula agitamus, totius thoracis valida opera vtentes, com. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Submissio, vide *Ablatio*.

Substitutæ medicinas, appello, quæ in alterius locum subrogari queunt, lib. de substit. med.

Subsultio, vide *Palpitatio*.

Subuersio stomachi, aliquando appetitus deperditionem; aliquando nauseosas affectiones ac accepto cibo factas, significat, 8. de comp. med. loc. 3.

Subuersio voluulosa stomachi, appellatur fortis & contentiolus vomitus; nam quemadmodum in voluulis subuersiones fiunt, cum magna contentione & violentia, adeò ut stercus etiam euomat; sic etiam alios vomitus violentiores concitatos quis appellare *Voluulos* posset, 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Subuela, manus pars est exterior; ut enim supina pars manus, iuxta pollicem affligēs *Thenar*, & *Vola* dicitur; ita huic opposita, *Hypothenar*, id est, *Subuola*, nominatur, libr. Introd. cap. 10.

Succum medicatum vocamus eum, qui primum defæcatur, exinde verò Solis aut ignis calore sic densatur, ut longiore tempore citra corruptionē asseruari queat: Arabes, *Rob* vocant. Ex hoc genere est, quod ab iisdem *Azina* dicitur; sic enim appellant succum fructuum, eò usque defæcatur, & decoctum, ut sapæ aut mellis consistentiam acquirat.

Succus, vide *Humor*.

Sudamina, (Græcè, ἰδρώματα) è genere sunt pustulatum in summa hærentium corporis parte, quæ instar vlcærum cutem exasperant; proueniunt autem, veluti & ipsum ostendit nomen, propter multos sudores, qui vel biliosiores, vel omninò mordaciores existunt; mordent enim hi cutem; & pruriginosam efficiunt, & per modum vlcærum exasperant, 3. aphor. 21.

Suder, Græcè ἰδρῶς, est humidum tertiæ concoctio-

nis excrementum , per cutem in aquæ speciem erumpens; cuius materia est humor tenuis, & serosus, alimento permixtus, quòd id faciliùs exiguas, & capillorum modo tenues venas subeat, atque ab his in partes, quæ eo ali debent, sese insinuet; est quin imò eiusdem cum *urina* generis, in eo tantùm ab illa differens, quod *hæc* ad vesicam, *ille* longiùs in corporis habitum deferatur: magisque propterea concocta sit, quod ad cutem usque peruenit, permeatis omnibus quæ intersunt partibus magnò calore præditis. Quo fit plerumque, ut copiosior *urina* sit, exigua aut penè nulla sit sudoris materia: aut contra, si ea nequeat aut insensibili perspiratu vacuari, aut per poros confertim erumpere, referatur in venas, per quas in habitum corporis delata fuerat, & *urinae* vim, atque copiam maiorem efficiat. Ergo non procedit à visceribus materia sudoris, nisi fortè in communi ea ratione fieri intelligatur, quæ iecut omnium humorum, qui per corpus feruntur officina esse proditur. Cæterum, causa sudoris efficiens calor est, non ille quidem acris, qui siccandi vim habeat, sed humidus, qui per habitum corporis diffusus; sudorum materiam calefaciat, fundat, attenuet, cutemque simul emolliat & relaxet; Proinde pueris & adolescentibus, & aliis, in quibus multum est huiusmodi caloris, sudores persacilè mouentur: siccioribus autem, siue per ætatē, siue per morbum, ut hæsticis, & quibus iecur vel lien inaruit, nulli omnino fiunt, ut nec iis quibus habitus corporis refrigeratus est, veluti hydropicis. Hi namq; propter huius caloris imbecillitatem maximam sudare nullo modo possunt, etiamsi vniuerso corqori humor abundè suppetat. Duabus iis sudorum causis, etiam cutis raritas accedat oportet, ut causa sine quo sudores erumpere non possunt: qui enim cute sunt densa, ac du;

ra, inepti sunt ad ludandum, qui secundum naturam, se habet sudor, particeps est salluginis & amaritudinis, atque ut vrina, modice pallet. Cui hæc infra modum contigerit, vel materiæ frigiditas, vel caloris natiui imbecillitas designatur: cui verò supra modum, contraria. Is calidus sit oportet, quod frigidus vel humoris frigiditatem, vel caloris natiui extinctionem significet: cuius humoris excretio secundum naturam est, non minus, quam vrinæ, & aliorum excrementorum.

Sudor bonus est, in febribus, qui euenit die indicatorio, ex toto promanat corpore, calidus, insuper integrè febrem finit, vel morbum tolerabiliorem efficit, idque in acutis morbis, 1. progn. 25.

Suffocatio, vide *Strangulatio*.

Suffumigium, vide *Thymiana*.

Suffusio, vide *Hypochyma*.

Sugillatio, vide *Contusio*, *Euacuatio*, *Hæmatopa*, & *Hyposphagma*.

Sumen, vide *Ephebeon*.

Summum humerum, vide *Acromion*.

Supercilia, sunt ea pars faciei, ubi frons à superioribus descendens desinit, seu termini eius eminentes, & pilis consiti, lib. Introduct. cap. 10.

Superexcretionem, aut *Superpurgationem*, recentiores Medici vocant, eas eruptiones, in quibus natura, ad indicatorium auxilium concitata, modum excessit, 3. de comp. med. loc. cap. 3.

Supergeminalis, vide *Epididymis*.

Supergenualis, vide *Patella*.

Superhumeralis, quæ & *Epomis* dicitur, vide *Humerus*.

Superimprægnatio, vide *Epicyema*.

Superligamina, vide *Epidesmus*, & *Plagula*.

Superligula, vide *Epiglottis*.

Superpurgatio, & Supernacuatio, vide Hypercatharsis.

Supinitas, stomachi affectio est, qua quidam accepto cibo, si paulò fortiori motu moueantur, statim vomunt, vulgò *supinitas stomachi* appellatur; contingit iuxta intemperiem quamcumque, citra vitiatos humores. Aliquando sequitur ad solam oris ventriculi debilitatem, quod cibos amplecti, eisque obuolui non potest, veluti tota ventris amplitudo solet. Fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis. Irriguus enim stomachus per largam humectationem, similiter vt ligamenta neruorum, laxatur; quandoque verò cum vitiata alicuius, modicæ tamen humiditatis complexu, etenim sicuti multa, ita & valdè vitiata perittomata, citra cibum, nauseam efficiunt, 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Suppuratio, vide Purulentia.

Suppuratus est, qui multum puris in capedine inter thoracem & pulmonem collectum habet; communiter verò omnes, quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est, *Suppuratos, Empyos, & Empycos*, vocant, 4. de caus. cap. 6. Suppurari autem aliquando idem est quod corrumpi: sic enim sanguis, cùm è suo loco exciderit, & per minimas partes ad eas, quæ in musculis sunt, cavitates, aut per inania spatia, quæ vas circumiacent, fuerit effusus, suppuratur, aliquando nigrescit, aliquando in grumos vertitur, præsertim quando in magnam cavitatem præter naturam exciderit, 6. aph. 20. vide *Empyemata, & Purulentus.*

Sura, est tibiæ venter, quem Græci *Gastrocnemion* vocant, 2. de usu part. cap. 20. Estque posterior tibiæ pars carnosa, 16. de usu part. cap. 8. veluti anteriorem carnis expertem, *Anticnemion, & Ocream* nominant, 2. de anat. adm. cap. 4. vide *Tibia.*

Surditas, *ῥαφωσις*, est actio auditus abolita, à causa aliqua p.n. videlicet à læsa audiendi facultate, eiusve primario instrumento, (quod est animalis spiritus in aurem affluens) p.n. affecto, aut laxis reliquis organis, quæ natura ad audiendum comparauit. Vide *Cophosis*.

Suspendiculum appellatur, quod foeminis intra abdominis membranam situm, à musculo dependens, atque ad vuluam ex vtraque parte dextra & sinistra transmittitur, vtriusque ab illius musculis per membranæ abdominis foramina, 2. de semin. cap. 5.

Suspensum, vide *Sedimentum* & *Hypostasis*.

Suspiriosus, idest, *Asthmaticus*, lib. de rem. part. fac.

Sutura, vide *Commisura*, & *Compages*, *Sutura* adhuc dicitur inferior pars penis in longitudinem vergens.

Sycosis, *Marisca*, *Ficus*, & *Ficatio*, est tumor à fici similitudine sic dictus, vlcerosus, rotundus, subdurus, rubicundus, dolorificus, ex quo aliquando exiguum, & glutinosum quid inæquale & graueolens, egreditur, in barba maxime exoriens; aliquando & præcipue in capillo proueniens, quod semper fici similitudinem fert, & carnis excresecntiam. Interdum in mento fit, ab humore non solum crasso, sed etiam participe serosæ & tenuis humiditatis, qua exulceratur, eoq; differt à *Ioncho*. Nascitur & in Ano, sola magnitudine à *Thymo* differens. Latini *Mariscam* appellant, quam aliqui dicunt esse *Picnem præ pinguedine hiantem*, 2. meth. 2. & 10. simpl. Appellatur etiam *Sycosis*, interioris palpebræ dura, & asperior scissura, com. 2. in 6. de morb. vulg. 4 & lib. de ocul. c. 9.

Sycora, idest, *Ficata*, ex caricarum esu appellantur, tum maxima, tum suauissima iecinore ipso, vt liquet, ex dulcium esu alimentum vberius accipiente, 3. acut. 11. *Συκωτόν* *καρπ.* *Ficatam iecur*, sic dicitur, ficum esse præparatum. Sic fit omnium præstantissimum, non modò

ad voluptatem, sed etiam ad alia omnia, si mactandi animalis iecur multarum siccicarum ficuum esu præparetur. Quam rem in suisbus maxime faciunt, quod suilla viscera sunt aliorum visceribus multo suauiora.

Syderatio, seu *Sideratio*, est corruptio solidorum corporum omnium, ut ipsis quoque ossibus insit, ne dum car nibus, aut vasis solis, quo differt à *Gangrena*, quæ est mortificatio solidorum corporum, non osium, lib. de tum. c. 11. quam *siderationem Sphacelon* Græci vocant, 7. de anat. adm. c. 13. Totam substantiæ vniuscuiusque partis corruptionem, *Syderationem*, id est, *Sphacelon*, Veteres appellant, sed in partibus carnosis, aliis quoque nomini bus eandem vocant; quin ipse Hipp. *putridam carnem, marcidam, & vitiatam* dicit, aliisque huiusmodi eandem nuncupare consuevit; de osse vero, quod in tota substan tia vitiat, *syderationis* seu *sphaceli* nomine uti con suevit. Tale autem vitium ossibus contingit, quando ad iacens caro, prauas sanies producit, quibus ipsa mada faciendò corrumpit, 2. de frast. 20. vnde *sphacelare*, id est, *corrumpere*, & *sphacelos*, id est, *caries*, 5. loc. affect. 3. *Semi syderatus* autem homo dicitur, qui altera tantum parte, dextra, aut sinistra computruit, lib. de aqua, aere, & loc. c. 6. & 4. de art. 16.

Symbebecos, *συμβεβηκός*, idem est accidens; apud Philosophos, id est, quod substantiæ opponitur, sed à Medicis, tum maxime Galen. 1. meth. contrà distinguitur symptomaticus; quæ enim, inquit, constitutionem partium, vnde actio nascitur, necessariò sequuntur, sanis quidem nobis *Symbebecota*, id est, *Accidentia*, ægrotantibus, *symptomata* nuncupantur, *Accidentium* autem differentia, 2. meth. tres constituit; sunt enim vel ut *affectus*, vel ut *actiones*, vel ut *passiones*: quorum etiam hæc exempla ponit, *inambulare, uri, cadi, album*, aut *nigrum*

esse; prætereà, id ex accidenti dicitur fieri, quod nec primum, nec per se fit : quod exemplo calculorum motorum declarat Gal. lib. de diff. sympt.

Symmetria, est temperies, & contemperatura, temperata siue debita conuenientia, & proportio inter se tum similarium partium, in calido, frigido, humido, & sicco; tum instrumentalium in compositione, numero, magnitudine, figura, i. de san. tueud. cap. i.

Symmetrum absolute, est, quod nulli collatum, mediū est, & mediocre, adeoque omnis temperiei, tum actiuarum, tum passiuarum qualitatum, norma constituitur: tale & *Eusarcon*, & *Quadratum* est; non absolute verò *Symmetrum*, quod in aliqua specie, vel genere, tale est, vt ad ipsius comparisonem aliquid temperatum, vel intemperatum dicatur, i. de temp. c. 6. *Symmetrum* verò *medicamentum* est, quod & similis temperamenti est cum eo, cui admeuetur, & mediū temperamenti est omnium primarum qualitatum, 5. simpl. 25.

Sympaschein, est per consensum, seu per viciniam, affici, quoties pars aliqua, non proprio affectu, sed alieno afficitur, i. loc. aff. 6. *συμπάσχειν*, *coaffici*, *compati*, non de simplici aut quouis affectu dicitur, sed de vehemente affectione, cum parte quædam vehementi passione laborantes, reliquas in consensionem secum trahunt. Hac igitur ratione, iecore affecto, singultus quidam succedit, compatiente stomacho; tussis autem & spirandi difficultas, respirationi destinatis instrumentis per consensum affectis. Sic igitur instrumentis respirationi dicatis grauitè affectis hepar compatitur.

Sympathia, est affectio compatientium altero cuidam primò patienti partium, idque vel propter vicinitatem, vel propter societatem, quæ in ea sunt, comm. i. in primo prorrh. 20. Sic à Medicis ferè vsurpatur. Est autem

autem *συμπάθεια* quoq; duorum naturalis quædam coniunctio, & cōcordia. Eam similitudo, vel generis, vel naturæ, vel temperamenti, vel morū, vel rerū aliarū conciliat. In plurimis verò causa ignoratur, eamque Philosophi & Medici eam sapientissimi, ad substantiæ totius familiaritatem, atque occultam quandam vim & proprietatē retulerūt, quā si quis sit, qui se nosse profiteatur, non caret arrogantia impudentiq; nota. Huiusmodi *sympathia* exempla permulta à Philof. referuntur, vt magnetis cum ferro, purgantium medicamentorū cum humoribus, elephanti cū homine, hominis cū plerisque animalibus, herbis & fructibus, quibus salubriter vescitur. Huic *sympathia* contraria est *antipathia*, quæ non est aliud, quā cœca rerum inter se discordia. vid. *Idiopathia*.

Sympepsis, (Græcis *πεπαισμός*) est concoctio, qua natura crassis & crudis humoribus, & concoctu difficilioribus, per abscessum prouidet, veluti calidioribus & tenuioribus per excretionem, 2. progn. 23.

Symphysis, est naturalis ossium unio, quando duo ossa sibi inuicem aut immediatē coalescunt, (veluti quæ fungosiora, mollioraque sunt,) vel quando aliorum interuentu connascuntur, (vt sunt sicciora, & densiora) nempe media cartilagine, & dicitur *Synchondrosis*; vel mediis nervis, & dicitur *synneurosis*; vel media carne, & dicitur *syssarcosis*, li. de ossib. in præm. Ossa autem omnia inter se coniunguntur. vel καὶ ἄρδρον, vel καὶ σύμψυσις. Est autem σύμψυσις apud Hipp. idem quod σανατόρρωσις.

Symptoma, (quod & *Passio*, & *Pathos*, & *Pathema*, *Epigenema*, quasi *supergenium* vel *supergenitum* dixeris, appellant) generatim nominatur quicquid animali præter naturam accidit vt sunt tūm morbi ipsi, tūm morborum causæ, quæ intra corpus subsistunt. Altera verò significatione, ac magis propria, (exceptis tūm morbus,

bis, tùm eorum causis) reliqua omnia, quæ præter naturam sunt, *sympptomata* nominantur, lib. de sympt. diff. c. 1. & 2. Sic lumbum, *sympptoma* non aliud est quam affectus p. n. qui morbum sequitur, velut umbra corpus. Huius tres à Medicis differentiæ assignantur, aut enim consistit in actionum offensa; aut in corporum ipsorum affectu; aut in retentis vacuatifve immodicè. Quorum *sympptomatum* singula varias etiâ habent differentias. Si quidem animalium actionû noxæ triplices sunt. Primæ quidem sensilium, vt visionis, auditionis, gustus, odoratus, tractusq; aboliti, debilis, aut deprauati; vel sunt motricium actionum, vel principû, yt imaginationis, rationationis memoriæ similiter abolitæ, vel debilis, vel deprauatæ. Secundæ verò sunt naturalium; vt attractionis, retentionis, alterationis, & expulsionis. Tertiæ verò, vitaliû, vt pulsationis abolitæ, debilis, aut deprauatæ. Eorû autem *sympptomatum*, quæ consistunt in corporum affectionibus, quinque sunt differentiæ, pro sensuum numero. Aut enim consistunt in visu, cuiusmodi sunt calores præter naturam in toto corpore, aut certis quibusdam partibus: aut in auditu, cuiusmodi sunt voces clangulosæ, tremulæ, raucæ, & soni, strepitus, atque murmura in quauis parte excitata: aut in olfactu, quæ non sunt aliud quam graueolentia respirando; aut transpiratu totius corporis percepta, vel prodiens ab auribus, naribus, axillis, aut ventriculo per ructus acidos, nidorosos & virosos: aut in gustu, quæ non aliud sunt quam sapor varius excrementorum e singulis partibus prodeuntium: aut in tactu, cuiusmodi sunt calor, frigus, humiditas siccitasque, & ex iis inducta mollities, durities, aut alia quædam qualitas in quauis parte. Tertiæ verò sunt eorum, quæ præter naturam vel excernuntur, vel ætinentur in corpore; quorum triplex differentia est:

Aut

Aut enim tota substantia p.n. sunt: ut sanguinis profluvium, ex morbo, aut aliquo *symptomate* (morbos enim *symptomata* consequuntur, non modò primo, sed plerumque alterius symptomatis interuentu) excitatum: aut qualitate, aut quantitate, quorum exempla notissima sunt.

Symptosis, affectus est, quo meatus, qui oculo videndi facultatem tribuit, ex atrophia, vel resolutione fit artior, conciditque, lib. Introd. cap. 15. *Σύμπτωσης*, est vasorum subsidencia & contractio.

Synaria, vide *Continentes causa*.

Synanche, vide *Cynanche*,

Synarthrosis, vide *Articulus*.

Synceras deiectiones, vocat Hippocrates, impermixtas aquosae humiditati, quibus solus humor aliquis euacuatus deiecitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorem praese ferens, siue bilis, quae *aruginosa* nominatur; cuiusmodi omnes deiectiones, ex istam esse omnem naturam humiditatem a calore febrili demonstrant, 7. aph. 6.

Sychisis, est oculi vitium, confusis secum eius humoribus: id quod accidit ut plurimum ex vehementi plaga, interdum verò & ex vuae tunicae inflammatione, ruptis eius vasīs, effusoque eorundem humore. Inde pupilla discolor & turbida enadit, & principio quidem maior cernitur, tandem verò contabescit, minorque se ipsa apparet.

Synchondrosis, vide *Symphyis*.

Syncomistus panis, *Συνκομιστὸς ἀπὸς*; vide *Autopyrus*.

Synceps, est princeps virium lapsus, 12. meth. 5. quem virium lapsus duo praecipua symptomata consequuntur, ex soluto quidem nativo calore, frigiditas totius corporis; colliquata verò solidorum corporum substan-

tia,

tia, sudor, quem Medici *syncopticon*, & *diaphoreticum*; appellant; ex quibus pullus defectio, & sensus motusque priuatio consequuntur. Differt à *lipopsychia*, & *lipothymia*, quod, licet vtraque affectio hæc affatim & confertim fiat, in syncope tamen plurimus subsequens sudor diaphoreticus; languidiores vires reddit; sudor autem aut nullus, aut modicus est in exaltatione, & *lipopsychia*, & *lipothymia*, minoremque noxiam viribus infert.

Syncrimata, vocant corporum simplicium & elementorum compositiones, seu concreciones, de diff. morb. c. 5. Methodici, *συγκρίματα* animantium corpora appellabant; quasi ex indiuiduorum corpusculorum mixtura constarent, & meatuum miscellanea, cui medicandæ, si quando confusa esset, *μετασυγκριτὰ φάρμακα* ab illis dicta, adhibebant, quæ & *μεταποροποιητικά* vocabant.

Syncripsis, id est, Concretio, & Contemperatio, lib. de marcor. cap. 4. *Συκρίσις* enim coagmentari, concretum scire, iut compingi, significat.

Syncritica, hoc est, relaxantia medicamenta, à coagmento sic dicta, 2. de anat. adm. cap. 1. *Συκρίτικος* coagmentandi vim habens.

Syndesmi, sunt ligamenta, sensus expertia, ex osse ortum ducentia, (non ex cerebro, aut spinali medulla) rotunda, alba, & exanguia, cauitate carentia, in fibras diuisa, 6. method. 4. vide *Ligamentum*; *Syndesmorum* tres sunt usus præcipui; nuntiandi ligandi, muniendi, ac veliendi.

Syndromè, concursus est, & congressus symptomatum, aliquid faciendum præscribens, lib. fin. *Plethorica* autem *syndromè*, est omnia humorum concursus; *Syndromè* autem *pathognomonica*, est concursus symptomatum, morbum huius scilicet speciem, sedem & causam con-
iunctam

iunctam indicantium, lib. de cur. rat. per sang. cap 9. Is signorum cumulus proprius est Empiricorum. Qui enim experientia sola rem inuestigat, tales concursus respicit, & quæ accidisse viderit, in vnum colligit. Cumque sæpè eadem viderit vno in morbo, omnia memoria cominendat, atque vbi ex hac obseruatione multos concursus fuerit expertus, tunc quæ in multis concursibus, quæ item in vno tantum euenisse comperit, diligenter obseruat, atque ita demum in communium & propriorum cognitionem venit, quam consequenter signorum vi & efficacia diuersitatis animaduersio. Quod enim in multis concursibus fuit obseruatum, quam quòd in paucis, quòd in paucis, quam quòd in duobus; quod in duobus, quàm quod in vno tantum maiorem vium habet. Exēpli causa; Empiricus ex nonnullis quæ liquidò apparēt notis circa ægrum, dicet sibi compertū esse sanguinem egro mitti debere. Si quæras quænam sint, respondebit distentionem vasorum, & ruborem, & grauitatem corporis vniuersi, & pigritiam ad motiones & tensiones membrorum, adhuc vlcerosæ lassitudinis sensum, & tractatam in otio priorem vitam, ciborum & potus copiam, & solitarum excretionum suppressionem, atque ex hac Syndrome siue concursu venæ secandę vtilitatem a se obseruatam esse. Talis quidem est Empiricorum *συνδρομή πληστική*, ad cuius similitudinem alios in aliis morbis concursus æstimare potes, vt *συνδρομή μαιευτική*, *συνδρομή χηλιν*, *ἐπιπληστική*, & reliquas. Verum tales *συνδρομές*, Gal. ridet, quod tum rarissimæ, tum longissimæ sint, quodq; non protinus appareant, vt interea dum concursus omnium symptomatum expectatur, mora adhibendi remedii periculum adferat. Facilius multò & citius qui ratione signorum vniuscuiusque morbi inuentionem indagat, & communia, & propria cognoscit. Vbi enim

brachium ex propria sede excidisse, & in alam prolapsum esse animaduertit, reliqua omnia etiam simul intelliget, ut tumorem illic præter naturam esse appariturum, deinde sinuatum in superhumerali locum futurum, capite brachij, quod in alam recessit, priuatum tū dolore uehementi infestandos musculos, & euenturum ut brachium doleat, si admouere id ad costas uelit. Itaque non expectato eorum omnium concursu, statim iudicabit brachium e propria sede excidisse, & superuenientibus Symptomatis remedia comparabit; ut non immeritò talem Empiricorum *quid populus* Galenus reprehendisse uideatur.

Synneurosis, uide *Symphysis*.

Synocha, hoc est, continens febris, est cuius uniuersum tempus una accessio est, & quæ uel semper in eodem uigore consistit, uel minuitur, uel augetur, donec iudicetur; quæcunque enim, per circuitus certos ægritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ scilicet membra uel mittunt, uel suscipiunt, uel generant, uel attrahunt superfluitates; sed quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipuè sit læsa; sed qui in uenis & arteriis omnibus continentur humores, atque ij præsertim, qui in maximis, atque plurimo calore abundantibus uasis sunt, aut ob aliam quamuis causam, ut in Ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes, febrem accendunt, *Synocham* appellatam, quæ à principio usque ad finem, nullam habet intermissionem, ac tam diu perseverat, hominemque deurit, donec qui ei causam afferunt humores, aut ex toto absumantur, aut coquantur, aut utrumque patiantur, de differ. febr. is hæc & *Synochus putrida*, *deurens*, *ardens*, & *Succensa* appellatur, 2. de cris. cap. 6. uide *Continua*, & *Febrem Synochon*,

K k

Synochus,

Synochus, id est, *continens febris*, quartum febrilium genus numeratur, quod quia ex sui natura ultra tertium diem extenditur, nec humorem putrescentem habeat, nec febrilem calorem, ut habitum possideat, propterea nec *diaria*, nec *putrida*, nec *hectica*, dici potest; sed vel *diaria plurium dierum*, vel *synochus non putrida*, vel *synochus conclusa*, merito appellari potest; quam febrem vel conuientia meatuum, vel recens corporum densatio & stipatio excitat, 9. meth. 1.

Synodontes, vide *Hiatuli*.

Synonyma, id est, *Vniuoca*, quæ inter se communicantia, & in aliquo tertio conuenientia, ab vno factam denominationem habent, 4. acut. 23.

Synopsis, id est, *Compendium*, lib. de neru. diss. c. 17.

Syntaxis, *distentio*, opposita est laxitati, vtraque & in cute, & in articulis contingens, aut resiccatis, aut perfrigeratis, aut inflammatis, aut induratis; in cute verò non his tantum modis, sed etiam ubi muscoli inter ipsam, quouis modo auferuntur, tum maximè ex carnis copia & abundantia, ut & in vtre pleno aqua, & Tympana, quod Gal. in pluribus libris Methodi testatur.

Syntaxis, id est, mutua compositio, & connexio, 1. de vfu part. 14.

Syntexis, *Colliquatio*, vide *Febris colliquativa*.

Synthesis, est osium inter se compositio, qualiscumque ea sit: est enim vniuersi generis nomen, quam aliis quoque nominibus vocari, tradit Galen. *Syntaxin*, scilicet, & *Homiliam*, lib. de ossib. ubi & συνταξιν diuiditur in duas species, ἀρσπον & σύμψωιν. Præterea C. Plinius Secundus, lib. de Medicina, scribit σύμψωιν morborum esse, nec periculo, nec facie Phthisis diuinitem: inter tam multos Auctores solus qui id scripserit.

Synulotica medicamina sunt, quæ vlcerebus cicatricem

cem inducunt, 13 meth. cap. 5. Σωληστικὸν φάρμακον idem
quod ἐπυλωτικόν.

Syphon, vide *Metrenchyta*.

Syraon, vide *Sapa*.

Syringomata, instrumenta sunt, quæ ad fistulas inci-
dendas sunt comparata, 6. meth. 4.

Syrinx, idest, *Fistula*, tubulus est callosus, angustus,
oblongus, interdum etiam obliquus, os habens cui cicat-
rix obduci nequit, per quod humor statis temporibus
ichorosus, acris excernitur. Porro fistularum aliæ cæcæ no-
minantur; quæ osculum in profundo, sinum ad superfi-
ciem habent; aliæ, *occulæ*, quæ & os, & sinum obtinent
in profundo, lib. finit. Vide *Fistula*.

Syffarcosis, vide *Symphysis*.

Systematica inæqualitas, est congregatio multarum
inæqualitatum, & pulsus ex congerie multarum pulsa-
tionum inæqualium consurgens, 4. loc. affect. 8. Σύστημα
enim *aceruum* significat, & *cumulum*. Huius tres ha-
bentur differentiae, διαλείπων, παρεμπιπών, μύρϑον, siue
μυριζών. Est autem inæqualitas illa, συστηματική cognitu
omnium facillima. Dicitur etiam alio nomine σύστημα.

Systole, est submitio pulsus, 1. de diff. febr. c. 7. (dicitur
etiâ *Sistole*, & *Diastole*; idest, constrictio, & dilatatio, de
motibus thoracis & pulmonis, lib. de vocal. inst. diff. c. 2.)
quo motu facultas fuliginosa excrementa expellit, &
repurgat, atque ita refrigerium calori nativo molitur.

Systrophe, *Phyma*, & *Scleria*, hoc est, *Tuberculum*
durum, ut exponit Galenus in suo Lexico Hippoc. sed 4.
acut. scribit, eam esse, quæ a partibus excitatur intume-
scentibus.

T

T ABES, quæ *Phthisis* Græcè communiter appella-
tur, est ulceratio pulmonis, vel thoracis, vel fau-
cium,

cium, ut & tussicula, & debiles comitentur febres, & corpus uniuersum consumatur, libr. finit. Nominatur etiam *Tabes*, alicuius corporis particulæ præter naturam diminutio, siue ea in prima formatione huiusmodi appareat, siue post; eandemque eiusdem particulæ *atrophiæ* uocant, de differ. morb. cap. 9. uide *Ex agitudine senectus*, & *Phthisis*.

Tabes oculi, quæ & *Rhetidosi* dicitur, est solius immutatæ pupillæ corrugatio, incidentibus aliis super alias rugis, quod spiritus parcior à Cerebro, quam pro natura deberet, affluat. Differt a *Tabes oculi senum*, quæ est corrugatio corneæ tunicæ, & pupillæ angustia, ab imbecillitate senectæ, tum ex defectu humoris tenuis quo repletur; tum ex spiritus supernè affluentis inopia, 10. de usu part. 5. 3. aphor. 16.

Tabida febris, uide *Ex egritudine senectus*, & *Marasmus*.

Tabidos appellant ueteres Medici, qui morbo tabifico, quem *Phthoen* uocant sunt obnoxij. Tales propriissimè sunt, qui adeò sunt angusto thorace, & restricto, ut à tergo in morem alarum promineant operta scloptula; undè hos etiam *Pterigodes*, id est, *Alatos*, uocant: Præterea, quibus caput facile impletur, & spiritus organis multas destillationes dimittit, hi facile tabescunt, com. 1. in 1. de morb. uulg. 18.

Talpa, & *Testudo*, sunt affectus; cutis capitis proprii; quæ nomina recentiores addiderunt, cum apud Antiquos hi affectus, neque nomen, neque tractationem inuenerint. *Testudo* autem Guidoni, abscessus est magnus, mollis, humoralis, latiore forma in modum testudinis; undè nomen accepit; quæ si in capite nascatur, *Talparia*, uel *talpa* dicitur; in collo, *hocium*; in testiculis, *hernia*; interdum autem cum pure, squamis, vel fistitulis reperitur;

ritur ; reponitur sub abcessuum genere , & sub meliceride potius,quàm atheromate . *Talpa* verò , cum albam materiam contineat,ad atheromata potius,quàm meliceridem refertur . *Bocium* verò vulgus vocat , mollem & laxum tumorem in exteriori gutturis parte , quam Græci *Bronchocelen*,nostri *herniam gutturis*, & eo affectos, *gutturifos* vocant , Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem, & asperam arteriam, in quo, modò caro hebes, modò humor,aliquis, melli, adipi, pulti,aquæque similis includitur . Huic similis affectus est,quem Guido vocat *Natam*, seu *Naptam*, quæ est excrescentia magna, carnosâ, veluti caro natium,vel anchorarum, diuersarum quidem formarum, & magnitudinum,cuiusmodi sunt *Melapepon*, & *Cucurbita* .

Talus, non idem est ac *Malleolus*, sed dicitur os sub malleolis contentum, vnde quaque contactum, quòd ne tangere quidem possis, lib. de ossib. cap. 22.

Taraxis, seu *Conturbatio*, est, cum oculus leuiter ac mediocriter commotus, rubicundior euadit, ac obscure videt, lib. Introd. capit. 15. Paulus definit, esse humiditatem & caliditatem oculi, cum rubore præter naturam, à causa externa inductam: vt Sole, fumo, puluere, oleo: differt ergo ab *ophthalmia*, quæ causam tantum internam agnoscit. Paulus lib. 3. c. 22. *Ταραξίειν*, turbare vehementius commouere significat . Neque enim eo verbo aliquid moderatè, sed supra modum fieri intelligitur, ut Galenus comment. 3. explicauit .

Tardus pulsus, est, cum longo tempore, arteria distenditur, 1. de diff. puls: cap. 7.

Tarsus oculi, est substantia quædam membranea durior, ac tensa, qua parte Periostis, siue coniunctiua oculi tunica remeare ad corneam incipit, tenuibus pertulsa foraminibus, ex quibus palpebrarum pili emicant

propter suam duritiem, extendens in rectitudinem palpebras, 20. de usu part. Rufus autem non cartilaginem illam in ambitu palpebrarum sitam, sed pilos ex ea nascentes, *ταρτὸς* & *ελεφαντῖδας* scribit nuncupari; vide *Cilia*. *Ταρτὸς* est pars pedis, quatuor ossium serie constans. Ex his tria carent nomine, quartum *κυβοειδὲς* dicitur. Illa cum osse scaphoide coniunguntur, hoc cum calce articulatur. Differunt inter se figura, magnitudine, & situ. Verum omnia intus caua ad ambulationis & apprehensionis firmitatem, foris gibba ad dyspathiam. Videtur in pede *ταρτὸς* esse, quod est *καρπὸς* in manu, nisi quod *τὸ καρπῷ* ossa sint octo, *τὸ ταρτῷ* vero; quatuor: ex minoribus namque particulis apprehensionis organum constare debuit; ex grandioribus verò id quod ad ambulandum comparatum est. *Ταρτὸς* etiam dicitur omne quod dilatatum est: ex quo vocabulum hoc manavit apud Hippocratem *τετάρπωνται*, quod significat; dilatata fuerunt, ut scribit Galenus in Interpret. lingu.

Tauris dicitur quoque inter cætera inferior Colis pars vel sutura in longitudinem eius vergens; usque ad sedem porrecta; lib. Introd. cap. 10.

Tela aranea, Vide *Ragocides*.

Telephia, & *Chironia*, ulcera dicuntur inueterata, & quæ vix curam recipiunt, cicatricemque difficillimè contrahunt; sic dicta, quod Chirone medicinæ peritissimo: ad sanationem indigeant. Vide *Chironia*.

Telma, est solidum, & tensum, durum, ac pilis etiam nudum, pedis vestigium; lib. de musc. dissect. capit. 33. *Τέλμα* dicitur pars ea pedis, qua tetram contingimus, & calcamus.

Temperies, (Græcis *κρῆσις*) miscibilium est concentu & harmonia s. vel c. l. h. s. elementi mixto, ad mixti actiones

nes abeundas necessaria, lib. 1. de temper. c. 2 & 3.

Tempora, Κρόταφοι, appellantur partes, ab utroque
incipitis latere supra aures sitæ, lib. Introd. c. 10.

Tempora morborum tale quid sunt in morbis, quale
quid in animalibus sunt differentiæ secundum ætates;
neque enim *tempus* simpliciter hoc vocabulo significa-
tur, neque conueniens illud tempus, in quo præsidia
etiam usurpari debent, sed tantum morborum ætas;
quæ temporum vicissitudine immutatur: ut, animal
ætatibus, lib. de morb. temp. c. 1.

Temporaies muscoli, uide *Crotaphita*, & *Mandibularii*.

Temporales futura, uide *Lepidæoides*.

Tendones, fines sunt musculorum, quos *Pronervationes*,
seu *Aponeuroseis* uocant Anatomici; qui quidem
mediis partibus sunt nervosiores, inter se tamen in eo
differunt, quod aliquando minus, uel carnosæ, uel ner-
uosæ substantiæ in se habeant; quando carnis substan-
tia inest amplior, *carnosam pronervationem*; quando
parcior, *nervosam* appellant, 2. de art. 5. Dicitur *Ten-*
do, τένων ἀπὸ τῆ τένειν, id est, a *tendendo*, quod eius actio
præcipua intentione seu contractione est: horum enim
unusquisque fibris suis uersus musculi caput retractis,
partem cui inseritur, eodem contrahit atque euellit.

Tenesmus, est continua & implacabilis desidendi cu-
piditas; quæ tamen nihil, præter cruenta pauca, & mu-
cola, egeritur; quæ affectio etiam *tentio* & *tensio* appel-
latur, quoniam in ea fit in recto intestino tentio, cum
deicere uehementer homines expetentes, continuo ex-
surgunt, 7. aphorif. 27. *Tentio* item aliquando *tractum*
corporis significat, lib. finit.

Tenor, apud Hippoc. est idem, quod *nervus intentus*,
1. de placit. 9. & 1. de artic. 47.

Tensio, Vide *Tenesmus*.

Tensivus dolor, est qui tensionis sensum inducit ægris particulis, 3. loc. aff. 9. vnde tēsiua lassitudo, quæ & phlegmonosa est, 7. de comp. med. loc. c. 1. vide *Dolor tristis*.

Tentigo, vide *Priapismus*.

Terue intestinum, est tertium in ordine, ieiuno intestino substantia simile: differt autem, quod neque vacuum reperiatur, neque tot vasis, & inuolucris sca-teat, 6. de anat. adm. cap. 9. Idem & *Ileon*, & *Inuoln-crum* appellatur, lib. de anat. viu.

Tenuia appellantur *medicamēta*, quæ facile in tenues comminui partes possunt; *Leptomeri* Græcè; *Crassa*, quæ contrā, *Parimeri* appellata, 1. simplic. 3.

Tenuis pulsus, vide *Gracilis*.

Terebella, vide *Abaptista*.

Teredo, siue *Teredon*, est caries in osse, 3. method. 1. *Τεριδών*, est solutio continuitatis in osse ab erosione facta. Causa est humor acutus & acris in osse putrescens, ipsumque exulcerans. Sed initio quidem hoc malum reducitur ad aliud ægritudinis genus, & ossis asperitas potius, quam *Caries* nominatur. Maiori autem facto foramine, & quodam veluti sinu vno vel vario appa-rente, *Τεριδών* dicitur. Dicitur enim quasi *τεριδών*, ἀπὸ τῆς, *τρίματ*, inquit Galenus; quod in eo affectu os pertulsum sit: nisi forte denominetur à *τεριδών*, quod vermem significat, qui ligna erodit: namque & os qua-si à vermibus corrolum videtur. Sunt autem in osse, *τεριδών* & *σφάλμα* idem: quorum vtrumque eodem nomine *Cariem* Latine dicere possumus.

Teretes lumbrici, sunt palmi longitudine, vel etiam maiore, ad stomachum usque proserpentes vermes, lib. Introd. cap. 13.

Tergum, ὕστρον Græcè, sunt posteriores corporis partes, quæ collo subiacent, E. G. *Scapula*, *Dorsum*, *Spi-*

na, & lumbi, libr. Introd. cap. 10.

Terminthi, vide *Therminthi*.

Terra Argyrite, vide *Argyrite*.

Terra intestina, γαστέρεα. Græcè, Lumbrici terre-
stres sunt, 11. simplic.

Terra medicaminosa, quod aqua irrigata, facillè in lu-
tum soluitur, appellatur; quia verò ea utimur, velut
aliis medicamentis, idcirco nō iniuria *Pharmaceuticis*, La-
tinè *medicaminosa* vocatur, nēpè, quia sola est eius nodi,
ut euidentiorē vim medicaminosam possideat, 9. simpl.

Tertiana simpliciter, est tertiana intermittens; con-
tingit enim, hanc ipsam, sine aliquā adiectione *tertianā*
simpliciter nominari; quemadmodum, & quotidiana
intermittens; *quotidiana simpliciter* appellatur, 2. de
diff. febr. c. 7. Earum febrium intermittētiū, quæ ter-
tia quoque die accessiōem faciunt, quæ quidem breue
habent accessiōis tempus (quod duodecim horarum
æquinoctialium spatium ad summum finitur, 2. de differ.
febr. cap. 3.) ac cum rigore inuadunt, & per sudores, &
bilis vomitum, & biliosa excrementa finiuntur; his ter-
tiane exquisitæ nomen impositum est: quibus verò ali-
quid horum deficit, hæc non *exquisite*, sed *simpliciter*
tertiana appellantur; quod si intermissione minorem
habuerint, accessiōe videlicet in longius tempus pro-
tracta, hæc *tertiana extensa* vocantur, 2. de diff. febr. c. 8.
Exquisita verò *tertiana* est, quæ sui ipsius naturam purā,
sinceramque seruat, idest, flauam bilem redundantem,
& motam, tempus æstiuum, locum calidum & siccum;
hominis ætatem, & temperiem similem, 4. aph. 59.

Tertianus circuitus, vide *Quotidianus*.

Testes, testiculi, ὀρχη, sunt corpora duo glandulosa,
alba, mollia, rara, laxa, cauernosa, rotunda, seminis, &
generationis principium, quæ quod duo sūt, διδυμοι
appel-

appellantur, quos ipsos Galen. 3. de aliment. fac. glandibus annumeravit: Est autem naturale & proprium eorum munus seminis generatio. Itaque eius materiam per vasa spermatica attractam, & per Epididymidem propriam ipsorum tunicam, atque inde per parastatam testis impositum corpus testis alterius quadam effigie permeantem propria facultate alterant, dealbant, concoquunt, verumque semen efficiunt, uti mammæ, lac, & ossa medullam ex sanguine generant. Pluribus tunicis seu inuolucris integuntur, & primum quidem sua propria, ac intima, & vbiq; contigua, quæ ἐπιδιδυμὶς dicitur: deinde alia, quam ἐπιδιδυμὶς vocant, propterea quod a suis vasibus, & a musculo testium gracili rubescat; testem ipsum, testisque epididymidem totam inuolvente: præterea uero duabus aliis communibus, quarum una ὄρχη, seu scrotum dicitur: altera uero δαρτὶς illi subiecta. Cæterum, testes in maribus extra membranam abdominis sunt, & propendent musculis, quos κρεμαστῆρας vocant; mulieribus intus latent à lateribus uteri, frigidiores, minores, & imperfectiores longè quam marium, 14. de usu, c. 10. Sic quidem conditi testes in principum partium numero habentur, non quod ad præsentem vitam necessarij sint, sed quod ad vitam natorum serie propagandam, & ad speciem quandam immortalitatis eorum actio sit necessaria. Sunt enim generationis principium: quod a nulla alia parte, sed a se ipsis habent. Nec tamen est in præsentis vitæ vis eorum tam exigua, & nullius momenti: imo uero corpus uniuersum ualdè afficiunt, & imminuant. Ab his enim in totum corpus vis quædam per venas effertur; quæ quidem in maribus, robusti & masculi habitus, in fœminis uero, fœminæ ipsius naturæ causa est. Ea autem vis est κρεμαστικὴ, hoc est, seminis generatrix,

neratrix, qua partes solidæ præliæ semen generant; quo optimè aluntur, & robustissimæ euadunt. Ex eò namq; fit; vt quibus testes frigidiores sunt & humidiores, iis corpus uniuersum frigidum, humi u, infirmumque sit; & morbis obnoxium. Nam cum aquosam & tenuem habeant genituram; malè solidæ eorum partes aluntur: quare robustæ esse non possunt, quoniam basis hæ sunt totius corporis & fundamentum, quo infirmo necesse est reliquas corporis partes infirmas esse.

Testudo, uide *Camarion*, *Fornices*, & *Talpa*.

Tetanos, *Rigor*, *Distentio neruorum*, est conuulsio perpetua totius corporis rigidi, & in neutram partem se inclinare queuntis, contractis ad suum principium neruis; & musculis, quibus caput annuit, reuult; circumagitur, æqualiter uidelicet iis antè & retrò tensis; Galenus lib. de musc. dist. uide *Distentio*.

Tetrapharmacum medicamentum est; quod ex cera; adipe; resina; pice; æqua omnium portione constat. Aduersus Lycum, c. 7. *Τετραφάρμακον* emplastri nomen est, quod & *Βασιλικόν* appellatur. Constat ex quatuor simplicibus medicamentis, unde & nomen habet. Puri mouendo non est aliud melius uel expeditius. Est & *τετραφάρμακον* Antidoti nomen, quam alio nomine *μυσήριον* vocarent. Constat quatuor medicamentis, *Gentiana*, *Aristolochia*, *Baccis Lauri*, & *Myrrha*, equali pōdere commistis: Valet ad podagræ præcautionem.

Thele, *Papilla*, mammae capitulum est; unde infans lac sugit, medium in mamma protuberans, quam ambit circulus quidam subniger, quæ *phœ* appellatur. *Θήλη* substantia constat ad penem proximè accedente. Est enim neruea illi quodammodo cutis; spongiosam intus substantiam continens, quæ erigi, ac uicissim laxari non minus quam penis potest. Habet autem tenues & con-

spicuos;

spicuos meatus, fibræ proflus ac nerui modo albicantes, qui venarum surculi sunt, multiplici serie per glandulosam mammarum substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur.

Thenara, Θέναρα, propriè vocant prominentes volæ manus partes, a verbo Θένειν, quod est *verberare*, vt nonnulli volunt, qui Etymologiis gaudent; quippè cum his prominentibus partibus percutere soleamus ea, quæ percutimus; alij, non omnes partes prominentes palmæ ita appellari aiunt, sed solas eas, quæ sub pollicibus extant, 1. de fract. 20.

Therapeutice, id est, medendi methodus, 7. de compos. med. per gen. cap. 1. quæ & *Curatoria* dicitur.

Theriacam appellarunt Crito, & cum secuti, quod viperæ carnes acciperet; Andromachus verò, qui primus illam composuit, Neronis fere tempore, Ταλίσμιν, hoc est, *tranquillum*, atque etiam ἱλαρὸν & εὐδαίμον, libr. de usu Theriac. ad Pamph. prope finem.

Therisma, teterrimum vlcus est, tum ex se nascens, tum alteri superueniens, vt refert Celsus, colore lividum, nigrum, odore foedum, multo mucoso humore repletum, quod inflammatio, febris, prurigo, & dolor comitantur, a quo sanguis interdum fluit, serpit, & exedit illud partes finitimas, atque ob id aliqui *herpetem exedentem* vocant. Aliqui dicunt idem esse cum *Carcinomate*, quod Galenus comm. 2. in 6. Epid. dicit in solo pulmone generari; alij in quacunque corporis parte carnosa prouenire id ipsum statuunt.

Thermantica, calefactoria medicamenta sunt, quæ, suo calore omnem partem calefaciant, lib. de Dynam. in procemio.

Therminthi nomen, nigras quasdam pustulas in cruribus maximè orientes, significat; a figura, coloris, ma-

magnitudinisque similitudine, quam cum Terminthorum, id est, cicerum fructu habent, deriuatum, comm. 3. in 6. de morb. vulg. 37. *τέρμας*, species est Phymatis, inquit Oribasius, supra quod pustula nigra eminet, quæ rupta, inferne similis detquamato apparet; eo autem dissecto, pus inuenitur. Est & *τέρμας*, Terebinthus arboris nomen, cuius folia, & lemen, & cortex adstringunt, & ad eadem, ad quæ lentiscus, conueniunt. Excalfacit ordine secundo, & adstrictorium quiddam habet; siccat etiam ordine secundo.

Thlasma, quæ & *Thlasia* dicitur, vide *Rhegma*, & *Vnionis solutio*.

Thlipsis, vide *Epiparoxineftai*.

Thoracem, consueuerunt Medici appellare, totum illud corporis spatium, quod duodecim costis, utrinque circumcubitur; pertinet anteriore quidem parte ad pectorale os, ac septum transversum; declinat verò posteriore ad spinam duodecim vertebris circūscriptum lib. de ossib. c. 13. & 6. de usu par. c. 2.

Thorexin nominare consuevit Hippocrates, vini potionem, 2. aph. 21. *Θάψις*, *διποτοσία* & *ἀποποτοσία*, vini meracioris potio est. Phavorinus inquit, *Θάψις* inebriari dicitur, quod excalfaciat pectus, aut thoracem repleat, aut pugnaces sint ebrii: Inde *ἀποθίψας* dictus, qui vel leuiter, ut interpretatur Erotianus, vel ut quidam exponunt, summè ebrius est.

Thrombos, sanguinis grumus est, seu sanguis concretus, 5. meth. 8. Vide *Grumus*.

Thrombosis, est affectus, in quo lac grumescit in mammis, & in caleiformam transit; *grumescentiam lactis* Interpretes nonnulli vocant.

Thymiama, Latinis *Suffumigium*, quod ex moderatè adstringentibus, resiccantibus, ac discutientibus viti-

fos & seriosos humores, & corrigentibus humorum malignitiam, & contrariam vim habentibus aduersus putrefactiones, quorum plurima ex aromatum sylua habentur, constat, 8 de comp. med. loc. c. 7. *θυμίαμα*, dictum uolunt, quasi *θυμῶν ἵαμα*, quoniam languet cens animus suffitu eiusmodi recreetur. Sed non desunt, quia Thyo odorifera herba deducum uelint; ut neque qui ἀπὸ τῆ θυμῶν, hoc est, à sacrificando, quoniam odores diis suffiebantur. De eo aphorismus celebris habetur apud Hipp. suffitus aromatum muliebria ducere, & ad pleraque alia utiles esse, nisi grauitatem capitis inducerent.

Thymus, asperæ carnis extuberatio est, circa genitalia, ac sedem oriri solita, lib. finit. & 14. meth. 13. est & tumor p. p. uide *Epulis*. Est & *Thymus* idem quod *Glandium*, seu *Aden*, seu *Glandula*, uide *Aden*, & *Glandula*. Vel, ut alij, *Thymos* carnosa est excrescentia, nunc in Glande, nunc in Præputio, nunc in ipsa sede consistens; sic dictus, quod *Corymbis Thymi* sit similis. *Thymorum* autem alij *mites*, alij *maligni*. *Mites* sunt exigui, scabri, candidi, dolore carentes; *feri* autem, amphiores, scabriores, liuidi, dolorifici.

Thyroeides, est ossis pubis foramen ab ostij similitudine, sic appellatum, 3. de anat. adm. cap. 13.

Thyroeides cartilago, uide *Scutiformis*, & *Cricoeides*.

Tibia, est tota cruris pars, inter talum genuque, in interiori parte sita; cuius tibię pars anterior, tenuis, & carnis expers, *ocrea* appellatur, li. de oss. c. 22. eademq; infra genu *Anticnemion*, 2. de anat. adm. c. 4 posterior carnosapars, *Sura*, & *Gastrocnemion* dicitur, 16. de usu part. c. 8.

Tilmata, sunt diuisiones factæ in fibris musculorum, dum scilicet illæ nimis distentæ, interdum rumpuntur, 4. de his, quæ in medic.

Ticillatio oculorum, uide *Mollities*.

Toma, pro *Phlebotomia* usurpatum legimus, 2. de natur. human. 9.

Tomi dentes, *τομῆς*, siue *τομῆες*, aliàs, *Incisori*, dicuntur quatuor primi anteriores, ad cultri similitudinem, ad eos cibos incidendos, qui mollitiem in se habent; sicuti ad dura confringenda, alij utrinque proximi constituantur; cæteri fere omnes dentes, *molares*, siue *maxillares* appellantur, lib. de ossib. c. 4. quos etiam *Mylas*, idest, *Molas*, vocant, 1. de usu part. c. 8.

Tonica, siue *Tonotica medicamenta*, sunt, quæ extrinsecus illiniuntur partibus nervosis, ad robur huius conciliandum, 3. meth. cap. 12.

Tonicus motus est, qui exercetur imprimis à corpore laborante Tetano, quibus contrariis virtutibus oppositorum musculorū, inter se quasi pugnantibus, 1. de motu muscul. cap. 8.

Tonos, *Nervus* nuncupatur, ab ipsis operationibus; uti enim *Nervus* ἀπὸ τῆ νεύειν, id est, à *flectendo*; ita *Tonos*, ἀπὸ τῆ τίνεσθαι, id est, à *tendendo*, deductum est, 1. de motu muscul. cap. 1. Vide *Nervus*. Usurpatur etiam *νῆξ*, pro vehementi desiderio, magnoque conatu, qualis esse solet per dyspnœas, & tenelimos; ut docuit Gal. comm. 1. in prorrhēt.

Tonfilla, vide *Isthmus*, *Paristhmia*, & *Vna*.

Tophus, vide *Callus*.

Topica remedia, id est, *localia*, 13. meth. cap. 22. quæ loco affecto non prius applicari debent, quam totum prius corpus purgatum sit, ne his irritato affectu, plus etiam affluat ad membrum læsum, vitiosi succi, lib. de remed. par. fac. cap. 5.

Torcular, siue *Lenos*, est locus quidam vacuus, quasi cisterna in vertice capitis, in quem meningis duplicationes sanguinem redundantem deducunt, unde rursum.

sum velut ab arce quadam, omnibus subiectis partibus sanguinis riuui mittuntur, 6. de vlu part. cap. 6. & cap. 9. de anat. ad. c. 1. *Ανύχο*, nomen est profectum primum ab Herophilo, deinde ab Anatomicis usurpatum.

Tormina, Dysenteria, proprie non pro *ulceratione intestinorum*, vt plerique Medici solent, sed pro *cruenta ex intestinis proluxie* sumit Hipp. vt etiam, quando ex iccoris imbecillitate, cruenta deliciuntur, affectio talis quoque *torminum* nomine appellatur: id quod & fieri, & dici a Medicis quoque videtur, 4. de art. 4. Fiunt autem *tormina*, & propter morsum vehementem, & propter spiritum flatuosum, qui non habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus, & prater naturam detentus, 4. aph. 11. vide *Dysenteria*.

Torpor, est inotus & sensus difficultas, diminutiove in toto corpore, & maximè in artubus a frigore, & compressione neruorum corporum concitata, 1. de caus. sympt. cap. 5. Aliquando *torpor* significat ventriculi in concoquendis cibis imbecillitatem, com. 3. in 6. de morb. vulg. 1.

Tortio est, cum articulus quidem est illæsus, sed neruosa circa ipsum partes tortæ, & p. n. contractæ sunt; id quod maximè in iis contingit, quorum in uacuum gressus dilabitur, 3. de iis quæ in med. 31.

Toxica, hoc est, uenena, quæ mortem inferunt, lib. de Dynamid. *Τοξικόν*, apud Antiquos, certa quædam species ueneni fuit teterrimi, nec tamen quid esset constare adhuc arbitror. Videatur Plin lib. 16. cap. 10.

Trachea, sunt alpera medicamenta, quæ suffocata loca ulcerant, & exasperant, libr. de Dynam. in proæmio. *Τραχύτης*, *asperitas*, est uitiosa conformatio parti cui accidit, inæqualitatem absumpto humore inducens. Huic contraria affectio *λείσους*, id est, *lanitas*, dicitur,

citur, suntque primi generis morbi. qui in formatione consistunt, & a causis contrariis proficiuntur. Exasperantur enim quæ prius erant lævia; & læuigantur, quæ prius erant aspera: illa quidem ab humorum acrimonia, aut medicamentis adstringentibus resiccata, (sunt enim & acra & adstringentia potestate sicca.) hæc verò a pingui & lento humore madentia. Præcipue verò in osibus hoc malum apparet, cum non rectè a Medicis curantur.

Trachea arteria, vide Aspera arteria.

Trachoma, altera est species scabiei internæ palpebrarum, aspera, dolorem, & grauitatem faciens in oculis; humiditatemque nimiam ingenerans, lib. de ocul. part. 4. capit. 9. Prouenit sæpè ex mala curatione, affusis nimium diu collyriis. Nam sicut in vulneribus aliarum partium illita pingua carnis excrecentiam inducunt, sic etiam in palpebra. Potest etiam ob diuturnam defluxionem excitari, sed non mordacem: humor enim mordax, non palpebram, sed oculum potius ipsum infestat. Hoc vitium sunt qui δάτυμμα siue δασύτητα appellent. Attamen ea distinguit Aetius, scribens δασύτητα esse inæqualitatem quandam palpebræ interioris superficiariam, & cum rubore: τράχυτητα verò; siue τράχωμα, esse palpebræ internæ inæqualitatem & asperitatem multò maiorem, adeò vt intra eam emineant veluti Milij grana, aut Erui semina cum dolore & grauitate. Malum autem vtrumque oculos habet humidiores. Idem verò, si intendatur, magisque promineat, σύκωσις appellatur, tandem vbi ad extremum peruenit, τύλφος. Τραχωματικὸν καλλέριον, est collyriorum certa species, tollendis oculorum asperitatibus efficax. Τραχωματικὸν autem pharmacum dicitur, quod deterget ea quæ adhuc mollia sunt, nec adhuc chirur-

giam videntur pustulare.

Treductio, est diductio ossis in naturalem, statum reductio, lib. finit.

Tragemata, sunt ea, quæ post cœnam, voluptatis inter bibendū excitandæ gratia assumuntur, i. de ali. fac. 34.

Translativus motus, vide *Metalepticus*.

Traspiratio, seu *Perspiratio*, est insensibilis per poros diffusus excrementorum fuliginosorum flatus, i. de sanit. tuend. cap. 12. vide *Inspiratio*.

Transumptivus motus, quem *Metalepticum* vocāt, est quo per machinas vtuntur plurimi, tūm architecti, qui Mechanici dicuntur, tūm Medici, qui organici nuncupantur, qualem motum natura musculus conciliavit, quoniam neruorum principio existens, Cerebrum & ratio, ibidem radicata, per nervos, tanquam habenas, musculos laryngis E. G. intendit; sic etiam nervus, qui a cerebro proficiscitur, a superiori loco per totum collū fertur deorsum, ad multam vsque thoracis partem, indeq; rursus redit vsque ad laryngem, vbi nervis in laryngis musculos insertis, quasi a manibus quibusdam, singuli musculi deorsum trahuntur, 7. de usu part. 14.

Traulotes, Latinis *Blesitas* nominatur, qui hac passione correpti sunt, τραυλοι Græcis, *Blesi* verò Latinis dicuntur, & sunt, qui certas literas Alphabeti exprimere non valent. Affectio autem varia esse potest. Primum quidem breuitas lingue, quæ tamen rarissima est. Deinde eius intemperies humida & mollities. Hæ namq; sunt naturalis balbutiei causæ, a quibus fit, vt lingua prioribus dentibus malè innitatur; breuior quidem propter breuitatem; humidior uerò propter imbecillitatem. Humidiores enim linguæ musculi non possunt firmiter stabiliri, quod est tamen necessarium ad litterarum & pronuntiationem. Itaq; eas tanquam & pronuntiant,

pro πρᾶυλός dicentes πρᾶυλός. Plurimi quoque balbutiūt ab externa causa, vt qui plurimum dicendo, aut tibia canendo, & ex febre vehementem linguæ siccitatem contraxerunt. Lingua enim his euadit imbecilla, nec propter siccitatem dilatari potest. Balbutiunt etiam aliquando ebrii, lingua & cerebro humore nimio perfusis & prægrauatis. Itaque patet præcipuam terē balbutiei causam sitam esse in superflua humiditate: propterea scripsit Hippocr. balbos alui profusio maxime corripī.

Tremor, vide Palpitatio.

Tremor oculorum, id: Mollities.

Trichiasis, id est, *Pilare malum*, morbus est, in quo cū crassa vrina, veluti capilli vna exeunt, 4 aph. 76. Siquidem talia quædam corpora in renibus possunt concre-
scoere, & ab humore crasso, & viscido, vito e calore, vt docet Gal. Adhæc *Trichiasis* est affectio, in qua pili inu-
tiles, & pungentes palpebris incalescunt, 4. de comp. med. loc. c. 8. vide *Phalangosis*. Prouenit malum hoc ex
superflua humiditate, ex qua pili, tanquam herbæ in
humida terra luxuriant, vel palpebræ ipsæ resoluuntur,
nimio humore redundantes. *Τριχίασις* etiam vocatur
mammarum dolor, quem pilus aliquando mouet in po-
culo fortē haustus. Is autem non sedatur, donec pilus
vel gressus spontē exeat, vel cum lacte exugatur. Id
mali genus etiam *τριχίασις* vocant.

Triens, hoc est, viciæ quatuor, 4. de compos. med. per
loc. cap. 84.

Triglochina, siue *Triscula*, figura est, qualis E. G. inest
quinque membranis cordis, tribus in dextera parte,
duabus in sinistra consistentibus, similis figuræ triangu-
lari, & telorum cuspidibus, 7. de anat. adm. c. 9.

Trigona medicamenta sunt, ex seminibus composita

quæ sicut ad torporem inducendum mitiora, ita in futurum sunt minus tuta: quibus omnibus vtilius anodyna lumuntur, 12. method. cap. 1. Τρίψις, *Pastilus*, in medicina olim celebris ad sistendos dolores: est enim stupefactorius. Sic dictus fuit à figura, quæ fingebatur, non à numero medicamentorum. Constat enim quatuor medicamentis; semine apij, semine hyoscyami, aniso, & opio, sed quorum pondera non sunt eadem Galeno, Paulo, & Aetio.

Tripsis, vide *Anatripsis*.

Trismus, siue *Trysmos*, Latinis *Seridor*, est conuulsio musculorum mandibularum, ex qua fit dentium inuita coneuulsio, 2. de caus. syrapt. cap. 2. Τρισμός, siue τρυσμός, sonitum edit, sed tenuem ex instrumentorum angustia. Ex flatuoso autem spiritu cum exiguo humore efficitur.

Trisulea, vide *Triglochina*.

Tritæophyes (quæ & *Tritæus*) febris, est tertianæ naturam sapiens, quæ tertio die exasperatur, & ferme in integritatem remittitur; sed si qua febris, tertio quoque die exacerbatur, neque per minimum interuallum ita mitescat, vt in eo febricitans prope sinceram infirmitatem assequi videatur; hanc si quis *tritæophyes* nominare velit, forsan & ipse non sine ratione in hanc sententiam descendere videbitur, comment. 2. in 6. de morbi vulg. 23.

Tritæus, vide *Tritæophyes*.

Trius, Græcè Τρίς, apud Hippocratem significat eam corporis partem, cui siue stantes, siue ambulantes, siue sedentes, siue iacentes, innitimur; ut stantibus nobis, atque ambulantiibus, plantæ pedum; nates, sedentibus; spina tota, supinis; cubito, innitentibus cubitus, 2. de his quæ in med. Sic etiam vt author est Galen. apud Hippocratem, locus tritus dicitur & callosus.

Trochantera, Latinis *Tuberculum*, magni ossis femoris processum in specie sic vocant, 2. de anat. adm. cap. 6. & lib. de ossib. cap. 21. vide *Femur*.

Trochiscus, vide *Pastilli*.

Trochlea brachij, vide *Bathmides*.

Tromata, Latinis *Ictus*, nominat Hippocrates magnas noxas, ab aliquo extrinsecus, etiam sine vulnere illatas, comm. 5. in 6. de morb. vulg. 12. Vide Hippocrates *τρυφερα* vocat eum, qui quouis modo offensus sit.

Tremos, idest, *tremor*, 2. meth. 2.

Trysmos, vide *Trismus*.

Tubercula, sunt quædam sponte nascentes, & celerimè factæ inflammationes, quæ celerimè in altum attolluntur acumen, & celerimè suppurantur, & plurima horum in inguinib., & alis, est generatio, quoniam in his partibus multi sunt adenes, qui apti natura sunt ad has superfluitates promptè excipiendas, 2. aph. 26. *Tuberculum* insuper *Phyma* nominat Hippocrat. quod alibi ipse solitus est vocare *Suppurationem*, Græcè *Empyema*, 7. aph. 8. de tumor. cap. 15.

Tumor, vide *Oncos*.

Tunica cordis, sunt corpora tegentia extrinsecus utrumque ventriculum cordis, 5. de vlu part. c. 8.

Tunicarum nomine, quidam sola composita operimenta designant; alij autem crassa; alij, nisi composita simul, & crassa extiterint, eis appellationem hanc non tribuunt. Ad eundem autem modum, & de *membranis* litigant; quibusdam enim simplicitas sufficit; aliis autem tenuitas; alij ambobus opus esse arbitrantur, ut ita nominentur; & nisi tenue fuerit simul, & simplex operimentum; id nolunt vocare membranam; At Antiqui certè, *tunicas*,

membranas, *meningas*, præter hæc omnia alia operimenta sic vocât; quos nos quoq; sequētes, a vana quidem in nominibus garrulitate discedemus, 4. de vſu part. c. 9.

Turgere, verbum est translatum ab animalibus concubitu appetentibus, ad humores; nam sicuti illa stare loco non possunt, quadam titillatione impulsæ, eoque affectu concitata, motu feruntur turbulento; & sic humores plerumque in motu vehementiore, atque transfluxu a partibus ad partes, in morbi principio, mouentes, titillantes, & quiescere non permittentes, cùm & ipsi pariter moueantur, & transfluant, & perenni hac sua latione ægrum molestant, turgere dicuntur. Tales ergo dicuntur *humores turgentes*, qui sunt in motu, latione, & fluxu, 1. aphor. 22.

Turgidus dolor est, qui a parte primario affecta, veluti è radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur, loc. aff. 2.

Turgidus pulsus, vide *Gracilis*.

Tussis, est vehementissima quædam afflâtio, quæ plurimum simul, celerissimèque foras actus spiritus attrahit, propellitque vna secum suo impetu, quæ vias suas obstruunt, 2. de sympt. caus. 4. Cùm enim externus aer in asperas arterias trahatur, quæ cartilagineæ duræque sunt, nec contrahi circa, id; quod continent, possunt, incitatum hunc excogitauit spiritus exitum, quem vocant *tussim*, quo spiritus sibi ipsi violenter, & cum impetu delatus, vias expurgat, non aliter quam tubos, & fistulas expurgant harum opifices; 4. de caus. sympt. 3.

Tussis sicca, in qua nihil expuitur, 4. aphor. 54.

Tylosis, id est, *callus*; sic autem nuncupatur, cùm in palpebris asperitates ex senectute crassiores, albidiores, & parùm sensiles exititerint, eoque minùs deleri possunt, lib. Introd. cap. 15.

Tympanias, qui & *Tympanites*, Hydropis est species, in quo spiritus flatulæ crassæ, frigidi, totam thoracis superiorem, & inferiorem regionem, tumentes facit, 4. acut. 111. vide *Ascites*.

Tynesmus, qui & *Tinesmus*, & *Tenesmus*, appellatur, est recti intestini vehemens tensio, & assidua deliciendi cupiditas. paucis admodum sequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa & pingua, progressu verò temporis, etiam abrasionis specie deliciuntur, & illis, quæ a supernis descendunt, haudquaquam misceri videntur, 6. loc. affect. 2. *Tinesmus* (alibi dicit Galenus) vlcus est in recto intestino factum, quod quidem infert symptomata Dysentericiæ similia, nixus tamen multò vehementiores, quam sunt dysentericorum, 3. de sympt. caus. cap. 2.

Typhodes febres, id est, Succedentes, ut *Causodes*, Incendentes, sunt, quarum media est *semitertiaia*, 1. aph. 12. *Τυφώδης πυρετός*, nomen est febris continuæ & ardentis, non per se quidem natæ & essentialis, ut vocant, sed symptomaticæ, & à tecinoris erysipellate excitatæ. Vbi enim viscus id erysipellate afficitur, febrem inde ortam, *τυφώδη* Veteres appellarunt, sicut à ventriculi erysipellate *λειπυρίαν*, & ab eo qui pulmonem infestat, *κρυμώδη*. Galenus commen. in aph. 42. lib. 7. Vide *Febris typhodes*.

Typhomania, (quæ & *Typhonia*) est Delirus lethargus, vel Lethargicum delirium, lib. fin. *Typhomisa* appellatur, commissus affectus ex lethargo, & phrenitide, lib. de Comat. cap. 2. Ego verò, quoties ad finem usque tum desipientia, tum Coma persistunt, affectionem hanc ex phrenitide, & lethargo mistam, appello; quidam *Typhomaniam* vocauerunt, 1. prorrh. 1.

Typus, est ordo intentionum, & remissionum; *Pe-*

riodus, siue *circuitus*, est tempus intensiōum, ac remissiōum in morbis factum, lib. de Typis, cap. 2. siue, est formula quædam accessiōis, cū vel subsequitur, vel anticipat. Definitur quoque, quod sit reditus ab eodem, ad idem, 1. cris. 3.

Tyria, apud Arabes, & barbaram sectantes medicinam, idem est, ac *Ophiasis*; *Tyri* enim voce, omnes serpentes; & potissimum *Viperas* intelligunt.

V

V *Acuatio*, Græce *Kévous*, vide *Purgatio*.

Vacuus pulsus est, qui arteriæ eleuationem facit bullosam, vt digitorum impressiōi egressus, per vacua occurrat, 1. de diff. puls. cap. 6.

Vagina, vide *Membrana dura*.

Vaginalis tunica, vide *Elytroides*.

Valga, appellantur crura, in exteriorem partem vergentia; quæ verò in interiorem, *vara*, & *manca*, 3. de his, quæ in med. 31.

Vapor, humor est extenuatus, qui pluribus est in spiramentorum raritate, corporis mollitie, substantiæ fusione, 1. simpl 8.

Varices, siue *Cirfas*, venas omnes dilatatas antiqui appellabant, lib. de tum. 16. *Varices*, sunt venæ latiores in coxis, testiculis, & cruribus, quæ ex crasso, & melancholico sanguine turgent, adeo ut pellente natura, ad partes ignobiliore, humores crassos, & melancholicos, diætarum passionum generatio sequitur. 6. aph. 21.

Variciformis flexus, vide *Flexus variciformis*.

Varicosus assistens, vide *Genitalis*, *Glandulosi assistentes*, & *Meatus genitalis*.

Varicosus Meatus, vide *Genitalis*.

Varus, exiguus durusque tumor est, in faciei cute obortus, Græcè *Ionthos*, qui differt à ficosis tumoribus in mento

mento prouenientibus, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod participet tenui quadam sanie, ratione cuius facile vlceratur, non rectè, atq; ex arte curatus, lib. de remed. par. fac. cap. 11. uide *Ionthos*, & *Ficosus tumor*.

Vasa deferentia, vide *Glandulosi assistentes*.

Vasa spermatica, Seminaria, quæ vulgò *Praparantia* appellantur, vide *Glandulosi assistentes*.

Vehemens pulsus (siue *validus* & *fortis*) est, qui violenter tactum impellit, & quasi ferit: *remissus*, siue *languidus*, qui debiliter, de puls. ad Tyron. c. 3. & lib. 3. de diff. puls. cap. 5.

Vehementia morbi, est ea, quam *magnitudinem* vocant, & *mos morbi*, quem *modum*, siue *naturam morbi* appellant, 1. cris. 3.

Vellicationes, seu *discrepationes*, iunioribus Medicis appellantur *convulsiones*, quæ in *fibris musculorum* contingunt, dum nimis intentæ, interdum rumpuntur, 3. de his, quæ in med. 30.

Vena, φλέψ, est vas spermaticum, vna constans tunica, fibris triplicibus contextum, sanguini deferendo destinatum: *vena* etiam nomine, *arterias* comprehenderunt Veteres: quo sensu Plato in Timæo, *venas* à corde oriri asserit, vt restatur Galen. 6. de Placit. vide *Arteria*. Prodit autem *vena* omnis ab hepate, quæ modò verè & simpliciter *vena* dicitur. Nam si quis contendat *venam arteriosam* à dextro cordis ventre nasci, vt certum id est, sic ea non simpliciter *Vena* dicitur. In vniuersum autem duæ ab hepate oriuntur; vna, à *sima* eius parte; altera, a *gibba*. Quæ ex *sima* oritur, variis nominibus appellatur, μεγάλη, ἢ ὀπί τα πύλας, μεγάλη ὀπί πύλας, & στελεχιάς, quod sit aliarum velut quidam truncus: Vulgò *Vena porta* dicitur. Hæc in *sima* parte hepatis

patis quinq; interdum pluribus paucioribusve radicibus actis, & postea in vnum truncum coalescentibus, iecoris portis vna, amplexu egreditur: paulòque postea in duos maiores ramos diuiditur, quorum vnus lienem petit, alter fertur in mesenterium, vterque in quamplurimos ramos diuisus. Quæ autem à gibba parte iecoris proficiscitur, pluribus similiter nominibus vocata, est ab ipso Gal *μεγίστη, κοίλη, ήπατική*. Ea venarium omnium capacissima est, sparsisq; aliquot radicibus intra iecoris partē gibbā similes Venæ portæ radices spectantibus, & propemodū tangentibus, mox seu truncus vnus emergit, nec multò post in ramos duc scinditur, quorū vnus in superiores, alter in inferiores partes fertur.

Vena arteriosa, Vide Arteriā venosa.

Vena axillaris, vide Axillaris vena.

Vena azygos Græcè, *Coniugio carens* Latine, vulgò *Vena sine pari*, ea est, quæ in quibusdam animantibus iuxta cor adnascitur; in quibusdam vero vt in hominibus, ex ea emergit parte, qua cordis aurem dextram Vena caua tangit: Hinc, si quidem emergens, humilius, depressiusque per cor defertur, atque in spinam contorquetur, 1. acut. 10.

Vena Basilica, Vide Axillaris.

Vena capillaris, vide Apanthismos.

Vena capitis, Vide Humeraria.

Vena caua, Vide Caua vena.

Vena cephalica, Vide Cephalica vena.

Vena communis, Vide Communis vena, & Media vena.

Vena coniugio carens, Vide Vena azygos.

Vena coronalis, siue *Stephanica*, *Vide Vena Peristephania.*

Vena crassa, Vide Crassa vena.

Vena cubiti externa, Vide Humeraria.

Vena

Vena cubiti interna, Vide *Axillaris*.

Vena emulgentes, Vide *Emulgentes vena*.

Vena & Arteria umbilicales sunt, quæ uteri acetabulis adhærescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & per quas alimentum trahit, i. de semin.

Vena guidez, Vide *Apoplectica*.

Vena hamorrhoidales, Vide *Hæmorrhagia*.

Vena ingulares, Vide *Apoplectica*.

Vena mesaraica, Vide *Mesenterium*.

Vena funis brachij, Vide *Funis brachij*.

Vena hepatica, Vide *Axillaris*.

Vena humeralis, Vide *Humeraria*.

Vena iecoraria, Vide *Cava vena*.

Vena ischiadica, Vide *Ischiadica vena*.

Vena lata, & magna dicitur *Vena humeralis*, i. de art. 53. licet comuniter Medici, & Anatomici, magnam vocant *Venam portæ*, sicut *Canam mixtam* appellant.

Vena manifesta, Vide *Manifesta vena*.

Vena media, Vide *Communis*.

Vena nigra, Vide *Media cubiti vena*.

Vena Peristephania (Latinis *Coronaria*) est, quæ cor ipsum coronat, principiumque sui ortus extra membranas habet, 6. de vlu par. cap. 24.

Vena Poplitis, est ramus medius *Venæ cavæ*, qui deorsum ad Popliteum fertur, ubi vulgò *Vena poplitis* dicitur, & per profundum Suræ procedens, non modicam in musculos eius ramorum sobolem spargit, atque ob id hæc vena communis, seu *media*, dicitur, quemadmodum etiam in manu, lib. de diss. ven.

Vena porta, Vide *Cava vena*.

Vena purpurea, vide *Communis vena*, & *Media vena*.

Vena saluatella, vide *Saluatella vena*.

Vena saphena, vide *Saphena vena*.

Vena

Vena sine pari, vide *vena axygos*.

Vena splenica, vide *Splenica vena*.

Venericos oculos appellant eos, qui suffusione affecti sunt; fiunt autem *Venetici oculi* duobus modis, vel propter aquam, si nimium fuerit coagulata; vel propter siccitatem, quam patitur crystallinus humor, lib. de ocul. part. 4. c. 12.

Ventralis dispositio, vide *Cœliaca*.

Ventrem superiorem, Veteres appellant *Thoracem*; alimenti autem receptaculum, siue abdomen, omneque id, quod à septo transuerso est, *ventrem inferiorem*. Interdum autem *ventrem superiorem* nominabant, in quē cibi assumuntur, quæ ab eo sunt omnia, *ventrem inferiorem*; Interdum quoque sola sic nominant, *crassiora intestina*. Denique sunt, qui Colon duntaxat, *ventrem inferiorem* vocant, 4. acut. 112. 7. Aph. 38.

Ventriculus est, in quem primò animalia cibum pertrahunt, 6. de anat. adm. cap. 2. Aliquando *ventriculos superius* per abusum, pro *stomacho* sumitur, lib. de cur. rat. per sang. cap. 1.

Vermiculans pulsus est, cū species nobis tangentibus exhibetur quasi perreptantis arteriam vermis, vndarum in modum insurgentis; idem ille paruus est languidus, & creber. Sin autem non paruitati, sed magnitudini sit adiunctus, dicitur *undosus*; si ad extremam deueniat remissionem, crebritatem, & paruitatem, *formicans* dicitur, de Puls. ad Tyronem, cap. 8. & 1. de diff. puls. 26. & 27.

Vermiformis excrescentia, siue *Epiphysis*, vide *Vermis Cerebri*.

Vermis cerebri, est obstaculum quoddam, quod habet pars ea, quæ a medio Cerebri ventriculo, ad posteriorem itur, cuius forma est sicut pinea, lib. de ocul. par. 2. cap. 2.

cap. 2. Quin particula quæ iam Cerebri incumbit meatui, qui est a Cerebro ad Cerebellum, quæ circumscripti-
tionem obtinet figura vermi similem, in lignis enateen.
ti: Hinc etiam Anatomici *excrefcentiam & processum*
vermiformem, corpus hoc, quod totum meatum conte-
git, vocant, 9. de anat. adm. 5. dicitur & *vermiformis epi-*
phycantes, 9. de anat. adm. c. 5. ac *vermiformis epi physis*,
8. de vsu part. c. 14.

Vernaculus morbus, vide *Communis*, *Endemus*, &
Epidemius.

Verricularis, vide *Amphiblestæroides*.

Verrucosa, vide *Dura ulcera*.

Vertebra, vide *Dorsum*.

Vertex, *Apex*, aut *Mucro cordis*, est inferior visceris
terminus, figura turbinatus, qui infernæ pectoris ossis
regioni cohærescit, vbi etiam mucronata cartilago
constituitur, 7. de anat. adm. c. 3.

Vertex capitis, (Græcè *κορυφή*) in media capitis re-
gione sinciput superante, est collocatus: vnde velut
a centro circulus, capillorum prouentus, incipere vi-
detur, lib. Introd. c. 10. Sunt qui eo nomine intelligant
capitis partem inter sinciput & occiput mediam & sum-
mam: Ea *σφαίρα* proprie dicitur. Sunt verò qui partem
eam capitis interpretentur, in qua capilli alii ad dex-
tram, alii ad sinistram inuertuntur, vt non sit aliud
κορυφή, quam linea illa, quæ capillos in duas partes di-
stinguit. Vnde & *διχόρυποι*, id est, *Bivertices*, dicuntur,
non ij quidem, quibus os summum capitis geminum
sit, sed illa potius linea discrimenque capillorum Rufus
κορυφῆν definit id quod in medio est, per quod maximè
voluntur capilli. Id quod etiam secuti Latini, *verticem*
dixerunt, a *vertendo*, nimirum propter flexum capillo-
rum, quod illic velut in gyrum ij vertatur: Quam etiam

ob causa quidam ex Græcis, ἐλγμὸν, & πλὸν ἀπὸ τοῦ πλεῖν, hoc est, a *vertendo*, eandem partem appellarunt.

Vertigo, est affectio, qua caput absque externis causis in gyrum circumagi videtur, 4. acut. 42. vide *Scorodizos*.

Vesica fellis, vide *Cystis Choledocos*.

Vestigium, vocatur inferior pars pedis, 2. de fractur. cap. 10.

Veternus, est grauis sopor, de caus. morb. cap. 3. siue ignauia & stoliditas cum somnolentia, 1. prorrh. 31. & 2. aph. 3. Dicitur autem *Veternus*, quasi *veteranus morbus*, qui *Lethargus* vocatur, in quo ægri veteranorum, id est, senum more, inexprigibilibi somno detinentur. Terentius in Eunucho.

Vibratio, siue *Agitatio*, est violentus totius corporis huiusque partim motus, ut conquiescere non liceat, etiam si strenuè admodum renitaris; differens à *Tremore*, qui, nisi partem mouere velis, non accidet, lib. de trem. palp. c. 6.

Vibratus pulsus, (Græcè κλονέδης,) vide *Convulsivus*. Hic pulsus perpetuo durus est, & propter duritiem vehemens. Fit autem cum valida est facultas, instrumentum durum, & vrgens vsus, quorum vnum si absit, *vibratus* fieri non potest. Galen.

Victum appello, non hunc tantum, qui cibo, & potione constat, verum etiam, qui omnibus aliis, ut otio, exercitatione, balneo, venere, somno, vigilijs, & omnibus, quæ quouis modo fiunt in humanis corporibus, ipsamque adeò viuendi rationem, com. 3. in 3. de morb. vulg. 9.

Villi, vide *Fibra*.

Vinacia, sunt solidæ vinarum reliquæ, cum in torculari succus ipsarum omnis expressus fuerit, 2. de aliment. facult. 9.

Vinum aparachyron, id est, originale, cui marina aqua non est addita, 4. de comp. med. loc. c. 7. cui proinde opponitur *vinum tethalassomenon*, 3. acut. 2. Ἀπαράχυτον, dictum vinum est ad eius laudem à mercatoribus, quasi purum & sincerum, nec adulteratum aqua marinæ mistura, tanquam per se satis firmum & generosum. Neque enim nobilibus vinis misceri solet aqua marina, sed imbecillioribus, quæ θαλάσσια & τεθαλασσωμένα ob id dicebâtur, ut eo quasi fucò adulterata, calidiora, & acriora viderentur, tum ut facilius à mercatoribus conueherentur, & longæ viæ incommoda perferrent, atque etiam diutius seruari possent. Sed temperandi ratio varia fuit, ut docet Dioscorides. Alii, inquit, statim cum decerptæ sunt vuae, aquam maris admiscunt. Alij, in area vuas Sole siccant, quibus calcatis, marinam adijciunt. Alii, passas, prius vuas, in dolis marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: quod tamen magis passî generibus adscribitur. Omnia eiusmodi vina siccant, sitimque inducunt, pro modo aquæ marinæ admistæ stomacho aduersantur, nervos infestant, alio tamen apta esse, Dioscorides prodidit. Fuerunt huius generis, ut idem ait, vina Coa & Claromenia, quæ propter plurimæ aquæ marinæ mistionem facile corrumpuntur, flatus mouent, aluum turbant, & nervis officiunt. Splenicis quidam Vete res exhibuerunt. Dioscor. lib. 5. meminit etiam vinorum ἀπαράχυτων, quæ admistam sapain recipiant: quæ quidem reuera ἀπαράχυτα sunt, id est, aquæ marinæ expertia, sed tamen aliquo liquore adulterata, sapâ scilicet immista.

Vinum vinosum, vide *Hydrotodes*, & *Oenodes*.

Virtus naturalis, vide *Virtutes*.

Virtus ratiocinatrix, vide *Virtutes*.

Virtus vitalis, vide *Virtutes*.

Virtutes

Virtutes, (quas *facultates* Medici vocant, Plato *animas*) sunt tres illæ, quæ toti corpori, ex principiis, suo veluti fronte distributæ, animal gubernant. Prima, *naturalis, alatrix, appetitrix, alterans, & concoquens* appellatur, 2. progn. 26. ad nutriendum animal necessaria, stirpibus communis, quæ Iecur veluti pro fonte habet; canales verò, ab hoc in totum corpus sparfos, obtinet ipsas venas. Altera, *facultas*, seu *anima vitalis*, & *animosa* appellatur *virtus*, quæ non modo vt stirpibus, aut vita præditis, sed etiam vt animalibus, anima est insita, sedem habens in corde, cuius canales arteriæ sunt. Posterior, *Ratiocinatrix*, in Cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus, vna cum sensibus præsidens, cuius canales sunt nervi, sensum motumque in totum animal deferentes, 9. meth. 10.

Vitalis motus, vide *Motuum species*.

Vitellinabilis, quæ & *Lutea* dicitur, vide *Bilis pallida*.

Vitiliginum, quas *Alphos* vocant, *generatio similis* est generis, cum eo affectu, quem *Leuce*, siue *albam vitiliginem*, Arabes, *Albaras* appellant, non tamen sub iis tota caro vitatur, vt in *Leuce*, sed in summo corpore, veluti squamæ quæpiam, *Vitiliginis* infiguntur; albæ quidem, ex pituitoso; nigrae, ex melancholico succo exortæ, 3. de sympt. caus. c. 2. In *Vitilagine* autem alba, fit nutrimenti appositio, non assimilatio, 1. de anat. fac. c. 11. *ἀλφός* est vitiosa macula & fœda in corporis cute, apparens, & ex malo corporis habitu excitata, sed sine manifesta cutis, asperitate, sine squamis, sine exulceratione. His enim notis psora, lichene; & lepra, cæterisque huius notæ tumoribus distinguitur. Dicitur ex eo quod colorem cutis imminuet. Immutare enim apud Veteres *ἀλφαίνειν* dicebatur. Est autem *ἀλφός* non totius quidem carnis affectio, sicut Cancer, & Elephas, sed
summa

summæ modo carnis cutisque ab improbo sanguine, alias pituitoso, alias autem melancholico proueniens qui cum probè adhæreat affectæ parti, non tamen assimilari potest. Eius tres species sunt, ἀλγὲς, μέλας, ἰσχυρὴ. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acupungi. Si sanguis exit, quod ferè fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest.

Vitreus humor, à Praxagora appellatur *vitrea pituita*, pituitæ species est frigidissima; quippe vitro fuso, tum colore, tum substantia haud absimilis, 2 loc. affect.

Vitreus oculi humor, vide *Hyeloeides*, & *Crystallinus*.

Vlcera dura, vide *Ochthode*, & *Dura vlcera*.

Vlceratio oculi, est ruptio circa corneam tunicam, quæ vel ex ictu, vel ex phlegmone oritur, lib. finit.

Vlcus, quod Græci *Elcos*, vide *unionis solutio*.

Vlcus depascens, vide *Phagadenas*.

Vlna, vide *Cubitus*.

Vlomelia, idest, *solimembra*, est totius corporis, ex membris compago, 1. de usu par. 8.

Vmbilicus, nihil aliud est, quam multitudo magnorum vasorum, quæ ex multis paruis venis, & arteriis, & propaginibus earundem per totum Chorion dispersis, conflata eo loco vnitur, per quæ ipsissima vasa, & sanguis, & spiritus, ad fætum deriuatur, in medio vrinaculum habentium, lib. de diff. vult. cap. 10.

Vncia, habet drachmas octo, quæ drach. etiam *Holce* dicuntur; Drachma habet siliquas duodeviginti, alii dicunt scrupulos tres: scrupulus, siue scrupulus, habet obolos duos, (hodie gr. xx.) obolus siliquas tres, lib. de pond. & mens. cap. 3.

Vndosus pulsus, vide *Vermiculans*.

Vnguis, siue *Vngula*, vide *Prerigium*.

Vnio, vide *Prosthesis*.

Vnionis solutio, siue *Continuitatis solutio*, est morbus, in quo partes, quæ secundum naturam vnionem acceperunt, inter se soluantur, lib. de constit. art. cap. 6. quæ quidem vnionis solutio, si in osse fiat, dicitur *Fractura*, seu *Catagma*; in nervosis musculorum partibus ex distentione, *ruptura*; in febris, *Convulsio*, seu *Spasmus*; in carne ex vulnere, *Incisio*; ex aliquo acuto, *Punctura*, seu *Punctio*, ex aliquo graui. *Contusio*; ex erosione in osse, *Teredo*, in carnosis partibus, *Ulcus*; in instrumentalibus & ligamentis, *Anulsi*, siue *Apospasma*, ibidem; in vasis musculisque, ex violento ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitata, *Rhegma*, & *Tblasma*; cum contusione & ruptione, *Ecchymosis*, 4. meth. 1. ab aliquo acuto accursante, atque abscidente, *Incisio*, *dissectio*, & *Sedes*, l. de caus. morb. c. 11.

Vniuersalis morbus, vide *Communis*.

Vniuoca, Vide *Æquinoca*.

Vocis organa voco, per quæ spiritus redditus vocem efficit; hæc sunt aspera arteria, guttur, fauces, veluti spiritus plectrum, per ipsas transeuntis; nam hæc vocis instrumentum sunt, vt locutionis, lingua.

Vola manus, nominatur supina pars manus, iuxta pollicem assurgens, Græcè *Δέσπ*, cui pars opposita, *Hypothenar*, & *Subnola* vocatur, 1. de usu part. cap. 17.

Voluntarius motus, vide *Motuum species*.

Voluolosa, *Stomachi subuersio*, vide *Subuersio*.

Voluulus, vide *Chordapsus*, & *Ileos*.

Vomica, vide *Fistula*, & *Sinus*.

Vomit, & *Nausea*, expultricis facultatis ventriculi deprauati motus sunt, ad ea, quæ huius in cauitate continentur,

tinentur, noxia quàm citissimè per stomachum vacuanda; Nec idem est vomentibus & singultientibus motus, quippe in vomitionibus ea, quæ in capacitate sunt ventris, reijciuntur; in singultu, quæ in ventriculi sunt substantia, & fibrosis nexibus simili scilicet cum affectu, tum motu, qualis est ille, qui ex intemperie tuſſiunt, omnibus nimirum ventriculi partibus, quod sibi moleſtum eſt, expellentibus, 3. de ſympt. cauſ. cap. 2.

Vrachos, appellatur meatus, & ligamentum, quod infantis umbilico iungetur, ex quo etiam ille enaſcitur, & ſuſpenſus eſt, qui ipſe meatus mutuo congreſſu quinque vaſorum umbilicalium abſolvitur; nam a venis, quæ ſecundas implent, binæ procedunt venæ, ab arteriis ibidem ſitis, itidem binæ arteriæ, & a nervis unus nervus, qui complicari mutuo, umbilicum abſolvunt, lib. Introd. cap. 11. vide *Umbilicus*, & *Vrinaculum*. *Qupaçòs*, ſive *επαχòs*, allantoecides tunicæ eſt initium, perforaturque laus lento & evidenti meatu ad fundum veſicæ ipſius foetus, ſic vt allantoecides cum veſica *τῷ επαχῶ*, qui medius inter utraque eſt, coniungatur. Per eum urina foetus deſertur in allantoecidis cavitatem longam, anguſtam, rotundam, quæ in ipſius fines magis eſt funditur, ne amnion, chorion, uterus, ipſumque foetum premat. Neque enim urinam retineri intra veſicam expediebat, neque per veſicæ cervicem reddi, ne foetui circumfula, eius cuem exulceraret.

Vranicus, id eſt, *paruum cœlum*, quod Latine *palatum* dicitur, pars eſt oris ſuperior, a cœli ſimilitudine nomen accipiens, lib. finit. quod in cœli modum cameratum ſit. Dicitur etiam *επαχòs*.

Vrentia, vide *Cauſtica*.

Vrereres, ſunt meatus quidam oblongi, & fortes,

Pori urinarij dicti, qui renes vesicæ committunt, ducentes per colatoria, vrinas à sanguine segregatas, ad vesicam, 5. vsu part. 5. Qui *urinarij* meatus, nec *arteria* sunt, cum nec pulsent, nec duplici consistant tunica; neq; *vena*, quia sanguinem in se nullum continent, nec similem omninò uenæ habent tunicam; a nervis cutem plùs distant, quam à iam dictis, 1. natura. fac. c. 6. *Ουρητιπες & οφρητικοί πόροι* dicuntur Græcè. Habetur autem vring; unus, qui constans tunica tenui, sed densa, & fibris tantùm obliquis texta, à renis sinu per eius siman partem super lumbos fertur, ubi alteram à pritonæo tunicam venulis & arteriis intertextam mutuatur; tandem verò inter vesicæ tunicas spatio breui interlapsus, paulò supra vesicæ os in ipsius capacitatem erumpit. Ad ipsum autem foramen membranulæ geminæ ex vesicæ corpore propendent, veluti pcoessus quidam, quæ vrina in vesicam ab vretere delabente cedunt & aperiuntur, eademque, ubi vesica plena est, vrinam in vretera regeri & remeare prohibent.

Vrethra, siue *Vrithra*, est meatus pinis, vrinæ reddendæ accommodatus, quem & *fistulam urinariam* appellant, 4. aph 82 Oritur à ceruice vesicæ, 1. loc. aff. 1. vide *Fistula urinaria*.

Vretica, vide *Diuretica*.

Vrina, quam Græci *οὐρ* vocant, est excrementum tenue, & aquosum sanguinis, 5. vsu part. 5. vide *Lotium*.

Vrina optima, cuius sedimentum album, & læue, & æquale extiterit omni tempore, usque dum iudicatus fuerit morbus, lib. de atra bile, cap. 8.

Vrinaculum, quod Græci *ὀρηχόν* vocant, est & dicitur illud, quod ex venis duabus, eisdemque arteriis, & vno nervo simul in *ὀρηχόν*, siue muliebribus iocis, quan-

quandam quasi caudam conficit: hoc meatu, qui à suprema foetus vesicæ fundi regione, per vmbilicum in cauitatem pertinet, quæ inter secundum, & tertium consistit inuolucrum, lotium in alantocidem tunicam deriuatur. Hunc solers natura excogitauit atque fabrefecit, vt foetus vrinam, longius à corpore summoueret ipsius, & ne per vesicæ ceruicem vrina reddita, admotaque teneræ cuti, ipsam sua exulceraret acrimonia. Apud Hippocratem lib. ωει καρδίας, ita legitur: Οὐδὲ τῆς καρδίας νίμεται τὴν ἐχάτην, ἀλλ' ἐγκλινάται πρὸς τὴν ἐπαχύν, ἢ σπέρων ἐς τὴν vbi pro *mucrone cordis* lumitur. Vel breuius: *Vrinaculum* est meatus, qui ex fundo vesicæ exortus, lotium in tunicam allontocidem prægnantis mulieris deriuat; quæ ita similitudine figuræ, quam habet cum intestinis, appellatur, 15. de vsu par. cap. 15. vide *Vrachos*, & *Vmbilicus*.

Vrinarij, vide *uretes*.

Vrinaris meatus, Græce ἐπαχὺς, ὑποθα, vide *ureteres*.

Vrina difficultas, & *suppressio*, vide *Ischuria*.

Vrina profluum, vide *Diabetes*.

Vrina stillicidium, vide *Ischuria*, 3. aphor. 16.

Vrina substantia, vide *Consistentia*.

Vron, vide *urina*.

Vteraria, vide *Hysterica*.

Vteri suffocatio, est respirationis ob vterum præter naturam affectum ablatio, quæ & *Apnæa* vocatur: eandemque *Vterinam suffocationem*, & *strangulationem* appellant, 5. aph. 35. denique & *Hysterium morbum*, 4. de caul. pull. 22.

Vteri Rheuma, vide *Menses*.

Vterus, Μῦτρα, *Vulua*, & *Matrix* appellatur, est ea corporis pars, quæ mulieribus ad concipiendum & pariendum, à natura est concessa, 6. loc. affect. 5. Ma-

gacitudo mediocris vteri longa, ut plurimum est vnde-
cim digitos, à fundo ad pudendum. Ad illa autem præ-
cipue cornibus extenditur. Distinguitur autem uterus
sinu duplici, quem *κόλπον* appellant, dextro & sinistro
per illam tunicæ propriæ in medio glutinationem sutu-
ra quidam, qualis scroto inest, obscuriore tamen foris
designatam. Vteri os in virginibus & utero gerenti-
aus, & sterilibus, & parere cessantibus est glandi uirili
persimile: parturientibus uerò, & recens enixis adeò
extenditur & patet, ut nihil eius supersit, sed cavitatis
una propè æqualis à fundo uteri ad pudendum appa-
reat. Id os à conceptu multum contrahitur, teste Hip-
pocrate, mediocriter autem aperitur, dum semen
recipit, aut ipsum excernit, uel menses: idem os epi-
ploon inter uescicam, & uterum illapsum in ualde ob-
esis comprimit, & conceptum impedit, ut scribit Hip-
pocrates. Vteri collum est corpus musculosum carne
dura & cartilaginosa constans, in annos semper magis
durum & cartilaginofum euaiens, ita ut vetulis iam
sit simile summitati alperæ arteriæ, ut rectè compa-
rauit Herophil. Colli autem uteri os, *Cunus* Latine
dicitur.

Vtricularij, uide *Hyderici*, & *Ascites*.

Vua, uide *Gargareon*, *Staphyle*.

Vua, *Paristhnia*, & *Tonsilla*, nihil aliud sunt quàm
inflammationes: *Vua* quidem *Gargareonis*; *Tonsilla*
uerò ad ienum eorum, qui in principio faucium inter se
oppositi sunt, quemadmodum *Paristhnia*, corporum
eorum, quæ in faucibus sunt. Videtur autem Hippoc.
non omnem *Gargareonis* inflammationem *Vuam* no-
minare, sed vnâ solam speciem, qua *Gargareonis*
terminus similis acino uuæ est, lib. de tumor. cap. 17.
uide *Staphyle*, & *Gargareon*.

Vua vinosa, quæ nullum uehementem qualitatem habent, 2. de aliment. fac cap. 9.

Vua oculi tunica, uide *Rhagoeides*, & *Cerulea*.

Vuiformis, uide *Rhagoeides*, & *Cerulea*.

Vulgaris morbus, uide *Communis morbus*.

Vulsio (aut potius *Diuisio*) est, cum fibræ musculorum nimis distentæ rumpuntur; alias *Discerptio* appellatur, 4. de iis, quæ in med. 30.

Vulua, uide *Hystera*, & *uterus*.

Vulua, uide *Staphyle*.

X

Xerophthalmia, *Ξηροφθαλμία*, id est, arida lippitudo, dicitur, cum anguli oculi uicera, & asperitudinem, pruritamque contraxerunt, palpebræ insuper rubent, & lachryma salua, & nitrosa ab oculis profluit, lib. Intr. cap. 15. uide *Sclerophthalmia*.

Xerose, *Ξηρότης*, siccitas una est ex quatuor primis qualitatibus. Eam autem quadruplicem in nobis accidere, Galenus annotauit lib. 7. meth. quarum prima est, quæ in exilibus uenis & arteriis cuiusque particulae propriis consistit, quæ provenit ex sanguinis penuria. Secunda est, cum propria humiditas, unde partes nutriuntur, omnino est assumpta. Continentur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per eas sparsus. Est præterea siccitas utique quum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Quarta est prorsus insanabilis, si consummata fuerit; est autem prorsus consummata, ubi solida simularium partium substantia reddita est siccior.

Quippe quod senium est in morbis, id sicca intemperies est in ægris. Porro eiusmodi siccitates proueniunt ex

diuturnis euacuationibus, quæ uel ex uentris profluvio, uel intestinorum læuitate, uel dysenteria, aut diuturnis uomitibus, aut uigiliis, aut tali alia de causa proueniunt, aut longi temporis fame, & febris ardentibus longis, atque ut in uniuersum dicatur; quæcumque ipsas animalis solidas partes uehementer exsiccant, sicuti & hæticæ febres.

Xeroderibia, id est, *sicca frictio*, 8. method. 2.

Xiphoides, uide *Pectorale os*, & *Cartilago ensiformis*.

Xyster, uide *Aures*.

Z

Z Oogonia, *Ζωογονία*, est, animalium perfectorum generatio uniuoca, libr. de constitut. art. cap. 13.

Zulapium, Actuarius, & alij recentiores Græci, barbara uoce appellarunt id, quod hodiè *Iulep* & *Iulepum* itidem barbaro uocabulo nuncupamus: fit è stillatitio liquore, aut etiam è succis, & saccharo tantum decoctis, ad iustam consistentiam, ut ex Mesue satis constat; licet Seplasiarij ab ea forma compositionis, nescio quo iure, nonnihil discefferint.

Zygoma, os iugale est, quod temporis musculo præpositum, transversam in medio futuram habet, cuius posterior pars cum capitis osse, quod iuxta aures est, anterior cum parte supercilii extrema, ad paruum oculi angulum, continuatur, lib. de ossibus capit. 2. quod duplex est, ad utramque aurem, super foramina, per quæ facultas audiendi est, emergit, lib. Introduct. cap. undecimo, vulgò *os paris* vocant, alii, *iugamentum*, Græcè autem *Ζυγωμα*, siue *αυζυγῶδες*, quasi *conjugales*, & ex duobus *conjugatum*, uocatur. Est autem solidum & durum

durum in lapidis modum, medullæ expers, & foris quidem gibbum: intus verò cauum, quod musculus temporalem, quem subiectum habet, & cui velut propugnaculum obiectum est, contineret, & ab externis iniurijs vindicaret. Siquidem sub hoc osse musculus ille magna ex parte delitescit.

Zymoma, ζύμα, seu ζύμη, fermentum, est farina subacta, quæ acorem contraxit. Subigitur aqua, priusquam addatur sal, & quia non perfecte coquitur, putrescit, caloremque & acrimoniam a putredine concipit, ut & alia quæ putrescunt omnia. simul autem & tenuitatem partium, & aciditatem acquirunt, veluti acetum, quod putrescente vino tale euadit: Ergo quantò vetustius fermentum fuerit, tantò est præstantius. Sic enim calidius, acrius, & tenuius est, magisque ea quæ in alto fixa sunt, attrahit, & discutit. Miscetur ob id panificiis, leuioremque panem, & concoctu digestuque faciliorem exhibet. Miscetur & medicamentis extrahentibus & digerentibus, atque etiam suppurantibus.

Zymosis, ζύμωσις, fermentatio, ut Plato definiuit, est terrenæ substantiæ motus simul, & in aerem resolutio. Est enim motus, quo in tumorem leuem attollitur, conceptoque aere distenditur, inflatur, & quodammodo ebullit. Id quod fermentum farinæ triticeæ subactæ inditum euidenter præstat, & in multis rebus tum simplicibus, tum compositis, quæ per se eam uim fermenti acquirunt, manifestò cernitur. Ipse enim uini feruor in dolijs, & solidiorum medicamentorum, ut Mithridatij, Theriacis, & conseruarum, ut appellant Pharmacopolæ, ebullitio (neque enim Plato inter ζύμη, & ζύμωσις distinguit, utrumque eadem definitione com-

pre-

prehendens) quædam fermentatio est, etiam inde acida non fiant, ut nec ipse panis fermentatus. Idem effectus & in atra bile apparet, quæ incendio bilis flauæ genita, terram in quam effusa fuerit, abradit, & partes quæ raduntur omnes in altum attollit. Est enim is humor aceto simillimus, ex quo in terram effuso idem omnino fieri apparet, eumque propterea Veteres humorem acidum nominauerunt, æquè ut pallidæ bilis amarum. Ab eadem causa etiam *ἔρμ ἐζυμώμενα*, hoc est, urinæ fermentatæ dicuntur ab Hipp. ut annotat Galenus. Sicut enim in terram acetum acre effusum protinus intumescens, quasdam terræ partes sursum simul attollit, fitque compositum quoddam ex terrestri substantia aceti, humiditate, & uaporoso spiritu, aut ueluti effusa in terram atra bile, aut in feruente musto, motio quædam spiritus manifesta assurgit, aut sicut in panibus quotidie, misto farinæ subactæ fermento & mediocriter macerato fermentatio fieri cernitur, fusa simul & intumescente, quæ fermentatur, substantia: sic & in urinis aliquando crassis multum spissisque leuis quidam feruor per agitationem excitatur, motisque & rarefactis spiritibus in ea conclusis, in maiorem quam cum primùm excretæ fuerant, tumorem attolluntur.

Σύμφορος ὕψος, iecinoris tumor oedematosus dicitur apud Hippocratem, ut annotauit Erotianus.

Zone, dicitur pars ea corporis qua cingimur, apud Hippocratem, quamquam sint qui *τὴν ὀσφύν* interpretentur, ut annotauit Erotianus. Est & *ζώνη* ignis sacer, siue herpetis species, sic dicti, quod medium quodammodo cingat, & complectatur hominem, ut author est Scribonius Largus, cap. 62. scribens, medicamentum Andronis facere ad carbunculos, & ignem sacrum, &
Zonam

ad Zonam, quam Graeci *ζώνη* dicunt: sed magis usitato nomine *ζώνη* appellatur. C. Plinius Secundus lib. 3. quem scripsit de medicina, ait *ζώνη* a quibusdam *circinum* appellari, fierique hunc in modum: uesicae tanquam combustae exu ut & crepant, primum paucę; deinde citò multiplicantur; quę si hominem cinxerint, occidunt.

Zōica dynamis, ζώνη δυνάμις, est facultas uitę conseruatric. Nam cum uita nil aliud sit quam copula animę & corporis, eaque uno calore natuo contineatur, meritò ea facultas uitę conseruatric haberi debet, cui a naturā caloris huius gignendi, continendi, partibusque omnibus impertiendi cura commissa fuit. Eam facultatem Medici *vitaalem* appellarunt multò præstantiore nomine, quam reliquas facultates, quę quamvis tam sint ad uitam necessariae, ut sine ipsis ea nullo modo consistere possit, prærogatiuam tamen eam habet uitalis, ut per eam uita consistat. Siquidem calorem natuum, quo uno uiuimus, sola moderatur. Cuius rei causa in corde residet, uiscere nobilissimo: quod propterea omnium in corpore primum uita fruitur, & postremum uiuere desinit, situmque est medio in corpore, ut quoquoersum colorem suum in omne corpus effundat. Neque enim satis naturę uisum est natuum calorem, singulis partibus in ipsa prima conformatione indidisse, qui fluxus a Medicis dicitur: sed quoniam multis de causis alterari, unminui, digeri, extinguique potest, eam perpétua alterius caloris *αμείψους* accessione refici, atque instaurari oportuit: Quod quidem munus facultatis proprium est. Eo autem ut defungeretur naturā cor condidit huius caloris sedem, in cuius uentriculo maximè sinistro tanquam in fornace coqueretur.

Ma-

Materia eius pabulumque sanguis est , atque sanguinis uapor, quem dexter cordis sinus suppeditat, qui postea perenni cordis motu elaborat, & calidior tenuiorque effectus uitalis spiritus nomen accipit, non tam iam pabulum caloris illius natiui, quam uehiculum . Calor namque natiuus duobus iis comitibus in singulas corporis partes per arterias decurrit , earumque perpetua pulsatione calorem ipsis à natura insitum temperat atque refocillat . Idem enim præstat uniuerso corpori arteriarum motus , quod cordi respiratio, quæ aeris inspiratu non modò calorem in corde alioqui exardescentem leniter uentilat, sed etiam adauget, expiratione uerò fuliginosis excrementis liberat . Itaque cum facultatis uitalis munus proprium præcipuumque sit uitæ conseruatio, coloris natiui beneficio: uel si maus caloris natiui, quo uno uita continetur, generatio & custodia: præstari autem id non possit absque cordis & arteriarum pulsu, ut qui eo in opere habeat rationem causæ per quam uita, calorque natiuus conseruetur: consentaneum est uim quoque pulsificam facultatis uitalis functionem esse: neque enim pulsus alius est, quàm caloris natiui motus . Sed nec minus inter eiusdem facultatis actiones annumeranda sunt animi pathemata, quæ & ipsa motus sunt natiui caloris, sed diuersi à pulsu generis . In pulsu namque, tum in ipso corde motus fit, tum per arterias: per animi uerò pathemata non in corde modò cientur caloris motus , sed per uniuersum etiam corporis habitum sentiuntur . Si quidem in mœrore & metu, adhæc iræ & uerecundiæ initio, calor natiuus intro cum spiritu & sanguine recurrit: contra, in gaudio, ira, & uerecundia iam uigente, ad cutem cum spiritu & sanguine plurimus erumpit .

Quo-

Quorum quidem motuum concitandorum facultas
Συμμετρίας à Philosophis appellata fuit . Ex quo patet fa-
 cultatis uitalis geminam esse differentiam *σφυσμασίαν*
 & *Συμμετρίαν*.

F I N I S.





Clarissimo Viro,
D. ADRIANO RAVESTEINIO
Artis Medicæ longè peritissimo:
C V M
MEDICINÆ LEXICON,
Studio, ac industria elaboratum,
Publico daret.

L Aude caret tacita celata scientia mente ,
Quæque sub ignauo torpescit corpore virtus.
Corruit, & meritos nunquam sortitur honores.
In clarum protraxit opus vis ignea celsi
Ingenii authorem nostrum, dum scribere docte,
Atque suis operis Artem illustrare medendi
Aggreditur; nitidum consummans ordine librum
Enucleatum aliis, explanatumque ministrat.
Pleniùs à nullo statuendum Lexicon edi,
Conciliumque magis, potuisse, magisque disertum;
Vn;

Vndique perfectum est, nil desit, nilque redundat,
Clara iacent, ipso, verborum, Interprete; sensa.
Hæc tua præ reliquis iam præstat in arte facultas;
Quid mirum? maiora potest, cui surgit ab imo
Viuida mens, demissa polo, nec corporis arce
Clauditur obtusa, nec tēdia mille laborum
Formidare solet, sed tendere in ardua gaudet.
Felicis animæ tales! Non segnibus illa
Contingunt, nec blanda suis Cytheræa rependit.
Hippocratis Libros scrutanti, *Scripta Galeni*
Cuncta reuoluenti debetur gratia, soli;
Publica, quo magis ipsa superstitē commoda crescūt,
Quoque hominis, quæ vita breuis, sit longa per arte.
Macte, Machaonias, acri studio impiger artes
Excæle, Fata dabunt fœlicis rempora vitæ.
Finio, Et hæc vna est voti sententia nostri.

THEOD. VERBURG.
I. V. D. & ADV.

Spes mea sola, Deus.

